



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

MERCATUS

Institution.

Chirurgicae

517

M 62 l

A

INSTITVTIONES
CHIRVRGICAE IVSSV



REGIO FACTAE PRO CHIRVRGIS

in praxi examinâdis: authore Ludonico Mercato, Phi-
lippi. II. Hispaniarum, Indiarumq; Regis potentissi-
mi Medico à cubiculo, ac Protomedico, & in

Vallésolerana Academia primariæ cathe-
dræ professore emerito.

IN VOS LIBROS DISSECTAE,

et Materis Protomedicis approbate.



CVM PRIVILEGIO.

Excudebat Madriti Ludouicus Sanchez.

Anno. 1594.

PHILIPPO II. HISPAN-
iarum, Indiarumq; Regi potētissimo,
Ludouicus Mercatus Medicus à
cubiculo felicitatem.



I eam Rempublicam beatam fore di-
uinus Plato refert, Rex potentissime,
quæ principes, rectores & consilia-
rios scientiarum ac virtutum amato-
res nanciscitur (quod nihil aut præstabilius aut ex-
cellentius habere vlla hominum societas possit) quid
potētatibus & regnīs tibi subditis felicius vel glo-
riosius accidere vsquā potuit, quā tuo imperio po-
tētissimo esse, & armis decorata, & legibus præcla-
ris summa diligētia gubernata? Quæ sanè, gravita-
te, integritate, consilio ac virtute cōsiliariorum &
iudicum ita moderaris ac regis, vt nil ad felicitatem
illius Platonice Reipublicæ in nostra desiderari vi-
deatur. Quarum profectò felicitatū author & exē-
plar tu es, qui nullis vnquam fortune temerarie in-
sultibus infirmari potes, neq; distrahi à tuorum com-
modis & bonorum ornamentis, quantūvis calamitō-
sis his nostris tēporibus velut titubans & fortune
temeritate turbata appareat vndiq; totius orbis ma-
china. Hæc etenim, & longè præstantiora de te con-
cipiet, qui Regiæ Maiestatis tuæ nouerit spectatissi-
mam excellentiā, egregiam quandā & planè inuictā
animi celsitudinem & Christianā pietatem. Scimus
enim te Rege omnes artes, præsertim quarū fructus

immortalitas est, colli coeptas esse, suam religioni & vere pietati dignitatem restitui, virtutibus vitia cedere, vim a quitati, rationi a mentiam, & libidinem pudori, quibus humano generi salutaris doctrina cōparatur. Quippe tibi quies labor est pro virtutum ac literarum propagatione, & vita vitam conterere pro iustitiae custodia, quae regia clemētia adiuncta tibi prima & antiquissima virtus est. Et enim sereno vultu & animi integritate in tātarum rerum turbatione interna pace & incredibili providentia omnia sic moderaris ac regis, ut solum vni tantum rei dicatus videaris. Imperasti, Rex potentissime, misertus Reipublicae periclitantis in tanta Chirurgorum penuria, & Medicinam studentium negligentia, Institutiones utriusque partis Medicinae conseruare ac perficere, quibus quantum possibile fuerit huic malo praeueniatur, ut his memoriter perceptis in examen conscendant Medicinae studiosi. Qua potui diligentia tuo iussui obtemperans pro viribus utrumque opus perfeci, & spero in Medica facultatis commodum ac Reipublicae utilitatem abitteram: exiguum sane opus, ac tanta Maiestate indignum, sed pro summo tuo erga studiosos amore accipe ac fove, ut Regio patrociniū securius incedat, & utilius cuique efficiatur.

EL REY.



Oñor Luis de Mercado Medico de nuestra Camara, y vno de nuestros Protomedicos, por la necesidad precisa que se entiede ay en estos mis Reynos, de que los Medicos despues de graduados de bachilleres, y auer praticado dos años, sean examinados de aqui adelante por instituciones particulares, en cosas concernientes a la practica y buen yso de los remedios de la facultad de la Medicina; y assi mismo los Cirujanos de mas de auer oydo Medicina: se acordò que las dichas instituciones se hiziesen por los nuestros Protomedicos. Y porque ellos no pueden juntarse agora, ni cõuiene diferirlo mas, confiando yo de vuestras letras, prudẽcia, y esperiẽcia, q̃ las sabreys hazer y disponer como es menester, os las he querido cometer y encargar, como por la presente lo hago, para q̃ vos ordeneys,
y reco-

y recopileys dichas instituciones: por las
quales de aqui adelante han de ser exa-
minados los dichos Medicos, y Ciruja-
nos. Y para que las puedan tener todos
se imprimiran, y distribuyan por estos
mis Reynos; advirtiendole, que si confor-
me a ellas no fueren hallados con la su-
ficiencia necessaria, no han de ser admi-
tidos al uso y exercicio de sus oficios. Fe-
cha en san Lorenzo a veynte de Setiem-
bre, de mil y quinientos y noueta y tres
años.

Y O E L R E Y.

Por mandado del Rey nuestro señor.

Geronimo Gassol.

ATS-

Yo *Alonso de Vallejo escriuano de Camara del Rey nũstro señor de los que residẽ en su Consejo, doy fee, que auiendo se presenta do ante los señores del Consejo por parte del doctor Mercado Medico de Camara de su Magestad, y su Protomedico, vn libro que compuso intitulado Instituciones, por donde se hã de examinar los Medicos Cirujanos, que con su licencia fue impresso, le tassaron a cinco maravedis el pliego, en papel, y mandaron, q̃ esta tassã se ponga al principio de cada volumẽ del dicho libro, y no se pueda vèder de otra manera. Y para que dello conste de mandamiẽto de los dichos señores del Consejo, y pedimiẽto del dicho Doctor Mercado di esta fee, q̃ es fecha en la villa de Madrid a cinco dias del mes de Abril de mil y quinientos y nouenta y quatro años.*

Alonso de Vallejo.

S V M A D E L

privilegio.

POR vn privilegio del Rey nuestro señor, se da licencia al Doctor Luys de Mercado Medico de Camara, y Protomedico, para que por tiempo y espacio de diez años cumplidos primeros siguientes, pueda imprimir, y vender vn libro que ha compuesto intitulado Instituciones Chirurgicas, q̄ va rabricado y finmado al fin del de Alōso de Vallejo, escrivano de Camara de su Magestad, so pena que el q̄ lo imprimiere sin licencia del dicho Doctor Luys de Mercado, cayga e incurra en las penas contenidas en las leyes y prematicas destos Reynos, que sobre ello hablā, y de mas incurra en pena de cinquenta mil maravedis, por cada vez que lo contrario hiziere, repartidos en tercias partes, para la Camara, luez, y denunciador, su fecha en Madrid a treynta dias del mes de Deziembre de mill y quinientos y nouenta y quatro años.

P R A E F A T I O.



CIRURGICA Medicina pars (quæ maximè inter omnes venit laudanda, ut quæ & vetustatis & originis splendore, & operum inter cetera memorabilium alias omnes antecellit) nulla alia via cōmodius & clariùs innotescere potest, quàm auspicato principio ab eius diffinitione, quæ in hunc modũ se habet. Chirurgia est vetustior ac certior pars totius therapeutices, & habitus intellectus practici, ex multis theorematib⁹ ac experimētis acquisitus, et opportunis instrumentis, nec non artificiosa validarum manuum actione, uniendo, diuidendo ac demendo morbũ in unitate aut cōpositione, humano corpori occurrente citò, tutò, iocunde & quàm minimo dolore sanare valeat. Opus nimirũ artificiosum ipsarum manuũ, est ab operationibus intellectus admodum diuersum (ut ex Arist. constat, necnon & ex Gal.) quæ sanè fiunt diuidendo, componendo, diffiniendo, demonstrando, siue quouis alio modo operando Est tamẽ opus, quod methodo, idest ordine, arte & prudentia perficitur, & ab anatomie & longa praxi, quæ in his consistit, quæ recta ratione excogitata sunt & frequenti usu confirmata, dirigitur. Et quoniam ars curatiua

Lib. 1. de
anim.

Lib. 1. de
offic. me.
cōm. 2.

A

pro

P R A E F A T I O

proprias indicationes à morbi essentia, quæ rationibus declaratur, percipuo assumit, & eius prima intentio, quam ultimò cõsequitur, est alienius singularis membri morbum in unitate diuisa expellere præcipuè, & unionē deperditam reficere: ob id in hoc Chirurgicarum institutionũ opere, solũ tria ministeria quæ præstat, recensere studui. Quippe hæc tumores præter naturã aut præcauet, aut curat, vulnera uniendo sanat, & ultimò ulceratas partes in pristinam sanitatem restituit. Reliqua verò quæ mirum in modum exequitur, alterius sunt considerationis, & ad secundum librum maximè videntur pertinere.

re. Initium tamen sumam à tumoribus
præter naturam.

D E


LIBER PRIMVS. 2

DE TUMORIBVS PRAETER naturam in genere

INSTITVTIO I.



T Chirurgus rectè, & vt
par est, ediscere possit tu-
morum præter naturâ, tum
essentiam, tum differentias,
causas, generationis modum,
& curandi rationem, cû alijs
quæ necessaria sunt, primò
sciat, statum naturalem in
nostris corporibus consti-
re ex optima temperie, decenti figura, & ex partiũ
vnitate: ob id quæ fieri præter naturâ & morbosum
vno ex his tribus (aut duobus aut omnibus) euer-
so, aut à debito murato. Et licet ex cuiusvis præ-
dictorum mutatione, variae & multiplices sub-
oriantur morborum species, tamen cû omnes
simul à debito & nativo statu euariant, duo potissi-
mùm morborum genera suboriuntur: alterũ qui-
dem est vlcus: quippe ob id censendum est Hip-
pocrat. dixisse omnem morbum esse vlcus; hoc
est, vlcus complecti omnia morborum genera: re-
liquum verò tumor præter naturâ in quo eiden-
tissimum est, euersam esse temperiem partis, vbi
præest, mutatam quoque figuram, & vnitatem dis-
sociatam. Cum hoc tamen statuendum est, ex
his tribus morborum fortibus, vnum tantũ
morborum genus suboriri, appellatur tumo-
rem præter naturam, seu apostema, aut inflam-
mationem. Verũ si quis rem hanc diligen-
tius pensiter, reperiet hæc nomina, vt inter se
A 2 disse-



Institutionum Chirurgicalium

differūt, ita tumores per ea significatos lōgissimis
intervalis dissidere. Nā tumor pręter naturā omnē
complectitur ex crescentiam supra naturalem figu-
ram acq uisitam: at apostema, vt nonnulli interpre-
tantur, solum abscessum, seu tumorem suppuratū:
inflammatio verō solummodo calidum tumorem:
quo fit, vt nulla ratione tumor pręter naturā pos-
sit definiri per aliquod ex prędictis. Non quidem
per inflammationem, quia potius diffiniretur per
speciem, quā per genus: neq; per abscessum, eā-
dem ratione, neque per tumorem pręter naturam
in genere: nam cū teneatur actiones lædere vt
morbi rationem subeat, & non omnes tumores id
possint efficere, quatenus ex crescentię sunt nō na-
turales, quia parui & qui pustulosi tantū sunt, actio-
nes non vitiant, sed quatenus pars intemperata est,
aut discontinuata. Qua ratione generalior & pro-
prior videtur diffinitio, quę fit per hoc verbum, apo-
stema, quatenus non contrahitur ad abscessum,
sed quęnis designat tumorem pręter naturam ex
triplici genere morborum constans, in quo actio-
nes vitiantur, iuxta dominium morbi in complexu
omnium prędominantis: quippe necessum nō est
omnes morbi rationem pręstare, sed sufficit vni-
cam morbi rationem, ex omnibus ad vnicam for-
mam reductis proficisci. Nam aliquando solum
elucet vitium temperiei, vt in pustulis, quorū pa-
uitas actionibus non officit: nonnunquam soluta
vnitas, vt in paruis & dolorosissimis pustulis: ali-
quando ex omnibus simul, vt in grandioribus tu-
moribus, quorum magnitudo actiones etiam vitiat
forsan animales: & intemperies quoque vegetabi-
lium munera: ac soluta vnitas vtramq;.

Quo fit, vt Auic. definitio commodior videatur,
tur,

tur, quā inquit: Apostema est, ægritudo composita ex triplici genere morborum in vnam magnitudinem aggregatorum. Quibus verbis cōstat, de apostemate generaliter, pro omni tumore præter naturam sumpto loquutū, & complexum fuisse omnes tumores, quorum nullus caret his tribus morborū fortibus. Quod verò diffiniatur à Galen. aliquando pro magnitudine aucta actiones vitiantē, mirū non est, quia diffinit per notius & euidentius: & licet hoc non sit inconueniens, est tamen à ratione alienum aliquid diffiniri per id quod nequeat diffiniti naturam integrare, quantumuis notum sit: & cū apostematis substantia constet ex tribus, diffiniri per vnum, est non leue erratum, quantumuis intelligatur de incremento præter naturam, quod excludit tumores naturales & naturalem obesitatem. His suppositis, statuendum est, tumorem præter naturam esse morbum ad organicas partes attinentē, tum per se, tum vicio simplicium, vt intemperies probat. Quippe tumor omnis præter naturam intemperies est cū affluxu materiæ, cuius praua qualitas pars quæ recipit, intemperatur (quāuis non desint, qui credant intemperiem in partibus præesse ante humoris aduentum, sed id ad imbecillitatē receptioni humoris aptam referendum est) cuius etiā copia in tumore & magnitudinē, ex longitudine, altitudine & profunditate cōstare pars crescit & attollitur, ac figurā naturalem mutat: cuius item substantia & motu, quia se se insinuat in spatia nō naturalia, partes disiunguntur, extenduntur, ac dilacerantur, & soluta succrescit vnitas, quibus tumorum omnium præter naturam integratur substantia & vera ratio.

Vltimò conijcere oportet, variè authores vsur-

Institutionum Chirurgicarum

passetumorum nomenclaturas: nam maior eorum pars, apoflemata appellat omnem tumorem maioris quantitatē: pustulas tumores omnes exiguos: quos borores etiam multi nuncuparunt, in quibus humor qualitate magis, quā copia peccat: exituras verō eos tumores quos abscessus Græci nominarunt, aut qui suppuratiōem iam incipiunt: nam cum verē est abscessus, à Barbaris dubelet nuncupatur. Sed nominibus liceat cuiq; vti ut libuerit, dum res ipsa non ignoretur.

DE TUMORVM PRÆ- ter naturam differentijs

INSTITVTIO II.



Re-termisissis differentijs accidentalibus, quę vel sumuntur ab affectis partibus, aut à symptomatis, vel à causis efficientibus, & ijs etiā quę à magnitudine & paruitate (quas essentielles vocāt) eas tantum in re medica arbitror essentielles, quę ē directio, primo & per se & in vniuersum curationis methodū ac rationem circumscribant, licet ceterę omnes non nihil iuuēt. Huius autē naturę sunt, quę à materia ex qua tumor præter naturā succrescit, delinuntur, vt Gal. varijs in locis asseruerat. Quā sanē diuisionē vtrquis exactē cōplectatur, sciat tumores omnes in genere esse in triplici differentia, à materia quę influit sumpta ratione. Quippe quidā sunt

sum.

Li. de tumor. præ.
& lib. 13.
p. 10.

Emplices, alij compositi, & plures reducibiles, vel extrauagantes. Sic vniuersam hanc institutionem in tres partes diffecare studebo, agēs primò de simplicissimis tumorum differentijs: secundò de compositis, & vltimò de reductiuis seu extrauagantibus.

Simplices igitur tumorum præter naturam differentias in septem species diffectas reperio, iuxta diuersitatē materiæ, quæ eodem etiā numero comprehenditur. Quippe ex his, quidā tumores fiunt ex sanguine, nonnulli ex pituita, plures ex bile, & ex melancholia alij: item ex extranea & diuersa materia aliqui: ex statu plures, ac vltimò ex carnosa substantia non pauci.

Sic profectò tumores qui ex sanguine fiunt, aliqui prodeunt à sanguine laudabili: plures à sanguine vitioso: & alij à mortificato & extincto sanguine. Qui verò à laudabili fiunt, vel prodeunt à crasso, & tunc solùm producitur phlegmon benignus: vel ab eodem sanguine tenui & subtili atque benigno, & tunc oritur phlegmon acutus: qui aut succrescit in partibus extremis, vt paronychium, aut in alijs partibus, vt doctenes Græcorum: aldemenut ab Arabibus, & à Latinis furunculus dictus: qui sanè in inguinibus dicitur bubo, & in alijs partibus etiā phyma: quibus accedit aneurisma, & ecchymosis. Quòd si sanguis sit mortificatus extincto eius calore, vel vtrūq; dissipato, p̄dit sphacelus seu esthiomenon. Verū si ex prauo & vitioso sanguine tumor alicuius suboritur, cōsiderare tūc oportet, an crassus, adustus & veluti venenosus sit: nā eo tēpore prodeunt

Tumores
ex
sanguine

Institutionum Chirurgicarum

malignę exiturę, antraces & carbunculi: at ex subtili & tenui atque vitioso sanguine fiunt profundi phlegmones & cum accidentibus, præsertim si sanguis fuerit adustus & feruidus.

Tumores ex pituita.

Tumores verò qui ex pituita fiunt, vel prodeunt à tenui, aut à crassa, vel ab aquosa. Ex tenui quidē oedema prodit, ex crassa autē struma, ateroma, steatoma & mellicerides suboriuntur. At ex aquosa hydrocele in testiculis, hydrocephalus in capite, vel in alijs partibus, quos idaridas vocant, item & hydropes.

Tumores ex bile.

Pari ratione ex bile mitiori fiunt erysipelas sine ulcere, ex acriori verò, si crassa fuerit, prodit erysipelas cum ulcere, aut herpes exedens. Si autem serosa sit, fit herpes miliaris ambustians: si verò adusta efficit formicam ambulatinam, eithiomeno sam, aut ignem persicum, vel sancti Antonij.

Tumores ex melancholia.

Sic ex melancholia pura efficitur scirrhus tumor exquisitus, ex non pura autem fit cancer: qui aut est ulceratus & occultus, & appellatur à nonnullis carcinoma: aut ulceratus & manifestus, qui propriè dicitur noli me tangere, maxime si in facie fuerit.

Tumores ex materia extranea.

Ex materia autem extranea, & quę iam degeneravit à natura humorum, tumores etiam non pauci fiunt, in quibus reperiuntur veluti capilli, carbones, ossa, testę, lapilli, & huius naturę alia, quę his & alijs rebus extraneis simillima sunt.

Tumores ex materia flatuosa.

Sic pari ratione ex materia flatuosa fit tumor emphysema, seu inflatio appellatus, qui aut succrescit in cavitatibus magnis, vt in ventriculo, intestinis & scroto, aut sub cute vel periostijs, aut cuiusvis membri parvissimis poris.

Tumores

Præterea fiunt tumores ex substantia carnosa,
ad

ad quorum genus pertinere videntur proprię par-
tium & totius corporis excreſcentiæ & præter na-
turales tumores, ſiue ex pinguedine, ſiue ex carne
ſiant. Item cum in membro aliqua pars ſupercreſ-
cit, aut caro adnaſcitur, vt polipus, fungus & huius
naturæ alij tumores, quorum extuberantia carnea
eſt. Atque hi ſunt omnes ſimplices tumores: & li-
cèt alij plures reperiantur, vel ad hos erunt redu-
cibiles, vel inter extraneas annumerandi,
eo quòd à diuerſa materiæ diſpoſitione ſubo-
riantur.

res ex
ſubſtan-
tia car-
noſa.

Compoſiti verò tumores varijs modis compli-
cati reperiantur: vtcunque tamen ſit, vel ſuper-
ſunt calidi, vel frigidi. Si calidi ſint, prodeunt à ſan-
guine & bile: qui ſanè humores ſi æqualiter miſ-
ceantur, medius quidam affectus prodir inter phleg-
monem & eryſipelas: ſi verò inæqualiter, inſpicien-
dum eſt an ſuperet ſanguis, quo tempore efficitur
phlegmon eryſipelatodes: vel ſi bilis ſanguinem
ſuperet, ſit eryſipelas phlegmonodes. Quòd ſi fri-
gidi humores in vnum coeant, neceſſariò fiet ex-
pituita & atra bile: qui ſi æqualiter conſuant, me-
dius producit affectus inter œdema & ſcirrhum:
ſi verò inæqualiter, & vincit pituita, œdema ſcir-
rhodes efficitur: verum ſi melancholia ſuperet, ſcir-
rhus œdematodes. Quòd ſi ſanguis & pituita ad-
miſceantur æqualiter, tunc quidem medium pro-
creant affectum inter phlegmonem & œdema: ſi
verò inæqualiter, & pituita prædominetur, ſit
œdema phlegmonodes: ſicut ſanguine ſuperabun-
dante phlegmon œdematodes. Pari ratione, cum
ſanguis & melancholia æquis portionibus adiun-
guntur, medius quidam comproducit affectus
inter ſcirrhum & phlegmonem: verum ſi ſanguis præ-

Tumo-
res com-
poſiti.

Institutionum Chirurgicarum

dominetur, phlegmon scirrhomides progignitur: sicut prævalente melancholia, scirrhus phlegmonodes. Eodem prorsus modo bile & pituita æquis partibus concurrentibus medius fit affectus inter oedema & erysipelas: verum dominante pituita, fit oedema erysipelatodes, sicut exuperante bile, erysipelas oedematodes. Sic perfectio coeuntibus pari mensura bile & melancholia, medius pullulat affectus inter scirrhum & erysipelas: cæterum prævalente bile, erysipelas scirrhomides, & exuperante melancholia, scirrhus erysipelatodes. Atque hæc sunt possibiles tumorum complicationes, licet ex alijs etiam simplicibus complicari varias tumorum species comperiamus: quas consilio prætermittimus, quia certo numero aut lege nullaratione comprehendi possunt.

Tumores extrava-
gantes.

Extrava-gantes, seu reducibiles tumores varij reperiuntur, ex varijs humoribus orti, & in varijs partibus adnascetes, quos vel ad melancholiam, vel fæcalem aut nimis crassam pituitam reducere oportet. Cuius naturæ sunt varices, verrucæ, seu porra, myrmecia, acrochordones, clavi, tymo, cornua, calli, dracunculi, pustulæ, quæ licet ex alijs quoque succis mille modis vitiatæ prodire possint, semper aliquid melancholicum secum afferunt. Huius etiam naturæ sunt lepra, seu psora, lichen, seu impetigo, scabies, albarras, alphi, vitiligo, iochi, epynictides, sudamina seu psyraces, morbilli, variole, exanthemata, seu ecchymata, papulæ, terminathi, dartra & mentagra. Item sunt aliarum cutis tumorosarum descensionum ex morbo Gallico prodeutes, quæ

non sunt huius considerationis.

DE TVMORVM PRÆ-

ternaturam causis & modo generationis

INSTITVTIO III.



VIDENTISSIMVM

quidem est, & omnium Medicorum consensu confirmatum, tumores præter naturam varijs modis, & à varijs causis originem ducere. Sic profectò sciendum est, duobus modis posse tumores in nostris corporibus succrescere: vno quidem paulatim &

sensim; congesta in aliqua particula materia, quæ sensim quoque augescens, eleuari in tumorem comperimus: quem fieri per paulatnam congestionem scribunt Medici. Cuius tumoris causas & generationem duplices cognoscimus: alteram cum pars nequit genitum excrementum præ impotentia expellere, vt ex Galeno euidenter constat, & addit viarum angustiam & excrementorum crassitiem, tanquam concausas prædicti mali: reliquam verò cum ex alimento familiari prauam generat substantiam & excrementitiā. Vtroque enim modo paulatim & sensim patienter natura ferēte aggregationē excrementitiæ substantiæ, cōgeritur & cōrescit tumor, donec ad magnitudinē morbosa sine dolore & cū

intem-

Lib. 2. de
differ. fe.
c. 11.
Li. 3. sym
pto. c. 2.

Institutionum Chirurgicalium

Li. 2. prae-
di. prope
finem.

intemperie peruenit. In quo tumoris genere constat partem longè magis esse morbosam & imbecillam, quàm in eo quod sit per decubitum, vt etià docuisse constat Hippocrat. At secundo modo tumores fiunt per defluxum seu decubitum aut transmutationem materiæ vnius partis ad aliã, modò confertim & subito, modò lèrè & sensim fiat. Quã sanè transmissionē fieri tribus omnino causis omnibus est compertum: nimirum humoris fluentis copia aut vitio, quibus excitatur secunda causa, videlicet membri in quo viget humor, efficacia, robur & potentia, qua expellit sibi molestum humorem, quocunque potest modo, & in quamcunq; partē, sed præfertim ad imbecillam, quæ tertia tumoris, aut receptionis prauorum humorum causa est. Itaque tres necessario causæ conscendunt simul ad tumoris generationem, humoris vitium aut copia, quæ laceffat naturam ad pulsus, fortitudo membri ad transmissionem illam, item impotentia membri recipientis, aut maxima cum eo communio. Eit autem recipiens membrum imbecille aut aptū receptioni ex natua impotentia, vt cutis vniuersa, vel ex morbo contracta, vel ex innata raritate, vt adenosæ partes, aut vt Galen. scribit, ex situ decliui, ex amplitudine vasorum ad partem recipientem attinentium, aut ex strictura vasorum membri transmittentis: item ex recipientis calore, aut dolore, vel vacuo, vt secunda harum Institutionū parte latius sum probaturus. His tantum modis fieri tumores præter naturam omnibus est compertum. Verum qui ex defluxu fiunt, vt Galen. aduertit, mutato humore ab vna in aliam partem, hac lege fiunt. Prius etenim implentur humore fluentis maiores venæ, postmodum minores, tandem minores,

Li. de fra.
co. 25.

Libr. de
inæquali-
tate. c. 3.
Li. de tu-
mo. prae-
c. 8.

ma, donēc per earum oscula & poros aliquid ex-
currit & instillat in spacia & poros carnis, nerui, li-
gamenti, & reliquarum substantiarum, quousque
præ copia tendantur, dilacerentur, & pars in abicef-
sum commigrēt, cum dolore & calore atque com-
pessione, & membrum in insignem tumorem at-
tollatur.

Secunda huius capitis pars continet in genere
causas & occasiones tumorum omnium præter na-
turam, nullo habito respectu ad prædictos genera-
tionis modos. Quas sanè Medici omnes trimem-
bri diuisione complectantur: nam quedā sunt pro-
catartica & externa, euidentes seu præincipiētes:
quippe sic eas diffinierat Galen. dicens: Causa pri-
mitima est illa, quæ extrinsecus corpori aduenit, ip-
sumque vehementer alterat atque immutat, & post
modum separatur. Huius generis sunt animalium
morsus, & reliqua quæ contundendo aut extenden-
do partes, vel tacta punctione aut doloroso affectu,
damnum inferant, vt ictus, casus, percussio, ossis
fractio, aut luxatio: & insuper res omnes non natu-
rales, cū natæ sint humores agitare & mouere, quo-
facile concitantur fluxiones. Rursus secunda &
præcipua causa est, vocata antecedens, quæ nulla
alia est, quā plenitudo aut vitium quatuor humorū
naturalium (quales sunt, qui extra corpus concre-
sunt) aut excrementorum quæ ex ipsis, vel quouis
alio modo fiant (quæ nullo modo extra corpus cō-
crescunt) vt ex Galen. mille in locis constar. Itaque
ex sanguine, quem Galen. intelligit omnem humo-
rem, & ex quouis aliorum humorū, facile fieri pos-
sunt: sic enim ex his fiunt quatuor illi tumores pri-
mi, phlegmon ex sanguine, erysipelas ex bile, ferr-
rhus ex melancholia, & ex pituita oedema, quia hi
sunt

Li. intro.
cap. 8.

Li. de cau.
mor. c. 2.

Libr. in-
tro.

Li. ar. me.
c. 8.

Li. de cau.
mor. c. 2.

Li. 11, me-
th. c. 9.

Libr. de
nat. ho. n.

Institutionum Chirurgicalium

sunt humores naturales . . . Pari ratione ex flatu & ex spiritu arteriarum , & ex omni extranea substantia , . . . ut dictum est : quæ quidem omnia causæ antecedentis rationem complent. Coniuncta autem causa nulla alia censeri debet, præter materiam contentam intra tumorosam partem , quæ præest in actu tumor: siquidem protinus subsidet tumor & omne eius aggregatum, ipsa materia educta, aut omnia simul adsunt ipsa præsentem. Dimitto hac in parte diuisionem in causas efficiences , formales, materiales, & finales, quia arbitror præhabitam diuisionem visui medico commodiorem esse. Denique eam licet externam causam extimare, quæ facto malo protinus abit, & nullam ad curationem præscribit indicationem, licet ad cognitionem affectus maximè conducat. Ea verò censenda est antecedens, cui reuulsionis omne genus debetur, ac si quæta permanferit, euacuatio, sicut dum in partibus affectæ venis iam est, propriè deriuatio aut repulsio. Ceterum ea dicenda est causa coniuncta, cui vel euacuatio à parte nuncupata debetur, vel propriè induratio: euacuabitur quippe à parte, repulsu, resolutione, aut post suppurationem aperto tumore.

His suppositis, superest nunc differere, qualiter finire terminarique possit quouis prædictorum tumorum . . . In qua re statuendum est, tumores omnes posse vna trium terminationum finire, præter corruptionem, quæ potius mutatio mali in aliud grauius ac diuersum est, quàm mali terminus . . . Cui accedit altera ex toto huic contraria, quæ est, repulsio humoris ante alterationem ullam, quæ fit medicamentis quæ vim habent

bent repellendi quod influit & influxū est ac in parte receptum: denique corruptio est alteratio ex toto corruptiva, repulsio mali evanescentia citra alterationem: at resolutio, suppuratio, & mutatio tumoris in duritiem, alterationes sunt. Li. de ins.
 partis in materiam, corruptio verò alteratio à materia corrupta: utrumque docuit Galen. his verbis. c. 9.
 bis: Itaque duorum alteram sequi est necessum, vel superante fluxione corporum quæ succubere, sequi corruptionem, vel ea deusta, musculum ad naturalem habitum reuerti. Et ut doceat, qualis terminationum optabilior tutiorque sit, inquit. Subijciamus ipsam primū fluxionem superare, rectius enim à melioribus incipietur, duplex hic incidit curationis modus: quod scilicet, vel digeritur seu dissolvitur, quid in particulam humoris procumbit, vel concoquetur: verū dissolutio optabilior existit, ad concoctionem autem hæc duo consequuntur necessariò: nempe puris generatio, & eius in aliquod spatium abscissio. Vtrum horum subsequitur sit in apostemate facile discas, si expenderis, membri leuitatem sine pulsatione ostendere resolutionem tumoris: dolorem, duritiem, caloremque perseneratem, suppurationem, maximè si accedat inordinata horripilatio. Verū si imminuatur tumor, manente aliqua duritie, signum est indurationis tumoris. Quod si in caruleum aut nigrum colorem cum prauo odore mutetur tumor, & post ingentes dolores in dolorosior fiat, mortificationis est euidentissimum signum, quia euidenter his signis constat nerueam substantiam putrefactam quoque esse. Recurrit etiam tumor præter naturam.

Institutionum Chirurgicarum

ad interna, vno è duobus modis: vel repulsa materia ad maiores venas vi medicamentorum repellentium: vel natura errante transmittenteque humorem ad aliud membrum. In quare, sicut ad maiores venas remeare periculosum non est, ita ad aliud membrum permutari, periculo plenum existit, vt Hippocr. statuerat, maximè si ad principalis fiat commeatus, etsi subito tumor euanescat: quare semper cautè repellentibus agendum est. Itaque partem corrumpi à virulenta humorum, pessima omnium mutatio est, laudabilior quæ per resolutionem fit: nam morbum terminat, vt Hippocr. docuerat, & Galen. adhuc in suppuratis tentandâ esse resolutionem præcipit. Cum hoc tamen suppurationem (vt quæ non reuertatur, vt docuit etiam Hippocr., quia cocta non efficiunt recidivam) longè esse tutiorem, quia corpus à recrementis expurgat per apertû foramē, nemo est qui ambigat: sic enim aperti & purgantes bubones à morbo Gallico sæpe liberant. Cum hoc tamen tumores oculorum, testium, iecoris, aut membri alicuius principalis, longè melius & tutius indurantur (licèt deterior sit induratio absolutè, ipsa suppuratione) quàm suppurentur, vt etiam consuluerat Hippocr. de oculis loquens, quia partes huius naturæ suppurari periculo non caret, & ob id in huiusmodi membris semper tentanda est resolutio, potiùs quàm in quouis alio.

Considerabis ultimò in omnibus his tumorum terminationibus tēpora & mutationes, vt quæ longè magis curandi rationem euariant quàm causa ipsa, aut morbus vt morbus est. Quæ sanè tempora seu partes vno è tribus modis considerabis: primo, quia tumor est, cuius principiū à fluxione, seu con-

cre-

errectionis initio auspicari oportet : & licet primo accessu parum influere videatur, mox longè magis confluit, & sensim minus, vsque ad tumoris complementum: cæterum quod fluxum est, magis est dum crescit quàm in principio, quantumvis minus fluat in fine augmenti quàm in principio ipsius status, cum tumor integram magnitudinem iuxta sui naturam adeptus est. Inclinatorio verò aut resoluta materia, aut post suppurationem euacuata : at si tumorem coniicias habito respectu ad alterationem materiæ, nulli est dubium, principium eius esse mutationem & alterationem materiæ insensibilem, hoc est, quando in tumore non apparet calor, neque vlla alia alteratio diuersa ab ea quæ primo fluxionis principio apparuit : quia licet operetur natura, actio tamen eius sensibilis non est: augmentum verò, quando iam calor & dolor, & reliqua alterationis signa euidentia sunt, ob puris initium & confectionem, quam perficit status: in quo omnia hæc accidentia & plura alia in summo vigore existunt & tumor videtur crescere, licet id augmentum nouæ materiæ aduentu non fiat, sed ex præexistentis efferuescentia. Inclinatorio verò pure confecto, & delitescencia omnium accidentium, cum tumoris subsidentia, quam ex efferuescentia contraxerat. Accidentia verò ferè in morbis ex fluxione ipsam sequuntur : sed in paulatinis confectionibus solum sequuntur statum coctionis, in quo dolores ac febres magis viget, nullis perceptis in præcedentibus temporibus, sicut in tumoribus ex defluxu reperiuntur.

Institutionum Chirurgicarum

DE OMNI GENERE TV-
morum ex sanguine

INSTITVTIO IIII.



ICTVM antea est, ex sanguine suboriri tres tumorum sortes, dum citra alicuius alterius succi admistionem conscendit ad tumoris effectiōem, idq; iuxta tres quas sortiri potest dispositiones. Nā vel laudabilis superabūdāt, & colligitur in aliqua parte, licet crassus sit, & eo tempore benignum generat phlegmonem: vel tenuior existit, & ob id plegmonem quoq; efficit, ceterum acutiorē. Aut rursus colligitur sanguis prauus, adultus & venenosus, quo tēpore carbunculos, antraces & malignas exituras producit: quōd si cū hoc subtilis fuerit substātiē, profundos generat tumores, de genere etiam phlegmonum malignorū. Rursus tertio sanguis collectus in aliqua particula emoritur, & generat sphacellum seu esthiomenū. Quamobrem mihi opus est, hoc caput in tres potissimas partes diffecare: prima differet phlegmonē benignum: secunda carbunculosum & malignum: tertia vero esthiomenosum & sphacellatum.

Circa primam, nosse oportet phlegmonē à Latīnis inflammationem nūcupatam, nil aliud esse, vt refert Galen. quā tumorem partium carnosarum cum calore, rubore, dolore, pulsatione, tensione ac renitentia. Quæ diffinitio separat siccā inflam-

Li. 13. me
th. c. 1.
Lib. 2. ad
Glauc.

ma.

inflammationem, quam phlogosim nominavit Hippocr. ab humida quantitate & Erasistratus ac reliqui Medici, plegmonem, seu tumorem durum & dolentem cum prædictis accidentibus, nuncuparunt. Ratio huius fuit, quia partes carnosæ ex delapso à venis maioribus ad minimas & spatia carnis sanguine, in tumore eleuantur, qui sanè scilicet calidus, calore concitat & dolorem: nam cum venule nequeant eam copiam continere, effunditur è vasis rotis modo, ad parua foramina, præsertim laxarum partium, quales sunt glandulæ & muscoli, & viscerum substantia: nam partes solidiores, ut chordæ, nervi & ligamenta rariùs inflammantur, nisi à soluta earum unitate: quippe tunc faciliùs quàm carnosæ partes ob ingentes dolores. Itaque prædictis spatijs sanguine excollato plenis tenditur pars, & ea ratione tan genti renitur, pulsatur ob arteriarum viciniam, cum vel magnus est tumor, vel suppuratur: quibus arterijs se moventibus, partemque inflammaram ferientibus dolorem pulsatiuum concitat: dolorem quidè ob dilationem partium ab extensione factam, ac forsan dum fit abscessus ob disruptionem: itè ob adiunctam intemperiem: pulsatiuum verò ob pulsam eo tempore maiorem, propter caloris augmentum in parte dolente.

Concitant huiusmodi phlegmonem causæ quas diximus: primum externæ ut ictus, casus, percussio, & omne id quod extrinsecus accidere potest, partem quæ ad dolorem aut calorem alterare. Internæ itè, vide licet exuperans copia sanguinis, quæ validum membrum à se pellit in imbecillam aliquam particulam, quæ cogitur recipere ob imbecillitatem, aut ipsa trahitur, quia inanitas, quia calida, quia dolorosa. Cæterum sanguis, qui aut trahitur, aut transmittitur, postquam in parte recipitur, vicem gerit continentis

Causæ.

Institutionum Chirurgicarum

causæ, & ipse tunc quantumvis laudabilis sit, vel crassus sua natura est (qualis ad solidas & densas partes alendas proficiuus gignitur à natura) aut tenuis & subtilioris substantiæ: non quidem vitio sed natura. Quo fit, vt in hoc phlegmonis genere, quod legitimum & benignum continet, etiam duæ reperiatur phlegmonis sortes: altera benigni & superficialis, vt qui ex crassiori fit sanguine: reliqua verò benigni & profundioris, qui à tenuiori sanguine suboritur,

Signa.

Signis faciliè nosces principium inflammationis, prout primum morbi designat insultum, quando pars in tumorem attolli incipit, & figura quodammodo mutari, cum dolore alicuius particulæ circumscripto: nec inconuenit, id duorum triumue dierum spatio euidentiùs apparere, vt secunda vtamur principij acceptione. Post quam augmentum est totum illud tempus quo tumor crescit, cū augmento doloris & caloris, vt Galen. visum est: status verò, cū omnia vigent, & in eo vigore perseverant: inclinatio, cū tumor subsidet, & imminuitur, & accidentia pariter, modò resoluitur humor, modò in pus vertatur. Tertia itaque principij acceptio concoctionis aut alterationis materiæ principium continet diuerso modo: quippe dum pars impletur, tumoremque iam habet conspicuum, crudus dicitur phlegmon & principium eius: dum verò crescit cum euidentiore calore & tumore, & fere adeptus est omnem magnitudinem, tunc crescere & coqui dicitur, quia pars durior & rubicundior apparet, cum sensu occultæ aut debilis vndositaris ad tactum. At quo tempore dolores & febres, atque tumores supra modum excrescunt, cum partis tensione & tumore magis exteso, incipit iam putredo mater-

Lib. de to-
tius mor.
acm.

materiam in feruorem agere, cum maiori calore, finis videtur augmenti, sicut dū hec omnia longē intensiora succrescunt, status quoad materię coctionem haberi debet. Quę sanē omnia curaturo necessaria existunt, vt exactē in quouis prędictorum temporum pręsidia propria & proficua adhibere discat.

Euentum itaque inflammationis salubrem fore, perniciosum, aut neutrum, facillē colliges, si coniec-
 ceris, sanguinē qui in particula aggregatur, vinci a natura, aut ipsam vincere, vel medio modo se habere. Si vincitur; vel resoluitur, vel suppuratur: si natura succumbit; corrumpitur, & simul pars sphacellatur, aut resoluta sanguinis tenuiori parte, neutrum sequitur, sed durities in parte remanet. Quorum vnumquodq; nosces ex accidētib; quę vel mox a principio apparent, vel postmodum sequuntur, vt tumore iam integram magnitudinem adepto, corruptionem ex mutatione coloris in subnigrū aut liuidum, perseverante magnitudine, cum nullo doloris sensu: duritiem ex leui tumoris evanescencia cum residua duritie & minore dolore.

Curaturo mihi phlegmonē legitimum & exquisitum, siue ex crasso, siue ex tenui fiat sanguine, varia se se obtulerunt consideranda, in vno tantum ministerio constituta, nimirum partē oportere a tumore liberare: quod facimus eversa materia quę fuit, vel euacuata quę fluxit, ablata prius causa quę fluxionem concitabat. Fieri hæc opera varijs modis efficit primò particula affecta: humoris cōditio: tumor factus vel fiens: eius magnitudo aut paruitas: modus generationis, aut per defluxū aut per congestionem: aut accidentium vehementia aut leuitas. His suppositis, primò curationem ag-

Pręsagium.

Curatio

Institutionum Chirurgicalium

predieris, remouēs motiuas fluxionis causas, si adhuc præfuerint. Sic dolorem mitigabis caloremq; in recipiente membro, aut in mādante vehemētia & irritamentū. Quod si possibile nō fuerit, aut tumoris augmentū & accidentia magis vrgeant, vniuersam curationem institues, sumpto exordio à materia antecedente (quantumuis necessarium sit morbum & accidentia simul prospicere) in qua considerabis copiam, imperum motus & qualitatem, ac rursus particulā à qua decidit, & in quam decumbit. Omnibus autem simul providebis, si debita vi-tæ & victus institutione vltus fueris, tanto exquisitiore & parca, quāto tumor maiorē minetur magnitudinem, aut præfuerit humoris copia: præstito vltu ad summum ex pullorum carne, ouis sorbilibus, lactucis aut scariolis, crudis vel elixis, aut pyris assis: porus ex aqua quantum permiserint vi-res, aut ventriculi integritas: eaq; exquisitiū obseruabis, si tumor ex interioribus fuerit. Conciliabis somnum, imperabis quietem & animi tranquillitatem, cū aeris tēperie quæ ad frigidum vergat.

Interim tamen dum hæc instituis, sanguinis copiam primò demes: nam eo facto impossibile est accidentia nō cessare. Sanguine igitur misso, quantum viresq; laborantis ferre possint, & postulatæ tum plenitudinis copia, tum verò tumoris magnitudo: nam sepe eius paruitas aut lenis abundantia, vel viriū tenuitas, victus parsimonia, aut frictionibus vel cucurbitis auferunt & delitescit: sin aliter copiosius sanguinem fundes: tum gratia demendæ plenitudinis, tum vt subsit locus repellentibus, aut discussorijs medicamentis, alioqui nō erit in pleno corpore vbi repellant, nec sine maiori attractione resoluētia quidquam efficiant,

nec suppūrantia citra corruptionis periculum adhiberi possunt. Itaque iteratō, aut tertio, vel vltra sanguinem detrahes, aut minus, prout postulauerit magnitudo mali, aut vbertas sanguinis. Neque id vtrunque & à quauis parte debet fieri, sed ex ea quæ citius plenitudinem demat, & longè magis fluentem sanguinē ad distantius auerrat: aut propinquius eum, qui in venis partis iam est deriuando euacuet. In qua re quatuor tibi erunt consideranda: primū quantitas, quā vt dictum est, demes, quo naturā auarior reddita minus transmittat ad affectā partem. Secundū imperus humoris fluentis, cui medeberis, reuulsa retractaq; materia fluente, ad quā distantissimas partes. Quippe reuulsio, imperus medella est: sic sanguinē mittes, à distantiori vel contraria parte, & tantō magis ad affectā accedes, quanto constitit fluxionem cessare. Denique in principio fluxionis, à vena quæ plenitudinem magis demat, protinus à distantiori, ac si vrget fluxionis impetus, à distantiori initium sumes: tum in sanguine mittēdo: tum verò in frictionibus, ligaturis, cucurbitis & extremarum partium lotionibus, nisi ibidē præsit tumor. Præterea vt deriuationē moliaris, parti affectæ accedes: quod tertio loco considerabis gratia deriuandi per proximam regionem, id quod prope partem læsam iam receptum est. Vltimò tamen contentum sanguinē in parte inflammata considerabis, quem vno è quatuor modis à parte affecta euacuare studebis.

Primò per repellentia auxilia: quorum tractationem & examē latius leges secundā harum Institutionū parte. Interim tamē sciro, repellētia esse auxilia, quæ frigiditate aut adstrictione, vel vtraq; simul prohibēt humorē ad partē amplius fluere, & fluxū

*Repul-
sio.*

Institutionum Chirurgicalium

ab ea iterum ad vasa repellunt & ad distantius auer-
tunt. Quo auxilij genere solum vrendum est in tu-
morum & fluxionū principio: licet etiam crescen-
te affectu eis vti oporteat, ceterū discussorijs ad-
mistis, vt loco citato reperies. Sed in inflammationi-
bus calidis & siccis refrigerantia & humectantia
satis sunt, presertim si pars calore exestuet: at si flu-
xio sit impetuosa, & pars calida & humida, quæ si-
mul refrigerant & adstringunt, presertim si laxæ
naturæ pars fuerit, aut laxior facta ob aliquā cau-
sam. Huius rei occasione scito repellentia esse duo-
rum generū (dimitto quæ calida sunt) frigida &
aquea, vt aqua, oxycratum, lactuca, oleū rosaceum,
violaceum, & lac: secundi generis sunt, plantago,
sanguis draconis, balaustii, myrtus & id genus:
quibus vtēris iuxta adductam rationem, sumēs ex
eis, aut decoctis harū rerū partes tres, olei partem
vnā, & aceti partem semissem. Valet etiam ad re-
pellendum aqua stillatitia rosarū, plantaginis, sola-
tri, & cucurbitę reliquis admista. Præstat idem be-
neficiū. q. r. aquæ rosarū & plantaginis, ana. ℥. ij.
succī solatri aut plantaginis. ℥. iiij. aceti rosari. ℥. f.
albumina duorum ouorū: conquassentur & agiten-
tur simul. Eiusdem vsus est ceratū ex rosaceo liqui-
dum: & cataplasma quod fit ex eodē cum lenticula
decocta, vel cum vitellis ouorū, aut cum toto ouo
& santhalis albis. Præstat & terra Samia cū faba co-
cta. Vehementiūs adhuc repellit cataplasma ex fa-
rina fabarū, vino rubro, & succo plantaginis: item
aliud q. r. foliorū plātaginis, rosarū, solatri & lactu-
cæ. ana. m. j. coquantur in aqua cū modico aceto, &
cum farina hordei & fabarum fiat cataplasma: ac
si dolor vrgeat, adijcies maluam aut papaueris ali-
quid. Sciendum est insuper, in omnibus tu-
mo-

moribus id esse verum atque exequendum; exceptis his casibus in quibus authores (quammis varij in hac re fuerint) ea adhibere venterunt. Sic in tumoribus præter naturam, qui in emunctorijs, vt post aures, sub alis & inguinibus adnascuntur, eis vti minimè licet: benè tamè si ex causa procatarctica prodierint, quantūvis neoterici contrariū sentiant. Præterea neque eis vtêris, vbi materia venenosa fuerit, aut critica, ad eam partem trāsmissa, nisi vel pars princeps sit, vel copia adeo grandis, quod vel pars periclitetur corruptione, aut laborans suffocatione. Quo tempore leuioribus & per intervalla vtêris & alijs admistis, cauens tamè ne adstringentia sint. Idem vereri oportet vbi materia admodum est in parte fixa & impacta, aut vbi nimis crassa est, vel tumor iuxta membrum aliquod princeps, aut corpus plenum existat, vel membrum affectū nimis debile, aut cum intenso dolore ex nimia copia factum: nā si ex calore prodierit, adhibenda sunt. Vltimò tamē cauendum est à repellentibus in corporibus senum: in quibus & in reliquis casibus, si flogosis & incendium plurimum vrgeat, leuioribus & per intervalla vti conceditur. Præterea in omnibus tumoribus in quibus repellendū est, statuere oportet quid debeat particulis affectis, quarū cōsiderare oportet naturam, situm, figuram, officiū, & reliqua quæ nata sunt mutare repellentium materiam, modum & quantitatem, ac tempus: quippe nec diu immorandum est in eis, ne in duritiem cōmigrēt tumor: nec in omnibus particulis eiusdem materię ea efficere oportet: alia enim desiderant repellentia oculorum inflammationes: alia necessaria sunt in angina: alia vltimò in auribus & capite. Præterea in calidis tumoribus semper actu frigida

Institutionum Chirurgicalium.

Semper actu frigida ea adhibebis, sepiusq; mutabis, ne incalescant.

Transacto autem principio, in quo sola sunt adhibenda repellentia, mox quæ resoluendi vires habeant admiscebis: nam quemadmodum illa proficua sunt, ne materia recipiatur in parte, aut ut receptam pellant: ita hæc nata sunt euacuare per diffusionem & insensibilem halitum, quod post repulsum impactum fixumque remanet in parte (ac forsitan, quia ad pulsum faciliorem præparant) quod cessurum non sit repulsui, neq; derivationi: & quanto morbus ad statum magis accesserit, tanto remittere oportet repellentia, & discussoria superaddere, donec in statu, si suppurationem non vereamur, solis resoluentibus viamur, ut mox docebo. Sciendum tamen est, transacto principio, modicum emollientium addendum esse, ne adstringentium ac resoluentium efficacia, in duritiem immediate mutetur humor, dum emollientia sint ex anodynorum genere: quod cenſeo magni fore momenti.

Verum si toto tempore augmenti viget necessitas mitigandi dolorem & reliqua accidentia, statuendum est, mitigatoria auxilia adhibenda esse, iuxta rationem causæ dolorem efficientis: nam si calor causam præstiterit, frigidis utendum erit; si utis densitas & tensio, quæ lenia sunt & humida. Vere anodyna dicta: si verò continui solutio, quia ea plerumq; ex plenitudine partis prodit, quæ vim habeat vel euacuandi, vel digerendi, vel sensum stupæ faciendi: quorum copiam reperies secunda harum Institutionum parte.

Secundò sanguinem contentum in parte, per resoluentia medicamenta euacuare studebis. Quæ
sanè

sanè sunt, quæ Gal. statuit nata esse, humorem qui in tumore continetur, per meatus insensibiles educere. Huius generis sunt omnia, quæ calida existunt, & moderatè humida, quæ quidem emolliunt partem & eius cutem laxant, poros aperiunt, & concretum humorem liquant, ac in halitum digerunt. Quæ profecto vtilia sunt humoribus in summa corporis superficie positis, & partibus etiã laxis & rarioribus, ac materia existente calida. Alia autem reperies efficaciora, quia calida sunt, & sicca forsàn tertio ordine, proficua quidem ad magnam resolutionem molendam, vel in humoribus crassioribus & difficilioris substantiæ, quorum copiam reperies secunda parte harum Institutionum. Interim tamen scito eis tumoribus esse adhibenda & eo tempore, cùm à repulsiu medicamento, aliquid relinquitur in parte, quod prædictis repellentibus non cedit. Namque rarò evenit, sanguinem ita tenuè & paucum esse, quòd omnino repulsiõni cedat. Consequeris enim gratiam ac beneficium his medicamentis resoluentibus, ubi sanguis admodum crassus & glutinosus nõ sit, nec vehemèter impactus, aut altius recõditus, & sub dura cute protectus: contra verò, reliquum digere oportet, modo liceat per vires, per calorem, per multitudinem: repudiat quoque dolor digerentia, nisi admodum lenia sint, sicut vehemèntiora, ubi sanguis crassior, & pars densior fuerit, & inflammatio mansuetior. Quorum occasio propriè est, dũ inflammatio remiserit, licet transacto principio eorũ aliquid admiscere oporteat, donec in statu præpositi digerentia, vel sola adhibeantur, situmorè in resolutione rēdere cōperiam, donec ex toto inclinet. Quippe licet staturũ sit in statu æquis portionibus repe-

Li. 1. m. 6.
th. c. 16.

Institutionum Chirurgicarum

repellentium & digerentium esse vtēdum: quia tamen in eo tempore nihil influit quod repulsi cedere possit, sed vniuersa materia iam fixa est, arbitror propositionem illam celebrē blandē & cum limitatione esse accipiendam, & instatu in quo resolutio expectatur, solis vtēdum fore resoluentibus, mitioribus tamen, ne incendium intendatur: quia propter forsan aliquid repellentium addi potest, non tamen eorum quæ verē repellentia sunt, sed frigidorum, & eorum quæ citra adstrictionem refrigerant. Sed his missis, quæ non sunt huius loci, in his tumoribus ex sanguine sæpe leuiora digerētia ex vſu existunt, ob adiunctum calorem: & sic mox adhibebis maluam, oleum rosaceū, althēam, fertulam campanam, camemalum, anethum, farinam hordei & fabarum, adipem suillam, gallinaceam, anferinam, & huius census alia: nam quæ valentiùs resoluunt, his tumoribus inutilia, aut forsan nocua existunt. Vti tamen poteris ex compositis eo quod fit ex passulis, cum pane & melle: item eo quod r. foliorum maluarum & althēæ, ana. m. j. florum camemali, melilori & rosarū ana p. j. radicū lilij albi, & althēæ ana. 3 j. farine hordei, quod satis, fiat cataplasma cū adipe gallinæ. Quod si feruidior fuerit tumor, ex vſu erit. q. r. micæ panis li. j. maceretur in aqua calida & cū tribus vncijs mellis fiat cataplasma, addito oleo camemali & rosarū. Fomentis etiam vtēris ex decocto camemali, rosarum, seminis lini & similium, donec tumoris extensio minuatur, & dolores mitiores fiāt, quo tēpore declinationē existimato: tunc enim efficacioribus discutiētibz vtēris, vt agresti malua cū passulis sine granis, & pane ac modico melle: itē lana succida, stupis spōgia vino calēti imbutis: atq; hæc exēpli gratia sine satis.

Quod

Quòd si his & alijs non videatur materia cedere, tertio materiam contentam sensibilibiter educe re curabis, si humor copiosus fuerit, crassus, glutinosus, valde inhærens aut alitùs permeans, vel cute duriuscula coopertus: qui sanè cùm digeri non possit, effundendus est, ne in corruptionem aut immedicabilem duritiem affectio materur. Quod facies vel apertis vicinioribus venis, vel scarificata parte, cùm dolor non subsidet, & tumor adhuc perseverat, ac postea curabis, si corpus præmunitum sit, sufficientibus euacuationibus partē fouere, quo faciliùs sanguis expiret: sed id cautè facies.

Verùm si ex signis prægressis (ex tensione nimium, pulsu, dolore, calore, horrore & febre, cùm ponderis sensu) constiterit, humorem nec indurari, nec resolui, nec repulsui cedere, arbitrandum est in pus mutari: quo tempore nondum omnino resoluentibus posthabitis, simul admiscenda sunt quæ vim habeant suppuratoriam: quorum quâtitas addenda est maior, quantum constiterit magis suppurari, & ob id à resoluentium vfu abstinendum tantisper, donec solis pus mouentibus utaris. Qualia debeant esse huic muneri proficua, leges capite proprio: interim tamen scito, pus mouentia esse calida & humida, cum vi emplastrica, & rursus esse calorem partis: suppurandæ simillima: item cuique hominû iuxta ætatem & temperamentum adhibenda sunt propria & peculiaria. Præterea pus mouere possunt, ea omnia quæ caloris excessum remittere possunt, aut supplere, si in membro deest. In quo manere plus minusve addere oportet, iuxta humoris suppurandi ideam. Quibus præmissis, suppuratiua phlegmones peculiaria sunt ex farina triticea, in aqua & oleo reperta & cocta, addito modico croco: hæc enim

Institutionum Chirurgicarum

Li. de the
ri. ad pis.
ca. 2.

enim calori nostro simillima sunt, & ipsam dissipari ob lentorem non permittunt. Aliud etiam si difficiliter in pus vertatur humor conficiens, ex radicibus althææ coctis & extractis per setam cum caricis pinguibus & farina triticea, vel hordeacea, si calor tumoris intērior fuerit: item aliud ex maluarū folijs coctis & pistatis cū butyro vaccino: atq; hæc exempli gratia sufficiant. Quod si collectum pus conieceris, abscesumq; iam esse factū: tunc profecto medicamento, scalpello aut ignito ferramento aperies, si adeo parua puris non sit portio, & ex subtili materia & cute rara, quod resolui facile possit. Verū si aliter fuerit, differre apertionē nō licet, ut cōsuluerat Gal. alioqui sinus corruptio & grauissima mala succrescent. Id quidem facies scalpello, aut ignito ferro, si tumor ex grandioribus sit, aut venis magnis plenus: causticis autē non vtēris, in profundis tumoribus, & cute densiori, neq; in tumoribus erodentium humorum, aut cū tumor fuerit prope mēbrum nobile, aut in extremitatibz, neq; vīquā, nisi laborans renuerit ignē aut ferrum. Sic apertionē facies iuxta villorum ductū, in loco eminentiori, & in parte eius decliui, cauēs venas & arterias grandiores, neruos, ligamēta & tendones: cauens etiam ne rugæ frontis te decipiat, quia villi contrario ductu inferuntur, nimirum ā supercilijs ad capillos. Præterea neq; ex toto in magnis tumoribus pus detrahes, nec orificium facies, nisi pro magnitudine tumoris: verūm si cutis praua sit coloris & tenuis, maius foramen efficies, quā in postula nerit tumor, quia tota cutis postea excidēda est. Cæterum licet tumor ex toto in pus versus non sit, non semper omnimoda suppuratio expectanda est: nam ante integram, ac forsam ante inceptam, li-

ccg

et apertionem moliri: præsertim ubi calor partis parvissimus est, & vigiliæ ac dolores adeo urgent, quod sperandum sit antea laborantem imbecillitate, quam fieri suppurationem: item ubi copiosior est humor, quam quod possit particula calor superare, & ob id corruptionem vereri oportet: præsertim cum pars parvissima est, ut digitus: item cum humor est crassus & profundus, aut tumor ex venenosis est, vel prope articulum, aut iuxta nervos, arterias aut venas grandiores, quæ putrefieri facile possunt. Aperto tamen foramine, velut vlcus curari debet, ipsum exsiccando ac circa dolorē detergendo, ut latius inferius leges.

Ex sanguine maligno & feruidissimo oritur carbo seu carbunculus, antrax à Græcis dictus, cum pruritu in principio, & mox apparet crusta, una aut plures, vel sine ipsa cutis exulceratur cum colore nigro aut cinericio, vel citrino aut viridi, quæ omnia succrescunt cum somno, & horripilatione, monstrantia summam malignitatem ac feruorem: siquidem præter id quod crustam, seu crustas plures secum affert, haud secus quàm si igne cutis ureretur, subiectam carnem veluti emortuam habet huiusmodi tumor, ob summam ac feruidam inflammationem, quæ ob id colore nigrescit, splendetque yuuminis ac picis modo, qualis bilis atræ color est: quo fit, ut grauis & molestus dolor laboranti succrescat, quasi particula vinculis ignitis, aut ferramento aliquo esset cōstricta, aut cū febre ingentissima & æstuosa atque cordis tremore, palpiratione, & frequenti animæ defectione, nausea quoque, & frequenti vomitu, maxime si venenositas accedat.

*De tunc
more ex
maligno
sanguine.*

Huius mali causæ (præter indebitam vitæ, & Causa.
vicius

Institutionum Chirurgicalium

videtur institutionem) sunt sanguis feruidissimus & crassus, & ob id multi ex atra bile ob sanguinis institutionem facta, asseruerunt fieri. Pars enim sanguinis crassior cum putrescens effervescit, vertitur in atram bilem: quo fit ut ad curē vergens, non tantum exulceret, sed etiam adurat, & crustam efficiat, tantoque maiorem & feruidiorem, quāto carbunculus exquisitior fuerit: aut minorem si alteri humori adiungatur. Quo fit, ut ex carbunculis, quidā sint maiores, quidam, ut exquisiti, scuiores, sed ferē omnes venenosi ac pustulāres & perniciosi: præsertim si in enunctorijs, & prope partem principem suboriantur, longē tamen deteriores, si subito evanescant.

Curatio

de morbo

carbunculi

in genis

Magni & scvissimi huius morbi curatio sita potissimum est (præter debitam & refrigerantem victus & vitæ institutionem, ex acidis cibarijs & medicamentis commissam) in causæ extirpatione, & correctione accidentium, quæ gravissima sunt. Causa autem duplex cognoscitur: antecedens, quæ feruidus sanguis est, & coniuncta: hæc quidem topica desiderat auxilia: illa verò providentiam per evacuationem & attemperantiam. Quorum primum sit sanguinis missione tanquam præcipuo auxilio: quippe his affectionibus statim & copiosē necessum est sanguinem mittere, aut iteratō, donec fluxionem cessasse comperiamus, vel saltem quantum vires tolerauerint. Quo factō, præmissa humoris præparatione per acida & refrigerantia medicamenta, nulla expectata coctione, purgabis lenientibus & mansuetis pharmacis, ut manna diluta in sero lactis, aut ad summum in diluto rhabarbari, cassia fistula, aut syrupo ex infusionibus violarum, &c.

Præmissa totius corporis providentia, ad topica auxilia

Auxiliate conferes, & interim etiam dum pūrgamus, aut sanguinem mittimus: cauens ne repellentibus siue frigidis, siue adstringentibus vtaris, nisi in circuitu ipsius partis, aut si fluxio grandior fuerit, supra partem affectam, ne ad eam amplius fluat. Primo enim accessu partem tumentem in circuitu scarificabis profundioribus plagis, aut sanguifugas adhibebis, postea oxirato tepēte ablues, quo facilius venenosi ille sanguis per eas spiraret. Quod si nō quereuerint accidentia, aut malum subfederit, secundo & tertio scarificabis, donec accidentia mīrescant: sin aliter, igne vtēris potius quā causticis, nisi iam caro computruisset: tunc enim primo accessu vitellum oui cū sale adhibebis, aut vnguentum Aegyptiacum, vel theriacam cum puluere gentianę, aut trochiscos Vigonis. Cū hoc tamen semper admiscere oportet, quā attemperandi vim habeāt, ne calor feruidior reddatur: postea verò emplastrū contra esthiomenum, desuper appones: item emplastrū arnoglossę, vel de malis Punicis, maximē transacto impetu mali, cataplasma ex orobi farina & oximellitē, præsertim post vitiōnem, si ad id peruenire cōegerit rei necessitas: quā non superficiale, sed profundam facies. Præterea scaram & carbonem extrahes radice liliorum alborum & folijs caulium cum butyro recenti, aut oui vitello cum butyro: & exempli gratia hæc dixisse sit satis.

Post carbunculi extractionem considerabis, crustosum ne vlcus remaneat, saniosum aut corruptum: nam iuxta cuiusq; indigentiam præsidia adhibebis. Parabis crustoso butyrum recens aut axungiam porcina cum modico vnguento rosaceo: vel emplastrum q. r. farina triticeę & hordeaceę

Institutionum Chirurgicarum

ana. 3. iij. cum decocto maluarum, violarum & altheæ fiat emplastrum, addito butyro recēti & duobus vitellis ouorū. Si verò saniosum supersit vlcus absterges & modicē exsiccabis, vt suo loco leges. Verūm si corruptum & putridum sit, sectione vtēris, cauterio & auulsione instrumento idoneo, vel medicamentis corruptionem extirpabis, leuioribus vt pastillis Andronis, Musæ, Pasonis aut Polijde. Itē vnguento AEgyptiaco, aut fortioribus vtēris, vt radice dracunculi, arsenico, vel radice aristolochiæ aceto trita, cū aqua argentariorū madefacta aut irrorata, & alijs huius naturę. Postea verò corruptione separata, mundificatio de apio vtēris, donec ex toto semoueaturs corruptū: & tandem reliqua adhibebis, vt in vlcera curatione latius scriptum reperies.

Mortificatus sanguis

Tertio loco ex sanguine, ceterum mortificato, & eius calore extincto tumores fiunt quos Medici appellant, gangrenam, sphacellam, seu esthiomenon, & alij herpera esthiomenon, seu ignē sancti Antonij. Est quidem gangrena mortificatio ex magnitudine inflammationum, nondum tamē integrē facta, sed aliquantulum sensum in se retinēs, & carnosus partibus adueniens. Sphacellus verò seu sideratio, vel esthiomenon, est integra sensus priuatio arque mortificatio, ita vt percussum, vel sectum, vel vstum, non sentiat pars quæ patitur, non solum in carnosus partibus, sed etiam nervosis vsque ad ossa: gangrena verò ossibus non succrescit. Fit tamen vno e tribus modis, nimirum, quando adeo dissoluta est mistio substantiæ ob corruptionem, quod vitam & spiritum à corde transmissum amplius recipere nequeat, dissoluta
mistione,

missione, vel ob impensam frigiditatem aut medicamentorum, aut externam, vel ab ingente calore aut maligno. Secundo modo, quando calor suffocatur, vt in magnis inflammationibus. Tertio ob priuationem transitus spirituum vitalium ad membrum, vt in comprehensionibus, aut ligaturis & conuulsionibus.

Huius mali cognitio, præsertim gangrenæ, constat ex priuatione sensus non integra, ex nigro seu liuido colore membri extincto florido colore phlegmonis: item ex dolore, calore ingenti, & pulsatione arteriarum. Sphacellum monstrat priuatio sensus integra, color niger, pars, affecta mollis, putrida, foetida, cadauerola, quæ digitis cedit & non reuertitur. **Cognitio.**

Causa antecedens plerumque est sanguis auctus, acutus & corruptus ac conculcatus, quæ præ copia, aut malitia superare calor partis nequit, quinimò ab eodem sanguine suffocatur & vincitur partis natura. Prodit etiam ab externis causis, vt frigiditate nimia, medicamento vltra modum & partis calore frigido: à calore etiam immodico: à venenosa qualitate: item ligatura, conuulsione aut compressione, quæ vitalem facultatem & calorem innatum extinguere nara sint: quo fit, vt sæpe pars emolliatur, & fiat album esthiomenon à nonnullis appellatum, factum à mortificatione caloris, & citra humoris suffocantis affluxum, sed sola dissipatione aut extinctione. **Causa.**

Hos sanè affectus nisi celerrimè & initio statim curare agrediaris, laboras particula facile emoriatur, & vicinas inuadet, atque hominem ipsum interimet. Quòd si mox manū adhibeas, difficillimū non erit, præsertim in corpore iuuenili, curare. Nam **Præsignium.**

Institutionum Chirurgicarum

ubi partes affectæ, caro & nervi usque ad ossa lædantur, curari nequeunt: quo fit ut gangrena difficulter curetur, sphacelus non nisi post sectionem.

Curatio

Considerabis diligenter ad curationem horum affectuum qui sæuissimi sunt, causam morbi, partem affectam, & accidentia quæ succrescunt. Quippe si frigus fuerit, temperare foribus aquæ vitæ, aut vini feruentis partem oportet, non scarificare: aut partem sub fimo calido & feruido recodere: si virus causam præstat, remouere oportet: si putredo, auferenda: si venenositas, alexipharmacis compescenda. Verum si sanguinis vberitas suffocationem molitur, sanguinis qui influit & paratus est fluere, efferuescentiam compescere oportet victu refrigerante, ut pane loro hordeaceo, amygdalato, iure pulli, lactuca, portulaca, scariola, decoctis, tandem potu frigido, aut medicamentis & serapijs frigidis, ut syrupo acetosæ, intybi, granarorum, borraginis & similibus. Interim tamen sanguinis quantitatem demes scissa vena, pro viriù tolerantia, quia affectus causa copiosius extrahi exposcit, sed ob spirituum dispendium, & alia accidentia, iteratò præstat ac resectis viribus extrahere, quàm seniel & conferunt. Quo facto corpus purgabis casia, māna, catholico, syrupo ex infusionibus violarum cū modico rhabbaro, in sero lactis diluto, aut in aqua hordei vel cucurbitæ.

Interim tamen dum hæc fiunt, primò pars circumiacens munienda est vnguento ex bolo, aut eo q. r. olei rosarū & myrtini ana. ℥. iiij. succi plāraginis & solatri ana. ℥. i. coquantur usque ad consumptionem succorum, & adde ceræ albe. ℥. j. f. farinæ fauarum, lentium & hordei ana. ℥. f. boli. ℥. j. pulueris myrti

myrti. 3. f. misce & fiat vnguentum. Quo facto ad coniunctæ materiæ extirpationē te cōteres: ac si partem sensu priuari, aut minus solito sentire cognoueris, mox à principio id opus aggredieris: celeriter enim membrum sphacelatur. Quod facies parte, vsq; ad sanam, altè & donec sentiat laborans scarificata, & abluta aqua salsa. Deinceps verò medicamentis vtēris, quæ corruptionem inhi beant, & calorem natium rucatur, vt emplastrum supra omnem partem appositum, ex farina erui cū melle, aceto, farina orobi, fanarum vel lolij, cum oximellite & lupinorum decocto. Supra vlcus etiam quæ exsiccare vehementer possint, adhibebis, vt pastillos Andronis, Muscæ & similium: ac si malum adhuc serpat, quæ vehementius siccant, quale est, vnguentum AEgyptiacum, vnguentum rubrum, aut Arsenicum, vel aqua argeptariorum, quæ maioris solet esse efficacitæ: item aliud quod. r. æruginis, minij, aluminis ana. 3. j. cū aqua terantur, & parti affectæ applicentur, parte exasperata scalpello, serua ta corporis natura & conditione: nā vehemētiora validioribus corporibus, & debiliora imbecillimis sunt adhibenda. Quod si hæc omnia nō profuerint, ferro candenti partem inurere ad sanam vsque oportet, & scaram adseruare, donec compertas putredinem cessasse, cauēs ne subtrus latetret putredo. Verū si ne hæc quidem prodesse videantur, sphacelatum membrum, antequam ad sanam partem se se extendat corruptio, abscindere oportet, & post abscissionem ferro candenti inurere, & succo porri illinire cū sale. Quo facto, si sanguinis profuuiū subsequatur, partem quæ corruptæ adiuncta est, adurere oportet: ita enim & putredini, & fluxui subuenies. Postea verò, putredine iā cessare,

Institutionum Chirurgicarum

crustra excidenda est butyro, pane, farina triticea vel hordeacea cum apio trito & hydræleo incocta, cautè tamen crustram mouebis, vbi sanguinis præfuit fluxio. Deinceps vlcus purulentum absterges mundificatiuo. q. r. mellis li. i. vitellorum ouorum num. ij. farine hordei lib. s. misce & vttere, ac post triduum adde myrrhæ. 3. x. vel vttere eo quod fit ex farina orobi cum melle & thure. Quod si dolor vrgeat, folijs fauarum inuersis mirum in modum ipsum mitigabis.

De aneurismate

Lib. diff.

Superest inter sanguinis tumores alter minoris momenti, & certioris periculi, quem remedijs cedere, aut raro aut nusquam visum est: appellatur aneurisma, & apud Auicem mater sanguinis. Quem sanè affectum Galen. dixit esse relationem aut dispersionem materię sub carne, per diffultationem se se diffundentis distribuentisque ob arterię dilationem aut disruptionem. Quem fieri vno è duobus modis euidentissimum est: primo disrupta aut aperta interiori arteriarum tunica, externa integra manente, qua colligitur spirituosus ille sanguis, & vicinas partes in tumorem pulsantem eleuat: aut vtraque tunica scalpello pucta, sed aut extima agglutinata, aut intra ipsam manente ipso sanguine, collecto in partibus vicinis, quas in tumorem quoque pulsantem eleuat. Differt ab omnibus alijs tumoribus aneurisma, quod in eo curis color non mutetur, & rursus, quia cum pulsatione vt arteria, semper reperitur, quod nulli alteri ex tumoribus accidit.

Cura ratio.

Huic medeberis, non per apertionem, meruenda enim semper est, ac fugienda, tanquam præiudicia

ludium proximæ mortis . Superfunt tantum duo
præsidia: alterum constat medicamentis adstringen-
gentibus (aut refrigerantibus, ut nix, mox à prin-
cipio apertionis, maxime si extra feratur spiritus
ob incuriam artificis in venæ scissione) quale est
emplastrum cupressi Aetij : emplastrum contra
rupturam depelle arietina, & alia id genus: reli-
quum, si id non profuerit, considera esse, arteriam
laqueare duabus partibus, si commodè fieri possit,
& postea per medium scindere. Quod licet dictu
facile sit, difficillimè quidem fieri potest: tū quia
nequit laqueari commodè, nisi aneurisma sit in pli-
catura brachij (aut parte alia ubi conspicua sit
arteria) quo tempore ligare oportet supra ipsam
plicaturam: tum verò quia veritus est Galen. ne
vel fluxus immodicus superueniat, vel pars gan- li. 5. me.
grena periclitetur, & ob id quaerenda est arteria
loco conspicuo, ac leuiter detegenda, & acu in-
curuo subrus ipsam traiecto, filo ea parte est al-
liganda: idem & eodem modo paulò inferius
facito, vnius digiti spatio relicto inter vtram-
que ligaturam, & postea per medium vtriusque
ligaturæ arteriam transversum scindes: & curabis
ut vtrumque foramen coalescat, & caro re-
generetur. Atque is est præstantior mo-
dus deligandi, si prudenter &
cautè feceris.

Institutionum Chirurgicalium
DE ERYSIPELATE, ET
alijs tumoribus ex bile
INSTITVTIO. V.



Rysipelas est biliofa fluxio-
 nis germen, circa cutem
 vtramque maximè confi-
 stens. Prætermisissis autho-
 rum controuersijs de no-
 mine huius affectus, statu-
 rum apud plerosque repe-
 rio, verè & propriè hunc
 tumorem biliosum, fuisse

ignem sacrum nuncupatum, propriamque esse cu-
 tis affectionem, si verum ac legitimum sit erysipe-
 las: sin aliter, carnem quoque ipsam attingere, atque
 esse de genere tumorum præter naturam, constareque
 ex eisdem morbis, vitio nimirum figuræ, solutæ v-
 nitatis, & calidæ intemperiei adeo inrensæ, vt iure
 optimo nomen ignis sacri adipiscatur.

Signa.

Quo fit, vt præ se ferat colorem rubicundum in-
 flauum vergentem, & delitescentem tactu: tumorè
 item exiguum, in cute potius consistentem, cum fe-
 bre vehementi, tertianæ naturam referente, dolo-
 reque mordicante & pungente cum horripilationi-
 bus ferè per omne tempus febris, donec euidenter
 appareat per cutem extensus tumor.

Causæ.

Causas habet erysipelas, vt reliqui rumores: ex-
 ternas, quas consultò prætereo, quia tunc sat est no-
 uisse circa enacnationem, sola alteratione esse vren-
 dum. Item antecedentes & coniunctas, sed omnes
 vnius rationis & naturæ, quæ solo differunt loco.

Quip-

Quippe antecedentes in vasis humorum existunt, fluxuræ in partem affectam: coniunctæ iam erysipelas efficiunt: omnes tamen ad biliosum humorem reductæ. In qua re, prætermiffa authorum controverfia de natura humoris biliosi, statuendam erit, flauæ bilis in nostris corporibus secundum naturam duplicem esse sortem: alteram quam separat natura in cistim fellis, & ad intestina transmittit tanquam alioni inutile, flauam peculiari nomine nuncupatam: reliquam verò flauam etiã, sed tenuiorẽ, mäsuetiorẽ, & quæ solùm à sanguinis tenuis natura conditionibus dissidet, nimirum colore & calore: nam substantia etiam est alimentosa vt sanguis, ita vt iure optimo à Gal. tenuis sanguis fuerit nuncupata, & pro sanguine à plerisque habita. Quo fit vt multi arbitrentur, erysipelas ab eo ortum ex sanguine fieri, & Gal. etiam protulit. Sed re vera ex sanguine, vt sanguis est, nulla lege erysipelas fieri potest, quamuis tenuissimus sit, sed solùm levis quidam phlegmon, nisi sanguis ille adeo feruidus sit, quod eius subtile in bilem versum, erysipelas efficiat: quo tempore iam non ex sanguine, sed ex bile à sanguine facto suborietur. Itaque erysipelas legitimè & exquisitè sumptum, solùm proficiscitur à bile naturali, illa quidem quæ alimentosa est, & ferè sanguinis altera pars, & vna ex quatuor substantijs, quibus sanguis constat, prout massa sanguinaria dicitur: quæ sanè, vbi ob aliquam occasionem contrahit calorem aut feruorem, protinus à venis pellitur, & cutim adiens, erysipelas concitat exquisitum.

Quibus præmissis, statuendum est, erysipelas duplicis esse naturæ: alterum exquisitum & legitimum, quale nuper diximus, & reliquum spurium & illegitimum: hunc verò mille modis fieri constat: primo

Institutionum Chirurgicarum

ex bile flaua naturali, ea nimirum, quam separat ad
cistim fellis natura, quę vasa irruens ob aliquod
erratum, vbi copiam aut vitium contraxerit, vel fe-
brem concitat, vel pulsa ad cutem erysipelas effi-
cit, quod Medici omnes herpetem exedentem seu
esthiomenon, ac si tenuis fuerit esthiomenosum
& corrosiuum, quę sanè erysipelata appellant vl-
cerata ac pustulosa & corrosiua. Quod si prædi-
ctus humor crassior fuerit, & maiorem vstionem
passus, tunc quidem phagedenæ nūcupantur: hoc
est, erysipelas cum exulceratione & corrosione, nō
solum cutis, verum & subiectę carnis. Quod si ad-
huc crassior fuerit prædicta bilis per vstionem fa-
cta, corrosiuas pustulas, seu maligna vlcera atque
cancrosa progignit. Aliter verò efficitur spurium
erysipelas, nimirum cū bilis, siue alimentosa, siue
excrementitia, alicui reliquorum humorum asso-
ciatur, vt tumorem efficiat, & sic suboritur, dū san-
guis cum ea profluit, erysipelas phlegmonodes, aut
œdematodes si pituita, vel scirrholes si melācho-
lia, vt antea latius exposuimus.

Quo fit, vt vniuersum hoc caput duabus tan-
tū constet partibus: altera continente erysipelas
exquisitū ac legitimū: reliqua verò spurium ob
flauę bilis vitium: nam tertia quę varijs humo-
ribus adiunctis constat, mixtam desiderat curatio-
nem, quam qui simplicem cuiusq; tumoris cogno-
uerit, facile assequetur.

*Præsa-
gium.*

Est profectō erysipelas omne si intra viscera &
corporis cauitates adnascatur, aut retrocedat ab
extimis, omnino lethale: si verò exterius, grauius
existit in capite prodiens, & periculosissimū quod
in gutture & faucibus, vel sub lingua, aut prope di-
ctas partes: & vbi cūq; fuerit, grauiusima sympto-
ma.

mata, si in putredinem commigret, solet concitare: in omnibus tamen melius est resolui, quam in pus verti. Illud tamen quod ex bile excrementitia fit, grauissimum comperimus & periculosum, quia excrementitia bilis sanguini admiscetur: quo fit, ut intus viscera lædatur: quod illi non contingit, quod ex alimentaria bile prodit: quippe inter salubres annumeratur affectus, quia ab intimis corporis partibus & medulla ad extrema emittitur bilis feruidior facta.

Quam difficile sit inculparam in erysipelate instituere curationem, nemo ignorabit eorum, qui eius naturam, conditionem & quotidianos euentus diligenter intueatur. Quippe plura citra auxiliares manus in pristinam regrediuntur sanitatem, sola bilis ad cutem effusione: alia vel refrigerantibus solis adhibitis: nonnulla periculosa & grauissimis accidentibus insignita, nisi copiose sanguinem miseris: sicut alia vel cumleuiter extracto: ex quibus multi copioso emissio, pereunt, & alij suffocati sunt præ copia sanguinis. Item repellentium ministerio multi salutem pristinam recuperarunt: alij in grauiiores & internos affectus deuenerunt: si cut alij sanitati restituti sunt, nullo auxilio appposito, sed solo sanguine misso. Præterea inuātur nonnulli expurgati cholagogo exhibito, & alijs vel turbantur humores, vel retrocedit ad viscera comota bilis: quo fit, ut ex salubri affectione (quod curanea fit) præsidiorum usu aut defectu mille modis fiat grauis & mille periculis plena: quod sanè ex disferentia nuper adducta proficisci arbitror.

Considerabis itaque primum, ut hæc mala præcaueas, huiusmodi affectum fieri ex feruidissima bile: quem sanè feruorem non solum contrahit in

Curatio

tumore

Institutionum Chirurgicarum

tumore ipso, verum secum defert à venis & membro mandante: cuius ratione ab eo, aut ab vniuerso corpore in affectā partē truditur, cuius etiā calore febris feruidissima succeditur, lōgè magis quā ex calore contracto in tumore, licet non parum iuuat. Præterea siue bilis sit naturalis & alimentosa, quæ exquisitum constituit erysipelas, siue flaua & excrementaria, & copiam maiorem nata, quā par sit, ita vt quantitate & calore peccet, cū sanguini sit admixta, euidentissimum est, per maiores venas ad minores & ad cutem peruenire: quo tempore necessum est, huic copię & motui præuenire sanguine misso, id quæ triplici ratione: prima gratia deponendi copiam: item beneficio ventilationis: quod sanguine extracto commodius exequimur, quantumvis erysipelas sit exquisitum, tumore ferè carens, & plurimum serpens, ac ingentem protinus concitet calorem. Secunda, sanguis mittendus est, quo fluxio ab affecta parte facilius auertatur: cuius indicationis gratia, tanto copiosius extrahes, quanto constiterit tumorem esse extensum, & partem affectam vel principem, vel prope ipsam. Tertia, sanguinem mittes audaciùs, si constiterit phlegmonosum esse tumorem, tantoque copiosius, quanto sanguinis copia præualuerit supra bilis abundantiam. Quibus consideratis, facile erit nosse, habito respectu ad corporis morbosum apparatus, & ad particulam affectam, ex quo loco sanguis sit mittendus: nam apparatus morbosum depones basilica secta: partem affectam respicies sanguine ex communi vena, aut humeraria misso: inferiore verò ex eadē basilica, aut ex talo, sic & copiam depones & feruorem extinguēs.

Verum

Verum quia sæpius bilem prædicto feruore magis quam copia peccare comperimus, compefcere in venis securius exiftit, quàm in affecta parte. Quo fit, vt duo fuperfint fanguine miffo, aut interim cum mittitur efficienda: alterum ipfam ferapijs. & pomonibus frigidis docet compefcere, quibus frænatur & minus mobilis efficitur, vt ferapio acetoso, acerosæ, violaceo, granatorum, rofarum, vel de cichorio, copiofa aqua deaurata fuper iniecta, aut stillatina ex eisdem herbis, vel fero lactis. Nec displicet ex eisdem cum tamarindis & hordeo apozema conficere, quod partim refrigeret, & partim euacuet. Vtcrius dorsum refrigerabis vnguento refrigerate Galaciacur santhalino & rofaceo, fuper politis linteis aqua rofarum, intybi & cucurbitæ cum modico aceto & pulueribus santhalorum rubeorum madidis. Reliquum verò in ftitui euacuationis modum per expurgas medicamentum, quod maioris folet effe momenti. Nam vulgariffimum est, in eryfipilate exquisito, magis effe purgandum, ficut in phlegmonoso longe copiofius fanguinem effe mittendum. In qua re ftatuendum est, in exquisito eryfipelate, quod ex bile alimentofa prodiit, purgandum quidem effe (fanguine miffo vt diximus) cæterum neque subito neque confertim, neque mox à principio. Quippe cum huiusmodi fuccus adeo fit fanguine admiftus & associatus, fi vehementer purges, proculdubio vniuerfam maffam fanguinis turbabis, & forfan parum educes: ut fi mox à principio id aggrediaris, longe minus efficies, quia nihil aut parum bilis, vel faltem id folum, quod eius ad cutim tranfmittit, natura feparabit, & ad vifcera reuocabit. Quo fit, vt non nifi in fine augmenti, & leuiffimis medicamentis, id liceat fieri. In quo cafu tranfacto principio, & apparentibus fignis copio-

fioris

Institutionum Chirurgicarum

fioris bilis non eo inficias purgandum fore: sed rã-
rò in hoc exquisito erysipelate tãta bilis copra cõ-
geritur, quodd necessario id teneamur efficere, qui-
nimo cauere, ne fiat retrocessus ad viscera & prin-
cipaliora membra: quod in hoc malo summoperẽ
vereri oportet, Secus tamẽ res se habet, vbi ex fla-
ua bile venas maiores ingressa erysipelas subori-
tur: quippe tũ copiosius purgare studebis, tãto ci-
tius, quãto exquisitius fuerit erysipelas: aut tardius,
quãto sanguinis plũ admistũ: quo fit, vt trãfacto pri-
mo mali impetu, & sanguine misso (quo subit locũ
medicamento purgãti) ipso vtẽris, porrigẽs mannã
aut cassiã, vel serapiũ ex infusionib9 violarũ aut ro-
sarũ cũ diluto rhabarbari factõ in aqua hordei vel
cichorij, vel quauis alia refrigeranti: & vt cunque
sit, semper alius turbanda est clysmatis, tum blan-
dis & attemperantibus, tũ acrioribus, quæ ad infe-
ras sedes euocent bilem & aliquid eius expurgent,
reuocata consuetudine transmissionis eius ad in-
testina. Quamobrem in viroque erysipelate, siue
exquisito, ex alimentaria bile, siue ex excrementicia
fiat, laudo summoperẽ, cũ serapiũ tertio vel quar-
to quoque die dilutũ rhabarbari admiscere, quo ad
intestina reuocetur bilis & ei9 aliquid extrahatur.
In quo opere nõ oportet vereri retrocessum bilis
euntis ad cutem & per venas paruas, quia vis medi-
camenti illuc non pertingit: sed solũ euocatur
illuc iura bilis, ad consuetum locum, puta ad in-
testina. Quinimo id expedit, quia tendit excremen-
ticia bilis quò non oportet cum periculo maiori,
quã si ad intestina dilaberetur. At in bile alimen-
tosa non est ita tutum ad viscera reuocare, nisi vt
dignum est, urgente necessitate, aut paulatim.
Quibus factis, facile erit nosse quid in parte affe-
cta

Et agendum sit, quod maius solet facessere negotium. Quippe nil vulgarius reperies, quā mox repellēribus utendū esse: aliquando adtringentibus. non nunquā modicē ac in totū frigidis. Ex altera parte stat morbū esse cutaneum ex transmissione biliosi humoris à visceribus, ob idque nulla lege esse repellendum. Nam qua ratione damnauerat Hippoc. erysipelatis retrocessum, eādem repulsum omnino refugere oportebit. In qua hāsitatione duo mihi se se offerunt consideranda: alterum est, fluentis humoris ad cutem impetus & morus: reliquam verò effervescētia, calor & exustio. Sic aduersus motum, ut qui à visceribus fiat ad cutem, agendum nihil est per repulsionem: nullam enim partem infirmiorē cute ipsa reperies: quo fit, ut repellendus non sit intro humor; facile enim ea parte resoluetur dissipabiturque vel nullo præsisto auxilio. Verū tamen huius auxilij loco impetum aliō transferes, & ad diuersas partes diuerteris, quo minus læder, & facilius attemperabitur à natura mīstione reliquorum humorum. Quod exqueris facile cucurbitis scarificatis aut siccis, frictionibus, ligaturis, & extremarum partium lotionibus iterumque iterum factis. Ceterū aduersus qualitātē & feruorem atque acrimoniam humoris, rationabile est, refrigerantia & humectantia præstare auxilia, ne vel in corruptionem humoris & partes in exulcerationem degenerent. Quo fit, ut iure optimo consulerint authores partē fouere aqua cucurbitę, lacte, aqua maluarū, solani, sempernuij, portulacę, lactucę, sedi, in ybi, lenticultę palustris, & similiu. Cum hoc tamen si in capite erysipelas adnascatur, in collo, ē regione cordis aut vetriculi, nulla lege eis uteris: nam licet adstringētia non

Institutionum Chirurgicarum

non sint, quodammodo repellunt frigiditate propria: quod vereri in alijs partibus non licet, quia repulsi non fiet ad principalius membrum, sicut in partibus prædictis, quia facilis est via & brevis à cute ad intima cerebri, cordis, aut faucium. In quo sanè refrigerationis ministerio solum perstadium est, donec cutis colorem acquirat naturalem, cavendumq; ne ad liorè perueniat, aut scirrhus aut duritiem: quod iure optimo omnes auctores verentur.

Cessante autem fluxione, & corporis præhabita sufficienti providentia, tum per sanguinis missionem, tum verò per expurgans medicamentum, ac per eam victus & vitæ institutionem, quæ ad frigidum & humidum vergat, habita temporis & gratiæ ac virium ratione, euidentissimum est materiam in parte contentam securius resolui posse, quam repelli, & ob id aqua repenti cum modico vino fouenda est, vel decocto foliorum althææ, meliori, maluarum, & similium, cum vino aut secus. Nec defuncti qui emplastra huic vsui parare studeant, sed quæ diffinitionem remorentur summopere cauenda sunt: suppurari enim aut exulcerari erysipelas, periculolum & graue est: secus res se habet, si affectus ob admisionem alterius humoris id exposculet, tunc enim iam non est præsentis instituti.

De herpete.

Ad genus erysipelatis pertinet alia tumoris biliosi fors, quam Græci appellant herpetem, Latini gnam lacrum, Auicenna & fere omnes Barbari, fornicam: non quidem eam quam Græci appellant mmeccias, & acrochordonas, Hispani verò culebrilla. Herpes igitur est, quando flaua bilis non naturalis, sola & secreta in particulam aliquam confluit, atque

atque ibidem consistit, quæ si crassior sit acriorq;
totam exulcerat cutem vsque ad carnem suppositam, & tunc vocatur herpes exedens seu depascens.
In cuius tumoris enodatione expendendū est, fieri quoque à bile, vt erysipelas, cæterum non ab alimētosa, sed ab excrementitia, vt erysipelas illegitimum & vlcerosum aut pustulosum, quod his rationibus illegitimum efficitur, quantumvis à sola bile fiat. Verum hanc arbitramur differentia, quod hoc illegitimum erysipelas sæpius fit à crassiore bile, quam legitimum ex bile excrementitia, quæ nondum crassa, & vitiosa facta est: verum herpes semper à tenuiori magis quàm erysipelas legitimū, aut spurium, quia ob id ad summā vsq; cutē ascendit, ibidemq; se extendit ac serpit. Verum si quis rem hanc diligentius pēficeret, ac velit authorū contentionem dirimere, reperiet, herpes esse in triplici differentia: prima simpliciter dicta est sola asperitas cutis extimæ, ad differentia erysipelatis, quod infimam & aliquando subiectam carnem depascitur, quæ nullum videtur eleuare tumorem, cum immoderato calore: cum hoc tamen minori, quàm in erysipelate, quia minor est materiæ copia, & ipsa tenuior, & ob id calor minus efficax. Secunda herpetis species cum vlcere coniungitur, & ab Hipp. herpes exedens, seu depascens dicitur, quod totā cutē vsq; ad subiectā carnem depascatur: in quo à phagedæna videtur differre parū, quod carnem quoq; ipsam exedat: quæ speciem Gal. herpetis esthiomæ non appellauit. Tertia verò & vltima, cū prædictū herpes iungitur pustulis quibusdam paruulis, & earatione appellatur à plerisq; herpes miliaris, quod pustule illæ granis milij assimulantur: sit interdum vt pustule illæ abrumpantur & fiat vlcerarū herpes.

Libr. 5.
apho. 22.

Li. 4. me
thod.

D Hanc

Institutionum Chirurgicalium

Lib. 2. ad
Glauc.

Hunc sanè miliarè cōstat Gal. v. sarpasse pro genere: sed clarior est præscripta diuisio. Differūt etiā prædicti tumores causa: nam licèt biliosus humor omnibus sit communis, nihilominus tamē herpetis solūm exasperantis cutem, causa existit bilis excrementitia, tenuissima & scaldida: vlcerosi verò eadē, sed crassior facta, & calidior atque acrior: eius quidem quod miliarē appellant, eadem, sed admixta tenuissima & aquosa pituita vel sero.

2. prædi.

Nec parui est in omēti Hipp. sententia, quatenus pertinet ad horū affectuū præsagium. Quippe inquit: Herpetes autē minimè omniū vlceru, quæ de pascendo proserpūt, periculosi sunt, verū maximè difficulter semoueri possunt, cūemadmodū cancri oculi. Præterea boni præsaga est febris vnius diei, cum pure albo & æquali: lecus si diu duret febris. Nec placet Hipp. & Celsi sententia, qui laudāt in herpete ossis corruptionem: intelligat quisque vt velit.

Curæ
ratio.

Curandi ratio, tanquā in affectu cācro vlcerato per simili, difficillima est, necnō quia sæpe ad ossis corruptionē peruenit, nisi cito præueniatur, præter quā, quod is qui vlcerādo & corrodēdo serpit, nō minus efficit vlcus in parte, vbi primū incepit, ac vbi serpit, licèt primæ eius speciei id nō accedat, nā vt serpit, ita sua sponte, vel quouis medicamento sanescit, quod primò apparuerat exasperatum. In cuius affectus curatione (præmissa victus & vitæ institutione refrigerati ex cibarijs boni succi) duo diligēter expēdisse oportet: primū humoris biliosi, tenuis & corrosiui (in herpete primæ speciei, ac crasse in secunda) & eiusdem cū admixtione seræ substantiæ, aut fluxilis pituitæ copiā & modū generationis: nā ab his auspiciari oportet curationis principium.

espium. Quippe considerabis, an ex calore iecoris & venarum, bilis tenuior, spumosior, & acrior facta sit: nam tunc proculdubio à sanguinis missione curationem incipies, quamvis auctores non meminerint huius præsidij in hoc malo, idque non erit ab re bis efficere, si ex sanguinis consueta vacuatione suppressa, ex talo, vel iecore, aut ex progressu laborioso exercitio, vel quavis alia causa sanguinem & bilem in feruorē agente fiat. Quod si nil horum præcesserit, & constiterit effrenem vagari prædictam bilem tenuem, vereri oportet ne decumbat in membrum princeps, tunc protinus, nulla vel leui præparatione præmissa, cholagogico medicamento purgabis. Quippe in viris & robustis foeminis purgat Galen. idque iuxta optimam rationem sero & scammonio: quapropter non est alienum à ratione. ʒ. iiii. feri adhibere, & adijcere. g. ij. vel tria diagridij, & cum modico syrupo violaceo laboranti præbere: sin aliter diluto rhabarbari videris: vel in eodem sero cum syrupo solutiuo rosarum aut violarum, & infuso senæ purgationem institues: aut in eodem infuso mannâ aut cassiâ dissolues. Sed id semel ubi feceris, curandum est humorem temperare ac frangere, & eius tenuitatem corrigere serapijs quæ nuper diximus. Postea verò paulatim corriges & paulatim expurgabis, prædictis pharmacis in minori copia exhibitis, cum decoctione tamarindorum & mirabolanorum, aut cum syrupo cicchorij & diluto rhabarbari. Verum si herpes miliaris fuerit, eisdem purgabis, sed admiscere oportet, vel lac seminis cartami, aut agarici modicum, vel epithymum ac polipodium: & postmodum per urinâ curandū est humore purgare, serosam enim substantiâ

Institutionum Chirurgicarum

facilius per eam pars euocabis. Nec omnino posthabenda est iecoris prouidentia, adhibitis quæ ipsum attemperent & refrigerent. Secundum quod consideratione esse dignum in hac curatione diximus, est parti affectæ utilia adhibere præsidia. Quorum quædam attemperacionem moliuntur: alia vlcus, nonnulla pustulas extirpare nara sunt: sic post prædictas euacuationes, principio affectus adhibere oportet, non quæ adstringendo repellunt, ut multi sunt arbitrati, sed quæ refrigerando: nam licet incendium non sit ita vehemens, ut in erysipelate, cū hoc tamen efficacissimum est, si quidem ignis sacri nomē meretur, præterquam quod in herpete, præsertim exedente & exulcerante, longe minus licet reprimentibus & adstringentibus uti. Quippe erodens materia, quia eisdem fixius parti adhæret, longe maiorem exesionem & exulcerationem efficit: præter id, quod longe minus ad interiora repellere licebit. Quapropter, quæ frigida sunt ex viu existunt, ut in erysipelate diximus: in principio & prima herpetis specie frigida & humida, interim dum non ulceratur, quia eo tempore intelligenda venit. Hippo. sententia qua lib. 1. apho. 22. refert aqua tepida herpetibus plurimum prodesse. Verum cum à Gal. dictum sit: Herpetes autem quatenus ad totius corporis vacuationem attinet, ut erysipela curare oportet: quantum verò ad patientem particulam, non omnibus similis curatio adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerari quidem desiderant, similiter & alij herpetibus, & erysipelatis: non tamen ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerant, etiam humectare natura apta sunt, sed sola refrigerantia, quæ etiam possunt exficcare: quod fit, ut ea sint adhibenda, non herpetis ratione, sed exal

2. ad Gl.
cap. 1.

exulcerationis necessitate: in cuius curatione quæ plus siccent adhibenda sunt. Itaque ob ignem & morum serpentis humoris refrigerare, propter vlcus exsiccare opus erit: & quia vlcus est cum humoris affluxu, adstringere insuper oportet, quantum par sit ad fluxum cohibitionem. Quo fit, ut profint summitates rubi, sumach, folia oleastri, salicis, oliuæ & balaustrorum: ex quibus fiat decoctio vel instillatio ex eorum succis, præsertim foliorum roboris. Prodest & plantago, folia vitis, & alia huius census: quibus transacto principio, & aliqua parte augmenti, oportet addere quæ modicè resoluerè possint: ut est farina lupinorum, cum succo lapati acuri, puluere balaustrorum & modico aceto. Aliud conficies quod recipit succi plantaginis & solani ana. 3. j. succi radices lapati. 3. f. balaustrorum. p. j. rosarum rubearum. 3. j. saluminis. 3. j. aceti. 3. ij. coquantur ad consumptionem aceti & succorum, & in mortario plumbeo agitentur, & adde lithargyri. 3. ij. ceruse 3. f. pulueris thuris. 3. ij. & fiat linimentum. Prodest & emplastrum arnoglosæ & reliqua huius naturæ: quæ non licet huc transferre. Quod si corrosio inhiberi non possit, profunt pastilli Musæ & Andronis: postea verò ad caustica, & magis exsiccantia medicamenta te conferes.

Sciendum tamen est, eiusdem qualitaris medicamenta herpeti militari esse proficua, ceterum non æquè frigida, ob aquositatem, quam sibi habent admixtam prædictæ pustulæ, neque vehementer sicca & exedentia, sed satis est ut Galen. asserit glauci dilutum, aut arnoglosi, vel solani succus, & alia huius naturæ. Atque hæc

Ad Glau.

Institutionum Chirurgicarum

sufficere videntur ad institutionem & notitiam
veritatis & naturæ rei.

DE OEDEMA TE ET PI- tuitosis ac frigidis tumoribus

INSTITVTIO. VI.



RAE TERMISSO
communi cedematis signi-
ficato, quo Hippocrat. om-
nem tumorem præter natu-
ram intelligit, item dum pro
phlegmone accipit, solum
hac in parte nomine cede-
matis subaudire oportet tu-
morem quendam quæ pituita

comittit, sicut phlegmonem sanguis, & scirrhum
melancholia, atque erysipelam bilis. Qui sanè
est tumor mollis, laxus, digito prementi ce-
dens, indolens, albus & minimè calens: quem
non esse vnius generis, sed duorum arbitra-
mur: legitimum vnum: reliquum verò illegi-
timum & spurium. Verum atque legitimum cede-
ma constat ex Galeno, fieri ex pituita naturali,
quæ nil aliud est quàm sanguis crudus, in con-
fortio sanguinis repertus, alitioni pituitosorum
membrorum dicatus: illegitimum autem & spu-
rium, ex pituita non naturali & extraneata: quæ ta-
lis efficitur vno è duobus modis. Primo per
admissionem alicuius alterius humoris: qui si fue-
rit sanguis, fiet cœdema phlegmonodes: si bilis,
cœdema

24. Meth.
2. ad Gl.

œdema erysipelatodes : ac si melancholia, scirr-
rhodes: nisi prævaluerit humor qui pituita ad-
iungitur eo tempore : nam sic accipiet nomen
à prædominante succo . Secundo autem modo,
pituita efficitur præter naturam in propria sub-
stantia, nullo extrinsecus accedente: quo fit, vt
quatuor etiam subortiantur tumorum genera: al-
terum ex pituita in aquam versa, idæodes nun-
cupatum: aut in statum, cuius suo loco memine-
ro: secundum ex crudo flegmate, crasso & mu-
cose, ex quo procreantur tumores illi, quos abs-
cessus pituitosos nuncupamus, vel exituras flegma-
ticas, Auicenna verò dubelet, cuius naturæ sunt
steatomata, arteriomata, & melicerides ac gan-
glia, & id genus alia permulta. Tertium prodit
ex magis indurata pituita, gypsea nimirum, ex qua
nodi podacricorum oriuntur, & strumæ, seu scro-
fulæ nuncupantur. Quartum ex corrupta & putre-
facta pituita, à qua fistulæ & vlcera, quæ scro-
fulosa vocantur, subsequuntur. Præter quæ œde-
marum genera, aliud etiam non raro conspiciamus,
quod non habere morbi rationem vt prædicta cer-
tū est, sed symptomatis, in hydropicorum pe-
dibus, facie, & oculis, vt Hippocra. testatur: sed hoc
non habet circumscriptum locum, & signatā emi-
nentiam, vt quæ verè sunt œdemata morbi ratio-
nem habentia.

Quibus exactè cōsideratis, euidenter constat, qua
les sint œdematis causæ, nā præter primitiuas, ante
cedens & cōiuncta semper est, vel vbertas humoris
pituitosi, huius aut illius sortis ex his, quas nume-
ramus, in toto vel in parte, quæ efficax est ad trās-
missionē eius ad aliud mēbrum, vel in parte (quod
plerumque accidit) paulatim cōgeratur: & vtroque

Causa.

Institutionum Chirūrgicarum.

modo post collectionē predictæ pituitæ efficiūtur coniuñcta.

Signa.

Signa verò euidentissimè constant ex diffinitione: quippe tumor est, in quo cutis color nō mutatur, quinimo albidior efficitur, & cum frigiditate sensu mollis est, & sine dolore digito prementī cedit, ac pressura manet, & certè redit ad pristinā figuram, & permanet sine pulsationis sensu. Iudicatur huiusmodi tumores, vī plurimum per resolutionem, raro per suppurationem, & frequentius per indurationem, ac mutationem in nodos, & alias excrescentias, quæ à Græcis vocantur apostemata & abscessus: & vtrumq; sit, diutius durat in quavis terminatione: nam ob id dixit Hipp. œdemata diuturniores faciunt iudicationes, & longe diuturniores si in pus mutantur, vtcunq; tamen sit, periculum nō afferunt, nisi aliquid committatur erratum, aut in membro principe vigeant.

Li. i. pro.
gnost. 30.

Curatio

Curandi verò rationem præcedens œdematis diuissio cogit in tot partes dissecare, quot genera œdematum esse antea diximus: nimirum alterum legitimū, & reliquum spurium. At legitimū, quod ex pituita naturali fieri statuimus, vno duobus modis succrescere sciendum est: per defluxum nimium, & sensim aut paulatim in parte congesta pituita. Quod verò per defluxum efficitur, duplicē sui præstat indicationem: vnā præcautoriam, quæ fluentem aut fluxuram materiam respicit: & rursus alteram, quæ solum circa fluxam materiam versatur. Quæ sanè consideratio, & auxilia quibus eā exequimur, non minus proficua sunt œdemati quod paulatim efficitur, quàm huic quod per defluxum, solum habito respectu ad congestam materiam, nam eadem virobique est ratio.

His

His præmissis, statuendum est fluxionem cedemata concitantem esse in duplici differentia: vnam quæ causa alicuius morbi grauioris succrescit, vt hydropis, phoes & astmatis ac similiū. morborū, quod curare frustra tentabis, nisi morbo à quo pro cedit, & cuius est accidens, prius curato: reliquam verò, quæ triplicem præstat in curatione. cedematis indicationem: vnam gratia materiæ fluxuræ: alterā circa fluentem: & reliquam solū iuxta eam, quæ iam recepta est in parte. Primā exequeris prohibitione generationis pituitæ per victus parsimoniam, siccitatē, modicum calorem, tam in cibis, quā in potibus, ad quorum pensum iustitanda est reliqua vitæ conditio: item euacuatione eius, quæ genita est, & in corpore abundat, præmissa præparatione per syrupū, qui attenuet, inscinda, calfaciat, & quodāmodo concoquat quod eius possibile fuerit, ac reliquum vacuationi aprius reddat, melle rosaceo, syrupo de hyssopo, de saluia cum oximellite. Purgabis catholico, diaphenico, syrupo solutiuo rosarum Persicarum, cum agarico, aut gnicco, vel pilulis aggregatis, de agarico, & similibus. Quod sanè tutius facies, si iteratō feceris: presertim si mēs fuerit fluxionem à parte affecta auertere, quod exqueris paulatim euocata materia, vel ad vērē, vel per vomitum ad ventriculum, sic enim fluentē materiam retrahes, & naturam dissuesces à consequendine transmittendi.

Quo facto ad contentam in cedemate materiam te conferes, in cuius euacuatione hæc prorsus consideranda tibi erunt: quippe mox à principio eis medicamentis est vtendum, quæ nulli alteri ex tuoribus proficua sunt, qualia digerentia existunt, cum siccitate, & repellendi etiam vi. Denique ea quæ

Institutionum Chirurgicalium

illis in augmento profunt, his in principio adhibenda sunt, ut quæ reprimendi quidem vim habent, sed non ex impentia frigiditate & adstrictione, sed quæ non inualidè siccant, modicè quæ digerunt. Quæ triplicis esse generis constat, ut ex Galen. colligitur, per spongiā poscalimbutam & parti admotam: secundū recipit aquæ decoctionis nitri, cinerum & aceti quantum satis esse videtur. Tertium recipit aloës, myrrhæ, litij, acatiæ, glauci, ciperi, croci, boli Armeni, singulorum partes æquales, cum succo caulium & aceto fiat emplastrum. Quibus, & alijs huius naturæ, quæ passim reperies, attenuabitur humor, retrocedet etiam ac prohibebitur, quominus ad partē fluat, maximè quia hæc omnia actu calida parti apponenda sunt. Quippe modicè calida medicamentæ, quæ siccitatē habent, adstringendi quoque vires sortiuntur: & hæc sunt quæ ædema prodesse possunt, non quidem impensè frigida, nam durescet & incuneabitur longè magis humor. Quod si his videatur tumorem nihil imminui, tunc ad ea quæ in augmento proficua sunt, deveniendū est, qualia sunt quæ vehemèter discutiūt, ut acerū cum modico alumine, cū deligatione maiori ex infima parte ad supremam membri, ut consuluī Galen. noua spongia appositā. Quam quoque madefacies in lixiuo ex cinere siculneo, caulium, amaris ci & fermentorū, cū aqua chalybeata & aceto. Verū si constiterit aliquid tumoris resolui, tunc quidem solis digerentibus, istæque validioribus uteris: in declinatione verò eisdem, sed mitioribus, & quæ vim sortiuntur exsiccandi & absorbendi. At si parum tumorem imminui, his factis comperias, contestabile est tumorem suppurari: quo tempore emplastris huius vsui proficuis

cuius diligenter adhibitis pus mouere, antequam duritiem contrahat, curabis: cuius naturæ est emplastrum de branca vrsina, alihæa, cepa assa, radice lilij albi, semine lini & fermento cum axungia porcina. Quo facto, si pus apparuerit, etiam si in circuitu tumoris aliquid induratum superfit, scissionem facito, & vt dictum est rem deinceps perficies.

Quod si tumor suboriatur ex pituita non naturali, crassa vel ad aliam naturam reducta, strumæque & cæteros abscessus effecerit, tunc quidem alia via incedendum est, si prius eos numerauerim, dixerimque breuiter cuiusque naturam. Sunt autem hi Græcorum ganglia, charades, id est strumæ seu scrophulæ, bronchocele, quod bocium, herniam gutturis nominant. Melicerides item, steatomata, & atheromata, testudo, talpa, & nacla siue nappa fregile Auicennæ & vulgariter bubo, & alia plurima, quæ in tephaceam duritiem & scirrhus affectus degenerant, quorum præter naturalis pituita principium existit. Quos omnes tumores sub genere abscessuum pituitosorum reponi à Chirurgis euidentissimum est. Glandula enim mollis, vnica, mobilis & separata à partibus circumiacentibus, plerumque in emunctorijs adnascitur: aliquando verò in manu vel pede, vel in loco tendonibus & nervis coniuncto, quas extirpare raro licet. Scrophulæ vulgo vocatæ, nil aliud sunt, quàm indurati, & intra membranam contenti adenes, id est glandulæ, in collo, axillis & inguinibus præcipuè succrescentes: has Latini strumæ vocant, & Græci charades: omnes autem suis pelliculis includuntur quemadmodum steatomata, atheromata, & melicerades.

Lupia,

Institutionum Chirurgicarum

Lupia, mollis, rotunda, in locis duris & siccis adnascens, ut in palpebris & locis nervosis: nec ob id credendum est lupiā esse eum affectum, quem lupum appellant, est enim lupus malignum vlcus, de genere phagedænarū. Nodus, tumor est rotundus & durus circa loca nervosa maximè apparens, quem Aulic. sub nomine dubeler comprehendit, sicut & steatomata & melicerides. Cæterum atheroma tumor est concolor & indolens, in mēbrana seu nervosa tunica humorem lentum continens, à pulvere si militudine sumpta. Meliceris autem dolore etiam vacat, constans substantia mellis per simili. Steatoma verò tumor etiam est concolor & tactu lenis, in principio exiguus, sed tēporis processu augetur, in quo humor, sepo per similes membrana inclusus reperitur, cæteris tamen durior. Ad quæ tria tumorum genera plures alię species reducuntur, qualis testudo est, qui tumor est magnus, latiore forma & mollis ob pinguem materiam, in modum testudinis, qui in capite adnascens talparia dicitur: sed ad hæc atheroma magis accedit, sicut testudo ad meliceridem. Præterea bocium, seu brôchocele est tumor colli grandis & rotundus inter cutē & asperam arteriam, in quo aliquando caro excrescit, nonnunquam humor mellis, aque, pulti, adipi per similes. Napta huic quodammodo similis tumor alijs partibus adnascens, magnus, carnosus, diuersa sortitus nomina, iuxta diuersam sui figuram. Insuper bubo, qui tumor est inguinum & adenosarum paruum, magis accedit ad naturam inflammationum; verum prædictis adiungitur ob crassum prius sibi adiuncte; fugile ad tumores qui post aures nascuntur, reducitur. Itaq; ex his tumoribus quidam peculiari tunica includuntur;

alii

alij carne sunt implexi & inserti: quidā basim seu radicem habent gracilem: quidam latiore: alij insuper sunt resolvable: alij minimē: nonnulli magni, alij parui: alij suppuracionem sortiūtur: alij minimē: quidam etiam sunt squamosi, fistulosi, cancerosi, & alij nil horum recipiunt. Quibus iam constare & causam anteccedentem & communē, nec non & modum terminationis, facilitatem & difficultatem curationis euidentissimum est.

Curandi rationem vnā omnibus his tumoribus cōmunem esse arbitramur: alteram cuiq; propriam, sed non plurimū dissidentē. Primam quidem constantem ex victu exsiccante, potus parsimonia, exercitio, nisi pars affecta vetuerit. Quo facto, sciēdum est, crassæ & præternaturalis pituitæ prouentum inhibendum esse his, quæ si non profuerint, mille modis euacuare possint, & distrahere à parte affecta, quod eius redundauerit: vomitibus, si venter prauē coxerit, frequentibus purgationibus ex agarico, cartamo, terebinthina, hiera Gal. pilulis de agarico, turpento, aggregatiuis & cochijs. Irē eis medicamentis quæ vrinam moueant liquentiq; crassos succos, & ad renes traijcient. Insuper balneis sulphureis, & sudationibus ex ligno Guayaco aut sparta parella, & frequentibus clysmatis. Quod si ex capite fluxionem descēdere cōpereris, fontanellā altero brachiorū aperies, quo spirer dilabēs humor.

His factis, vt cuique tumoris sorti fatiscere possis, primò obseruabis pituitosos abscessus, molles & paruos, quales glandulæ & lupiæ sunt, si in particulis firmiores præfint, tandiu manu ac digitis mace-rabis & conteres donec incalescant, & materia inter-
fusi contenta liquerur, quo facilius discussione ce-
dat. Quo facto laminam plumbeā desuper affigito,
arctē

Curādi
ratio.

Institutionum Chirurgicalium

arctè, præmolita tamè parte vnguento vtêris Orbi
balij. q.r. cerusæ, resinæ, olei veteris ana. ʒ. j. ammo
niaci, galbani ana partes æquales, ceræ. ʒ. iij. Sed
mirabilis efficacix est superponere plagelas ex stu
pis confectas oui cādido sale & alumine inspissato
imbutas. Tandè si hæc nō profuerint, aut alia quæ
passim scribuntur, curis insecindenda est, & tumor
volsella apprehendendus à radice, & auellendus
cure vndique excoriatus, ac postea futura partes
vniēdæ, & curanda plaga est vt recēs, foramine ta
men relicto. Quòd si maiores sint huiusmodi tu
mores, præmissis medicamētis quæ proficua dixi
mus esse cedemati, emollire, discutere & cōsumere
oportet. Quæ opera maximè præstat emplastrū. q.
r. olei antiqui. ʒ. j. viridis æris. ʒ. vij. picis. ʒ. iij. lada
ni ʒ. j. s. lithargyrii. ʒ. j. galbani. ʒ. j. s. Sed quia ad
strumas varia apud auctores scripta reperies, præ
ter vsum serpentū, quorū vsus maximi solet esse
momenti, tertio quoque die vnguento vtêris ex bu
fone aut puluerib⁹ eius, maximè vbi vlcera fuerint
aliqua. Quòd si hæc prodesse nō videantur superfi
ciarias strumas sic curato: si benignæ fuerint humo
res, aut sanguini misti, emolliētia & resoluētia pro
ficua erūt, licèt id diuturno tempore efficiāt, quia
aut resoluūt, aut suppurant. Quo facto, tumore ape
ries, & pus deterges ex vnguento Apostolorum, aut
Ægyptiaco: verū si duritiē maiore corrahant, se
ctionē, & extractionē curabis diligēter efficere per
longitudinē cutis facta sectione: in parvis vna, in
maioribus per lōgū & trāsversū facta: deinceps, ser
uatis venis & arterijs, strumā excoriato, & paula
tim eximito: qua lege Tagaultius proprio cap. cōsu
lit, & reliquā curationē, ac sanguinis fluxionē eodē
modo cohibebis & facies. Ceterū si laborās formi
da.

clauerit ferri aut ignis contactu, causticis medicame-
tis re agēs, scissa cure, & immisso vrēte medicamēto
per vūnus vsque ad itrumq; corpus, siue causticu
ex compositis, siue solo arsenico vtaris, vt lentē &
sensim molles serophule cōterantur exedāturq;
donec vlcus purum subit, & vt expostulat cure-
tur. Quod si abscessus fuerit ex his qui angustā ha-
bent basim, vinculo serico ligabis, aut seris equi-
nis, vel filo facto ex corticibus arboris mori, vel
nucis, vinciens indies magis ac magis vinculis
compressis, donec resiccari comperias & sua spē
delabi. Atheromata, steatomata & melicerides pe-
culiarem in Chirurgo prærequirunt diligentiam
& curationem. Quippe meliceris tripliciter ex-
tirpatur: aut tunica quam cistiā appellant, discus-
sa, & prorsus exēssa, vel ferro separata: athero-
mata nullam admittunt resolutionem, sed solum
auferuntur sectione, aut exēssione: steatomata ve-
rō nec discuti, nec exēdi possunt, sed solum se-
ctione curantur. Sed in omnibus pelliculosis tu-
moribus, summopere obseruandum est, ne tūni-
ca ante integram auulsionem dirumpatur, exeatq;
humor: nam vel eius vel humoris aliquid intrus ma-
net, recidiuam iterum effecturum.

Inter oedemata, quæ illegitima sunt, iure optimo
annumeratur tumor aquosus, quē laxum & indo-
lentem arbitrantur auctores, factum ab aquosa se-
reaque substantia aliqua parte inclusa. Quæ sanē
vbi in ventris cauitatibus colligitur, ascitum con-
citat: si verō inter cutem capitis & caluaria hy-
drocephalon: si autē in seroto cōgeratur: hydroce-
le proignit. Quod si sub tunica viscēris alicuius
contineatur, parua vesicula suboritur, quam
vocant matra: vel in cute ac partibus externis
vnde.

Institutionum Chirurgicarum

vnde fiunt pustulæ quas phlyctenas vocant. Itaq; huiusmodi tumor, aut sit intra tunicam & ossa: aut intra carnem & tunicam: vel inter carnem & cutem: vel in magnis cavitatibus. Causas habet, vel percussione qua venæ dilatantur, vel alimentorum humidorum immodicum æsum, vel potum copiosorem, aut impotentiam secernētis facultatis, quæ nequit sanguinem ab hoc excremento expurgare, aut imbecillitatem concoctoriæ facultatis ventriculi, aut iecoris, quæ longè maior futura est, quàm quæ flatum generat. Et vltimò tam antecedentem quàm coniunctam esse aquosum humorem arbitramur. Hunc sanè tumorem, aliquando vt symptoma esse considerandum statuunt authores, vt in hydrope, & pthysi, aut difficili respiratione ac diuturnis affectionibus pedes in tumorem eleuant ostendunt: & rursus morbi rationem habet, cùm videlicet in vna parte inclusa aquosa substantia, tumore circumscribit, figuram, temperiem & partium unitatem viuantem. Hos etiam tumores nosces, quod molles sint, & digito prementi cedant, ceterum non manet digiti vestigium, vt in œdemate sunt laxi, solum edunt, lucidi transparentesq; & parum cutim imitant, nisi ex causa externa suboriantur: senibus aut pueris plerūque adnascuntur, & difficilioris sunt curationis, quàm flatuosi, vt constare videtur ex Galen.

2. progn.

In curatione prædictorum tumorum, sit primū consilium præcauere, ne nouæ materiæ adueniunt tumor augeatur: alterum, vt quæ iam collecta est, & morbum facit immineatur. Primum cōsequeris, si causas congestionis feræ substantiæ submoueris, cauens ne ampliùs generetur praua & exficante victus & vitæ institutione rem curabis, ne mate-

si a superuacua aut mittatur ad partem, aut ab eadē trahatur. Item si quid superabundat, euacuato his medicamentis, quæ hydragoga nuncupantur, quæ aquas educunt, vt semen cartami, agaricus, terebinthina & alia id genus. Prouocabis sudores, quod corpore purgato maioris solet esse momenti, vel vias promouebis: nam id solū solet materię antecedentis esse præsidium. Quo facto, partem quæ prædictum succū generat, curabis modicē calfacientibus & tēperatis medicamentis ad pristinum statum reducere: tande aquam in tumore contenta vel resoluentibus in halitu digerēs, vel si id difficulter fiat, euacuabis aperto foramine: illud facies foribus ex aceto & sale feruesfactis ex lixiuo cū alumine, sale, nitro, sulphure, vel ex aqua vitæ cum sinapi feruesfacta, emplastris etiam ex eisdem rebus factis, cū vino aut decoctis calidis & digerentibus. Secundum fieri scalpello parte aperta, vel si fuerit in scroto, setone affixo eidem parti, aut vultusculis infixis, vt proprijs capitibus leges. Præterea cōplicatū & dema mixta curatione tractabis pro natura humoris complicationem efficientis.

DE SCIRRHO ET MELANCHOLICIS TUMORIBUS.

INSTITVTIO VII.



SCIRRHVS, quī tumor durus & omnino doloris expers ac ponderosus est, duplicis est naturę: alter legitimus a naturali melancholia ortus, seu a crassa pituita in parte indurata (quę non exquisitum alij arbitrantur) reliquus

E

verò

Institutionum Chirurgicalium

verò potius scirrhus tumor quàm scirrhus dici meretur, quòd omnino sensu non careat. Qui sane duobus efficitur modis: vno à melancholia etiam, cæterùm alicui prædictorum humorum associata: quo fit, vt huius sortis tres scirrhosorum tumorum species reperiantur, vna ex melancholia sanguini adiuncta, prævalente melancholia: & secunda adiuncta pituita maiori melancholiæ copiæ: tertia cum flaua bilis eidem copiosiori melancholiæ adiungitur. Secunda fors efficitur à quo vis humore in parte quavis supra modum indurata, siue ob medicamenta impensè resoluentia, siue plus iusto refrigerantia, quæ ab imperito Chirurgo administrantur. Tertia autem scirrhi species est, quando ex quavis melancholiæ specie, vbi admodum adusta fuerit, originem trahit, qui iam non scirrhus simpliciter, sed scirrhus canerosus, aut cancer dicitur: cui si maior adustio, aut tenuis substantiæ, acris & calidæ aliquid accesserit, vlceratus cancer fit.

Cause.

Causas habet legitimus scirrhus (præter externas quæ natæ sunt plurimum melancholiæ proveniunt in corpore efficere) solùm melancholiam naturalem, hoc est, faciem sanguinis, aut vt Galen. aduertit, crassam pituitam: spurius seu illegitimus eandem, sed cum aliquo ex prædictis humoribus associatam, aut vltimò quemvis humorem in tumore quouis contentum, vbi induruerit, aut parte tenui supra modum resoluta, aut vniuersa eius substantia congelata & coarctata in eâdem parte: canerosi verò scirrhi solùm melancholia per adustionem facta,

Co

Cognitio scirrhi ex diffinitione euidētissima *Cognitio.*
ma est: nam durior est cæteris tumoribus, sine
sensu, colore cinericio, aut plumbeo, vel sub
nigro insignitus, eo excepto, qui fit ex pitui-
ta in parte congelata, siquidem colorem cutis
non mutat.

Inter omnes species huius tumoris, qui insen- *Præsa-*
sibilior est, difficilior curatur, sicut qui sum-
mam duritiem adeptus est, vel supra eius cu-
tem pili adnascuntur. Horum etiam tumorum
quidam terminantur in cancerum, quidam in ma-
iorem duritiem, & alij rursus resolvuntur.

Exquisiti scirrhi curandi rationem difficilem *Curatio*
iudicarunt omnes Medici, quod adeo indurue-
rit materia, ut nullis sit cessura auxilijs: verum
si omnino exquisita non contraxerint duritiem,
considerabis, sitne materia melancholicus hu-
mor, an crassa & exsiccata pituita: aliquid enim
discriminis in curatione circumscribitur, ut mox
referam, si prius dixerō inhibendam esse propa-
gationem humoris peccantis, visu omnino con-
trario. Quare in pituitoso apparatu ad siccus
& modicè calidum vergant alimenta omnia oportet:
sicut ad modicè calidum & humidum, si me-
lancholia causam præstiterit: ad quorum pen-
sum instituenda est reliqua vitæ ratio. Postea
verò, si quid alicuius prædictorum succorum in
corpore abundat, ex suppressione consueti fluxus
sanguinis, ipsum reuocabis, aut venam scindes, sed
parcè: postea quod melancholix superest, demendum
erit frequentibus purgationibus ex agarico, sena, po-
lipodio, turpeto & similibus, aut efficacioribus:

Institutionum Chirurgicalium

nam talia expostulat humoris renitentia. Præterea vñcunque factus sit scirrhus (nisi noua præsit fluxio) nulla lege repellētia desiderat auxilia; quia materia huic munerī omnino inepta est; & ob id neque adstringentibus, neque refrigerantibus vñcū dum erit: neq; rursus impentē emolliētibus, quātumuis durus sit: insuper neque resoluentibus vehementer: nam frigida & astringentia, præterquā quod emollitionem ac resolutionē impediunt, humorem densiorem & longē magis induratum efficiunt: itē resoluentia si moderata sint, partē tenui separata, crassa durior remanet: sicut emollientia periculum afferunt corruptionis; quo facili in cancerum & vlcera degenerat affectio. Et ob id omne curantis consilium dirigi debet, vt mox à principio, & vsque ad integrā sanitatem eis vtratur præsidij, quæ vim habeant simul emolliendi, & desiccandi: nam vtrunq; seorsum exhibitur, lecturum fore antea diximus. Quē vsū præstat emplastrum, q. s. bdelij, ammoniaci, galbani; ana partes æquales, terantur in mortario cum oleo tiliorū, & addē mācaginum fœnū græci, seminis lini & ficūm ad pondus omnium, & terantur donec in vñū vocant. Reliqua autem auxilia huic vsui proficua, reperies partē secunda cap. de emollientibus.

Quod si scirrhus tumor ex codensata pituita fiat, vel ex phlegmone indurato, longē atra desiderat emollientia: nam calida & sicca huic munerī esse proficua docuerat Gal. vt quæ calore, liquidandi quod frigore concreuit, vires habeant, & fricitare bibendi nimiam humiditatem quā hi affectus sibi habent adiunctam, licet coercitam & congelatam, & ob id hæc medicamenta dicit solent emollientia, quia liquant, & ob id emolliunt quod congelatum

gelatum est, & postmodum resoluunt quod liqua-
uerat, & ea ratione dicuntur resoluentia. Emolliūt
tamen diuerso modo a praedictis, quia illa pinguo-
sa natura & malactica emolliunt induratum ex calo-
re & siccitate, & ex aduersa siccitate exhibitur quod
emollitur est: haec vero ut quae calida sunt a secū-
do ad tertium gradum & sicca in primo, modo di-
cto emolliūt: quae sane ubi hos gradus excefferint,
longe maiorem duritiem accerunt, nisi iam in si-
ne affectus, ubi maiorem tumoris partem emollitā
fuisse constiterit, quo tempore validioribus resol-
uentibus uti poteris citra periculum.

Reperies autem emollientium medicamentorū
varias esse sortes: nam quaedam sunt debilia, ut quae
sunt ex oleis amygdalarum dulcium, sesamino, de
semine lini & axungijs, medullis ac pinguedini-
bus. Maioris efficaciae efficies si addideris gummi
nonihij, ut baëlij, galbani & similitum cum oleo li-
liorum. Etiam efficacius efficies, si addas, terebin-
thinam abietinam, oleum irinum: quibus & mine-
ralibus additis, quo resolutio & attemperamentum
securius fiat, utilius efficies, maxime si addideris
mucagines seminis lini, foenu graeci & althaeae. Qui-
bus profecto mirum in modum ad incisionem cras-
sae pituitae efficaciam praestat aceti modicum, maxi-
me in inueteratis tumoribus, ac supra tendones fi-
tis. Sic partem in iugis oleo aliquo tenuium partiū,
in quo ferbuerit cucumeris fistulosis aut aliis haerē-
dix vel anethum viride. Praestat & partem scir-
rho affectam suffire euaporatione aceti injecti su-
per lapidem molarem ignitum: & haec dixisse suf-
ficiat.

Ei sunt scirrho illegitimi mille modis, ut dictum De ille-
gitimo
est: nam per admissionem alicuius succi ex tribus
E 3 natu- scirrho.

Institutionum Chirurgicarum

naturalibus, suboriuntur, & sic mistam admittunt curationem, ex his quæ diximus hac institutione, & ex eis quæ in curatione tumoris cuius humor ei adiungitur. Vel efficitur illegitimus ob indurationem à frigidis & repellentibus importunè adhibitis, aut ex resoluventibus quæ plus iusto exsiccatâ reddunt duritiem: quos sanè tumores, sic in duritiem versos, scirrhosos Medici vocant, qui ubi in regram acquisierint duritiem, & prorsus sensu priuentur, inmedicabiles fiunt, sicut legitimi, si ad eandem peruenierint duritiem.

Curatio Eam curandi rationem huiusmodi scirrhorum durities expostulant, quæ è directo causæ duritiei aduersa sit: nam si ex impesa frigiditate induruerint, quæ modicè calfaciant & exsiccent sunt adhibenda, qualia diximus proficua esse scirrho ex condensata pituita. Verùm si ex his quæ supra modum resoluunt, durities contracta fuerit, tunc quidem minus calida, magis humida, aut in primo gradu sicca esse oportet quæ hanc duritiem emolliant: ob id quidem medullæ, adipēs, axungie cum bdellio & rhymiamate adhibenda sunt, oleo ricino admista. Prodest cæsypos, althææ radix cum mucaginibus fœnugræci & seminis lini. Verùm in tendonibus & ligamentis scirrho obductis, aceti modicum addere erit vtile, aut vaporem eius ex lapide ignito suscipere, à foru aut inunctione ex aliquo prædictorum: in scindere enim quod viscidum & adhærens est oportet, quo facilis abstergetur, aut digeratur per halitum, nisi admodum resiccata fuerit durities.

Cæterum ut his medicamentis & alijs, quæ li. 2. cap. de emollientibus reperies, probè uti scias, hæc

hæc diligenter considera. Primum, quantum distet corpus ab humiditate temperata: nam pueris, feminis, eunuchis, & his quæ humiditate natura abundant, sufficiunt qui modicè humectant, quæ etiam parvis tumoribus & non plurimum duris prodesse possunt, sicut maiora sunt necessaria, si durior fuerit tumor. Præterea raræ partes vehementiora renuunt, & mediocria expostulant medicamenta. Quibus consideratis, quantum tumor, corpus aut particula à dictis conditionibus deuiaverit, tantum recedat medicamentum à mediocritate opus erit. Hæc tamen duo in omnibus adseruabis: primum, quod foueatur pars scirrhusa aliquo decocto emolliente pariter & resolvente, cum modico aceto, sale & oleo, aut ex oleo in quo hæc eadè ferbuerint: & euaporatione ex aceto suscepta, tertio vel quarto quoque die hæc medicamenta adhibebis, non tamen separatim operantia, nimirum per se emollientia, & postea resoluentia: sed simul iuncta, ut quod emolitione liquatum est, antequam corrumpatur, dissolui digeri que facilius possit. Sed omnia in horum affectuum curatione cautius oportet prius tentare, & paulatim profequi, nam facile exacerbantur, & in cancrösam duriciem degenerant.

Cum dictum sit, facile in cancrum hos tumores commigrare, necessum est scire, quid sit, qualiter fiat, & à quibus causis, & qualis futura sit providentia, seu curatio, si quam admittit. Cancrum eum tumorem appellant Medici omnes, qui durus est, inæqualis, rotundus, venosus, luescens siue fuscus aut nigricans, calidus, non tamen eque ac inflammatio: item subito accrescens,

De cancro.

Institutionum Chirurgicarum

Cause.

egros maxime affligēs & perpetuo dolore fatigā.
Suboritur hæc dari tumoris conditio, solum ex affata melancholia, aut ut rectius loquar, ex quavis atre bilis specie, siue ex bile, siue ex sanguine, siue ex melancholia vitione cremaris, fiat. Plerumque etenim adnascuntur, quibus vel menses, vel hæmorrhoides, vel varices suppressæ sunt. Vtunque tamen fiant, quatuor cancerum sortes inveniuntur: vna ulcerari: non ulcerati altera: tertia manifesti in partibus extremis corporis: & quarta occulti, hoc est, intra corporis cavitatem, nam sæpe adnascitur vtero, ano, vesicæ, intra nares, & in abditis corporis sedibus, quos curare vetuit Hipp. Gal. etiam appellat occultos non ulceratos, hoc est, qui intra cutem iam duriciem habent exulcerata: cæterum cutis extrema citra noxa & exulcerationem apparet.

Præterea quavis prædictorum tumorum vel incipiendo procedit, vel a scirrho degenerat, ut contingit foeminis, quibus ex mammarum scirrho fiunt hi tumores, quos Hispani caratanes vocant, qui medium quoddam sunt inter cancerum & scirrhum, aut via a scirrho in cancerum.

Cognitio.

Noſces autem incipientem (quod difficilius est) ex duritie & inequalitate tumoris, quæ tactu facileprehenduntur: colorem præ se fert lividum siue fuscum, cum sensu punſtionis & dolore iuxta tumorem ipsum: venas ostendit in circuitu tumentes cancerorum brachijs perſimiles, cum extranea caliditate, ut Gal. aduertit. Quo loco statuit, cancras incipientes difficulter cognosci, quia licet incipiat cum eisdem accidentibus, a parvissima (vel ciccris) magnitudine initium ſumunt. Magnum ſolat cancer faceſſere negociũ, nam a toto genere morbus est gravis & pernicioſus, quod mutiora con-

Li. I. cap. 14.
th.
2, ad Gla.

temnat

remnat remedia, & maioribus exacerbetur, & fiat particularis elephantiasis. Probat euentus, nulla, aut difficulter admittere curationem: nam si radicitus euellas, vel vlcus remanet cancrosum & inmedicabile, vel malum reuertetur, aut in aliam partem humor decumbet, vbi maius & breuius accersit periculum, & ob id dictum est ab Hipp. citius perire eos qui curantur. Cui hoc tamen qui sunt prope curam, curationem admittunt, quam ego cōsulērem antequam vlcerentur: nam postea in cancrosum vlcus digenerant, tum etiam si radicitus venas circumstantes non extirpaueris: eos vero qui magni sunt & inueterati, curabis ne augeantur: curationem autem aliam non aggredieris.

Curandi ratio in huiusmodi tumoribus, neque vnica est, neque eorum status vnus. Nam vel incipiens est, aut nuper à scirrho degenerauit: quorū tempore resiccantibus ac refrigerantibus, quæ minime mordentia sint, & mediocres vires habeant, ipsum resoluerē, & tenuē quod influit, repellere est curandum. Quod si hæc non profuerint, studendum erit inhibere, quo possit maiorem molem contrahere, ac si contraxerit, exulcerationem prorsus impedire: difficulter enim aut impossibiliter curatur vlcerati. Verum si id non consequaris, ipsum extirpare & radicitus vellere oportebit. Ad quamuis predictarum operationum opus est corpus maximam habere prouidentiam victu refrigerante modicē, & humectante, ac reliquo vitæ instituto ad pensum præhabito. Corpus insuper curabis, à recrementis melancholicis expurgare, & sanguinebis terue in anno misso, maxime si ex suppressione varicum, mensium aut hæmorrhoidum malū oriatur, quo locus supersit frequentibus purgationibus.

Curatio

Institutionum Chirurgicarum

ex cōfectione Hamech dissoluta in sero, aut ex māna cū decocto senæ: vel ex casia, aut prunis damascenis decocto senæ, & saccharo cōfectis: vel ultimo alio fortiori medicamēto, si corp⁹ sit robustū.

His prēmisis, primū curādī cancrū scopū ad implebis per repellētia & digerētia medicamēta, quæ nullatenus mordentia sint, & mediocres vires habeant: nā cū materia cācri crassa ac repulsiōni & resolutioni inepra sit, & cū hoc maligna, lat erit quod tenue fluxerit, repellere & discutere, ne ampli⁹ crescat. Ob id metallicis medicamentis vtendū erit, veluti plumbo vīto & loro, vnguento diapompholygos, succo solatri ac similibus, factis linimentis & vnguentis, abluta pri⁹ parte sero, aut aqua semperuiuij, quibus sæpius mutatis vtēris, ne in parte incalēscant.

Prohibent cancrorū augmentū frequentes purgationes, & per lōgiora intervalla sanguinis detractiones, velut diximus: item emplastrū cancrorum fluuialiū pari cadmię mēsurā admista, & alijs, quę pāssim apud scriptores reperies. Caterū lōgē præstanti⁹ & vili⁹ impedit augmentū aperta fontanella ē directo partis affectū, per quā faciē expirer quod futurū est, nō solū augmenti, verū & exulcerationis causa. Eandē inhibet frigidorum & humidorum cibariorū esus: item vaccæ lac, aut puls ex farina hordei: tandem calorem ac feruorem tumoris compefcere curabis omni diligētia, appositis frequentius, quæ impeni⁹ refrigerent, vt portulacæ succo, semperuiuij, plantaginis & similia, cum vnguento pompholygos, præsertim parte sæpius abluta aliquo ex prædictis succis.

Quod si hæc omnia prodesse non comperias, coniectandum erit, an necēssum sit ad chirurgicam manum

manū deuenire, & an laborans ferre possit. Quod si aggrediaris, cautē & cū maxima præmeditatione facito: nā aut nō sanescunt, etiā si prosperē succedat sectio, vt Celsus prædixit, aut fluxu sanguinis periclitantur laborantes, aut in cācrosū vlcus degenerat affectio, vel in maniā, paralyſim vel animi deliquium & grauissima mala commigrat humor, qui ad eam partem fluere aſſueuerat. Et ob id paruos caneros ſcindere aggredieris, non oculos, non internos ac infartos, nō prope membrū princeps, neq; vlceros: ſolū ergo extirpare coſulo, quos vulgus (çaratanes) appellat, qui medij ſunt inter ſcirrhū & cancrum: nam in his, præſertim facta fontanella, non ſuccreſcunt prædicta mala. Quos aliquando curatos vidi, inſixo cauterio vno vel duobus, & immiſſo grano arſenici, & cooperto vulnere butyro vaccino, quo ſerē paucis horis aut diebus decidit glādula vniuerſa, aut tumor, ſi nōdum cancri naturam attigerit.

Quod ſi manuali operatione opus ſit, id diſces efficere, tum apud Chirurgoſ, tum lib. noſtro de ſcem. morbis cap. de māmārum tumoribus. Interim tamen ſciro, cutem inſcindendam eſſe, manu priuſ apprehenſo tumore, ac per latera eius cure & carne nouacula ſeparata, tumorem hamo vel acu apprehendes per medium tumorem ipſum, vt faciliuſ poſſis ab omni carne vndique ſeparare, & radicatuſ extirpare. Quod ſi ſanguinis fluxuſ non ſit admodum copioſuſ, non protinuſ compellereſ: ſin aliter, ſtatim eis vtēris medicamentis, quæ ſanguinem reprimunt, vbi ſufficienter eū qui in radicibus & venis proximis incuneatuſ erat, extraxeris, aut fluere permiſeris. Quod ſi fluxū non ſperes ob grandem impetum poſſe compelli,

ferro

Institutionum Chirurgicarum.

ferro eadē curabis id efficere, alioqui igne opus nō est, nisi verearis aliquid tumoris relictū fuisse, quod extirpare studeas. Postea verō vlcus curabis mica panis imbuta succo aliquo ex prædictis, si vltio præcessit. transactis duobus aut tribus diebus, penicillus intinctus melle & farina lentium apponendus est, ac desuper digestuum, donec scarra procedat. Verū si igne opus non fuit, primō quo conquassato, cum oleo rosaceo, aut albumine oui in penicillis vtēris, postea verō vt reliqua vlcera curabis. Ceterum ne materia quæ ibidē conflueret aduenerat, perseueret, & recrudescere malum efficiat, aut ad principaliorem partem irruat, necessum erit fonticulam aperire, quemadmodum nuper diximus.

DE TUMORE FLATUOSO INSTITUTIO VIII.



FLMOREM flatuosum Latini inflationem & Graeci emphysema nūcuparūt, quem ab oedemate iure optimo seungimus, quamuis a pituita flatus origine trahat, quod iam in aliam naturam versa sit pituita, longe diuersa a suis conditionibus & accidentibus. Erigitur tumor flatuosus, in quo coadunatur & iungitur flatus crassus, nec dispergitur, sed partem in tumore eleuat & replet cum tensione. In qua re statuendum est, huiusmodi tumorem succrescere sub cure, an membranis, quæ ossa circumdant, aut musculos vlceraque ali-

quod

quod includunt. Sed inter has collectiones, ea sola iure optimo tumor flatusus dicitur, quæ in vno loco inclusa, nullibi extenditur, sed in loco quopiam circumscripto, propter densitatem cutis vel membrorum circumstantium, & spissitudinem, aut flatus ipsius crassitiem, alioqui non fiet tumor flatusus.

Causas huius tumoris, & flatus ipsum procreantis, non est ita difficile nosse, cæterum non est adeo facile, quo modo & a qua parte in affectum prodent & includatur. Constat vnanim omnium consensu, flatum fieri (vbiunque generetur) ex crassa pituita, aut frigidis & crudis humoribus, concoctione debili, otio & quiete, & calore mediocriter diminuto. His suppositis, includitur flatus in parte tumorem effecturus, vno e tribus modis: aut quod aliunde genitus in eam partem transmittatur, ut in tympania & ventris torminibus: vel generatur in eadem parte, vbi tumorem molitur ex pituita præexistente in prædictæ partis venis, a qua eleuatus vapor, ad proximamque partem transmissus, tumorem excitat. Terrio gignitur flatus in eadem parte vbi tumor apparet, ex pituita in eadem cavitate etiam cetera, quæ mixtæ naturæ tumorem gignit, oedematofum videlicet simul & flatusum. Itaque considerabis harum causarum, quas coniunctas arbitramur, antecedentes (non posthabitis euidentibus ut percussio) sic victas de præuata conditio in habitu & toto corpore antecedentis materiæ maximam prouentum producit, sicut de fluxu pituitæ crassissimæ ad aliquam particulam mediocriter calidam: causa est antecedens eius tumoris, qui mixtæ est naturæ & in eadem parte habet materiam, ex qua & flatus.

Causæ.

Illustrat.

causæ

Institutionum Chirurgicarum

Signa.

Noſces autem affectum & cauſam, quia tumor apparet cum lucido quodā ſplendore, ſonitū, vt vter vel typanum, dum percutitur, reddens: ſtatus ſæpe ſentitur per totum corpus, aut iuxta partē trementem cum palpitatione, qui ad varias partes diſcurrit cum dolore extenſo, & per interualla exacerbatus, renititur tangenti tumor cum tenſione. Et licet in tumoribus genu, & grandioribus (quod deſuper ſit carnis grādiſſima moles) aliquādo appareat puris tactus, conijcere oportet, falſam eſſe prædictam repræſentationem, & nulla via eſſe inſciſſione vtendum, ſed ſignis omnibus ſimul iunctis conſideratis, ad peculiaria auxilia deueniendum.

*Curandi
ratio.*

Erit igitur in his tumoribus curandi triplex ſcopus: vnus cum materia ſtatus in vniuerſo corpore exiſtente, ſtatus eleuari, in vna partē conſuſi, tumorem efficiunt: quo tempore per viſum ſtatus exortem, calidum modicē & exſiccantē prouidebis, conſiderans diligenter, ſit ne vitium cruditatum redundantiū aut pituitæ, ex vbertate aut vitio alimētorum, vel ex naturæ aut caloris defectu, vt poſſis cuique pro ratione indigētiae prouidere, cibi copiā imminuens, qualitatem mutans in commodiorem: caloris copiā & ſubſtantiam adaugēs in ventriculo, inunctionibus calidis: in iecore & in vniuerſo corpore excitato calore frictionibus aut balneis ſulphureis poſt purgationem. Quam ſanē aggredieris, ſi quæ diximus non proſint, medicamentis per aluum pituitam & crudos ſuccos purgantibus, qualia diximus inſtitutione de oedemate. Laudo paulatim & ſenſim corpus purgare, ſudare, balneare, aut ſuffire: ac ſi ventriculus mali cauſa fuerit, vomitibus vti, & his etiam quæ intruſæ & extra ventrem roborent, donec conſiet pituitæ pro-

prouentum longè esse minorem: quo tempore ag-
gredienda est partis tumentis curatio. Verùm si
malum oriarur eo quòd in parte tumente pituita
crassæ copia sit, quæ flatus progignat, tunc mix-
ta curatione opus aggredieris: partim ea, quam
oedemati conscripsimus: partim verò ea quæ so-
li tumori flatuoso debeatur, vt mox referam.

Quòd si tumor ex flatu contractus, à pituita
existente in venoso genere prope partem affectam
suborietur, tunc deposita venarum pituita per ex-
purgantia medicamenta, consumptisque recremen-
tis, per fomenta, balnea sulphurea & sudatio-
nes, tumori prouidendum est: si ex ictu aut casu
prodierit, per ea, quæ præter id quòd dolorem
inhibeant, modicè repellant, ne dolor maior fiat,
& ob id humorum confluxus: verùm cum hoc
simul rarefacientia & resoluentia pharmaca sunt
adhibenda. At si ex antecedente causa con-
iuncta suborietur, mens tibi sit, cutem rarefa-
cere, flatum attenuare, & ipsum per insensi-
lem halitum digerere: ac si dolor ob tensio-
nem adfuerit, simul adijcies ex anodynis aliquid,
quemadmodum Galen. consuluit. Cæterum si do-
lor fuerit cum inflammatione, ex anodynis tempe-
ratis nonnihil etiam addes, & sic sensim, quo ma-
gis quieuerint inflammatio & dolor, remittere
magis oportet anodyna & temperata, ac erit
opus addere quæ merè resoluentia sint: quæ pri-
mo subtiliter triturare oportet, quo facilius ad in-
tima peruenerint, & sic efficacius calfaciunt, me-
dium quidem ad resolutionem necessariū, maxime
si accedat actualis caliditas. Quæ sane tanto cali-
diora, subtilis substantiæ & attenuata esse oportet,
quanto

ad Gla.
14. Meth.

Institutionum Chirurgicarum

quāto flatuosus humor profundius situs fuerit: cur mūnēri oportet: praeceant partis fomentationes per spongia ex lixiuio ex vino, ex decoctis calidarum herbarum cum modico vino & sale: postmodum vērō partem inunges oleo anethino, camemelino, laurino, costino, rutaceo & reliquis calidioribus. Item in eisdem oleis incoquere poteris semina cumini, apij, anisi, fœniculi, rutæ, clauiculi, & caryophyllorum. Prodest etiam supra partem apponere saccellos ex eisdem seminibus minutissime tritis, & ex eorum herbis. Item adhibebis cataplasma ex fapa, pane, fursure & prædictis pulueribus, addito modico vino, aut lixiuio & guttulis aceti cum stercore caprarum aut columbarū. Sepe enim adeo maligna & contumax est flatuosa substatia, vt cogat Chirurgū ad apertionē partis tumētis peruenire, si iugne, si scalpe lo. Quib⁹ factis emplastra adhibebis, vt de baccis lauri, & vnguera ex prædictis rebus, addito semine sinapis, & similibus.

DE TVMORIBVS EX CAR-

nea substantia

INSTITVTIO IX.



VNT præterea alij tumores, qui potius ex carne quā ex humore vel re aliqua extranea partibus adnascuntur: aut totum corpus in maiorem molem succrescit, siue ex pinguedine, siue ex carne fiat, aut si in membro aliqua pars excrescar, aut

caro

caro adnascatur, vt polypus, fungus, caruncula, & queuis alia carnea extuberantia. Crescit tamen in particulis vlceratis aliquando caro præter naturã: quæ si extra promineat, morbum in figura progignit: si verò in capite emineat, morbum etiam in via, & nonnunquam in numero aucto efficit, vt polypus in naribus, & caruncula in meatu vrinario, aut carnis fungosæ extuberantia in vlceribus, quæ quid additum præter naturam efficit: nam si membrum aliquod plus iusto excrescat, ad magnitudinem præter naturam adauctam referri debet.

Causæ.

Huius excrescentiæ causa est, ybertas alimenti, cæterum adeo vitiosi quod in similem substantiã omnino vertere nequeat natura, quod non valuit excrementitiã partem ab eo separare: & sic caro quæ fit, vt præter naturam & morbum efficiens in dicatur: vel fit propter naturæ impotentiam, quæ nequit resolueri & separare ab alimentosa parte quod inutile est, & vitiosum: & sic caro quidẽ fir, cæterum vitiosa & præter naturam, adeo inutilis & aliena à præexistentis carnis conditione, vt nullatenus fortiatur veram vnionem, & coherentiam. Sic profectò fiunt fungi, ob spumofum & quodam modo viscidum succum: carunculæ, ob terrestre alimentum & crassum: fiunt polypi ex maligno humore, crasso tamen vt Hippoc. statuit, & confirmauit etiam Galen. qui copia plus carnis efficiunt, vitio tamen exulceratã & sine cute, & ob leuẽ quandã similitudinem cum præexistente carne caro efficitur, coadiuuante praua partis temperie & vlceroso calore.

Li. de. aff.
3. per lo-
ca. cap. 3.

Quos sanè tumores, vt nemo est qui facile non noscat, ita difficile est ipsos curare, quia plerunque in cancrum commigrant, & cancrofa accersunt vl-

Curatio

F cera.

Institutionum Chirurgicalium

cera. Quo fit, ut eos prudenter tractare ac præcauere & curare oporteat, ne in prædicta mala commigrent. Verùm cum quadruplex sit eorum causa, tot quoque erunt curandi viæ ac rationes: vna quæ humoris copiam demat: secunda quæ vitium corrigat: tertia quæ quod carnis genitum est, conterat: quarta verò quæ temperiem partis, & eius vires ad antiquam sanitatem redigat, quominus deinceps iterum crescat. Copiam vitiosi alimenti demes victus parsimonia, exercitio, frictionibus, & sanguine prius misso, ac exhibitis medicamentis purgantibus quæ ideam humoris respiciant: sunt enim plerumque pituitosi crassi, & nonnunquam acres & falsi, aut nitrosi, adherentes & resolutioni ineptissimi, & ob id sudationibus, balneis, & his quæ humorem corrigant, & per insensilem halitum digerant, vrendum erit. Item si membrum aliquod materiam præstitit, fontaneliam iuxta ipsum aperies, insuper caput exficcare curabis. Humores tamen peccantes semper corrigere studebis, & expulsionem præparabis, & alimoni, quantum possibile fuerit aptos reddes, serapijs & potibus, quæ attenuent, liqueant, fundant, calfaciant, & concoquant. Item præstitis alimentis boni succi & tenuis substantiæ: tandem factis per epicrasim purgationibus.

Quibus præmissis, ad carnis supercrescentis extirpationem devenies, sumpta pro exemplo polyphi crescentis carne. Cuius rei gratia, in memoriam renocare oportet Hippocratis doctrinam, ubi varias polyphi annumerat species, quibus ferè comprehendit omnes carneas excrescenzias.

Li. 2. de
morb.

tias. Inquit enim : Si polypus fiat in naso, ex medio cartilaginum dependet veluti gurgulio, & ubi spirationem facit, progreditur foras, & est mollis, ubi verò inspirationem, retrocedit, & loquitur obicure. Altera species est quādo nasus carne impletur dura, quæ omnino respirationem per nasum impedit: item altera quando ex nasi cartilagine supereminet caro quædam rotunda, mollis tamen, similis foëminarū māmillis, vt statuit Celsus. Præterea iuxta cartilagines adnascitur caro duritie lapidea insignita: denique varijs succrescit figuris, & modo substantiæ: nam quidam adeo crescunt, quòd extra nares promineāt: alij secus: nonnulli ab intimis nasi foraminibus appendent: alij prope pinulas aut cartilagines adnascuntur: sicut alij radices habent exiles: plures, crassas: quidam rectâ procedunt: alij varicosi sunt: & nonnulli cancri fluminalis figuram æmulantur.

His suppositis, carnem adnascentem sic tractare oportet: si enim nuper exorta fuerit, & adhuc incrementum incipiat, repellentibus vtriusque pharmacis, vt consuluerunt Hipp. & Galen. quibus admiscere oportet quæ vim etiam fortiantur discutientem cum adstrictione & siccitate: cuius naturæ est succus granatorum acrim & dulcium cum corticibus expressus, melli & origano admixtus, sumptusque per nares, aut penicillo linamento madefacto intra nares posito. Prodest eadem forma radix acori cum prædicto succo & pulueribus myrrhæ. Verum si augmentum non cessauerit, considerabis, sit ne polypus aut quæuis alia carnis excrescentia, alba, mollis, cui mitiora medicamenta ad erosionem sufficiunt: nam hæc est indicatio,

Lib. 2. de
morb.
3. per. 2. ca.
c. 3.

Institutionum Chirurgicalium

quam alijs inutiliter tentatis exequenda venit, si-
cut si siccus, aut ruber vel malignus fuerit: nā cau-
tiūs eis agendum erit: quippe à vehementioribus
exacerbatur, & mitiora nihil profunt. Sic conficere
poteris id q. r. aluminis, myrrhæ, sandaracæ, ana
3. ij. gallarum, vitrioli cremati, ana. 3. f. fiat pulvis,
qui vtcunq; positus vim habet exedendi leniter
carnem illam supercrescentem. Alia loco citato
innumera conscripsit Galen. efficaciora, quibus si
vtaris, laborantis os aqua frigida plenum per inter-
ualla tenere consuluit Aetius. Quo facto vt deci-
dant scaræ, sternutamentum mouere oportebit hy-
dromellite, aut alio leui auxilio: sic enim reiteratū
medicamentum hoc plurimum prodest. Quòd si
hæc sufficere non videantur, prætermis-
sionibus Hippocra. ad manua-
lem operationē per-
uenire oportet, vel ferramenti ignitis, eo ingenio
quod consulit loco citato Hipp. nimirum immisso
cauterio per fistulam argenteam intra nares posi-
tam, quo citra narium læsionem, ignis attingat car-
nem supercrescentem: quā si manibus habere pos-
sis, sicut in extimis partibus, foret vtilissimum no-
uacula scindere, & igne partem vrere: postea vt
Vlcus vltum curare, vt suo loco reperies. Paulus ta-
men vulgarem scissionem & curationis
viam ostendit, qua ferè omnes Chi-
rurgi vtuntur, dum scissione
est opus.

Lib. 3. de
morb.

DE TUMORIBVS REDUCTIUIS seu extrauagantibus

INSTITVTIO. X.



VNT insuper alię tumor-
um sortes, quę licet re-
duci ad aliquod ex prædi-
ctis generibus facile pos-
sint, cum hoc tamen quia
contenta intra hos tumor-
es substantia omnino aliã
formã adepta est, & pror-
sus degenerauit ab humo-
re ex quo fit, atque etiam clarioris doctrinę gra-
tia, tanquam superuacuos & extrauagantes, seor-
sum eorum meminisse decreui. Huius profectò na-
turę sunt atheromata, melicerides, & steatomata,
verruca seu porra, myrmecia, acrochordones, cla-
uus, thymion, cornua, calli, dracunculi, pustulę, le-
pra, lichen, scabies, alphi, vitiligo, ionthi, epinycti-
des, sudamina, psyraces, morbilli, variolę, exanthe-
mata, ecthymata, papulę, terminthi, dactra, & men-
tagra: item sunt alię cutis tumorosę defedationes
ex morbo Gallico ortę.

Sunt itaque atheromata, melicerides & steato-
mata, de genere pituitosorũ tumorum: cum hoc ta-
men, quia ante eorum generationem pituita à pro-
pria forma destituta est, separare fuit equum, siqui-
dem atheroma tumor est concolor & indolens, in
membrana seu neruosa tunica humorem lenrum
continens pulti persimilem: & meliceris etiam tu-
mor est similimodo dolore carens, sed rotundus,

Institutionum Chirurgicalium

In quo nervosa etiam tunica inclusus humor reperitur, tenuis & mellis substantiam representans: steatoma verò tumor etiam est concolor & tactu lenis, sed temporis progressu aurescens, in quo humor sæpo per similes, membranula similiter inclusus reperitur. Præter quas substantias etiam in eis visi sunt veluti pili, ossicula, carbones, testarum fragmenta & plures alia substantiæ.

Curatio

Horum tumorum curationem, præmissa causæ antecedentis providentia, per pituitosi, crudi & pinguis humoris præparationem, & purgationem, Vt de oedemate dictum est, fiet: ceterum ad causæ coniunctæ ablationem accedendo, eam extirpabis, per ea quæ resoluendi vires habeant, quale est emplastrum quod recipit radicis cyclaminis quod satis, axungia veteris, sulphuris vini, ana partes æquales, contundantur & fiat emplastrum: idem facies eo quod recipit passularum sine acinis nu. xx. squame eris. 3. s. misce. Item passularum sine granis lib. s. cumini triti. 3. iiij. nitri. 3. j. s. contundantur & misce. Aliud efficacius recipit salis ammoniaci, spume argenti, ceruse ana lib. s. cera, terebinthine, galbani, opopanax, ana. 3. j. rubricæ sinopice. 3. vj. aceti. 3. iiij. s. misce. Quod si discutere aut resolvere nequiveris, ad erodentia medicamenta te conferes, quale est quod fit ex calce, sapone & lixivio: & illud quod recipit calcis vine. 3. s. facis vini combustæ, nitri tostæ, ana. 3. ij. minij. 3. j. cum lixivio fiat emplastrum. Vti etiam poteris eo quod recipit spume eris. 3. s. arsenici rubri. 3. ij. ellebori nigri. 3. j. s. cum rosaceo fiat emplastrum: quo facto scaram profundam inducito, abscessum per medium secato, recta linea sectionem

nem ad carnem viam producit, in sectionis locum arsenicum sublimatum, aut aliud ex iam dictis causticis immittito, donec exedatur totum illud quod præter naturam est, & cistim ex toto extraxisse compereris: aut scalpello vndique separabis, & postea sanguis qui fuit spongia oxicato imbuta sistendus, vel oui albumine cum pulueribus adstringentibus, admittis anodynis. Ad quorum pen sum reliqui tumores glandulosi & strumosi sunt curandi: quippe ex his nullus ad suppurationem perueniet.

Verrucarum varia sunt nomina, diuersæ etiam sortes: porra nonnulli appellantur: quarum quædam myrmecia nomine insigniuntur: aliæ acrochordones nominantur, dissidentes vasi latiori, myrmecia ab acrochordonibus quæ exili vasi appendent: ex harum sorte sunt clavi, thymion, in obsecnis plurumque adnascentes: item in hoc genere reperiuntur cornua & calli. Quæ omnes præmissa corporis prouidentia, per emollientia & excidentia pharmaca aut abscissione auferuntur.

Pustularum & imperiginum & cutis defædationum curationem, institutionibus de vlceribus latius reperies, nam ad institutionis conditionem hæc dixisse

sit satis.

Institutionum Chirurgicarum

DE VVLNERIBVS IN

genere

INSTITVTIO I.



V M vnitas tanquam entis perfectio habearur, meritò ianiras, quæ nostri corporis perfectio quædam est, vnitatē postulat, sine qua nequit obire munia vñtata: qua integritate diuisa, morbus qui oritur solutio vnitatis in genere dicta, vl-

cus aut vulnus specialiori nomine nuncupatur, pertinens ad partes simplices atque compositas, vt ex Gal. constare videtur: vtraq; enim pars naturalē amittit vnitatem: nam quod verè ens est, continuo vnū est; quod verè vnum idē & verè ens, simplex quidem magis propriè: nā quæuis multitudo (vt qua cōstat cōposita pars aliqua vnitate debet cōrineri, cōposita verò minus, vt quæ solūm per nexū quemdā vnita tantū ac ex simplicibus coagmentata sit: & cū hoc adeo arcto nexu vna est, vt in partes sibi similes, minimè diuidi queat: quippe multitudo per se affinis est nō enti tanquā imperfectio, vnitas verò enti tanquā perfectio. At verò vtcunque quæuis earū diuidatur, morbo in soluta vnitate afficiuntur, quē Hipp. appellauit abscessum, licet Gal. hoc verbum solutionē continui cum sinu exposuerit. Quo fit, vt etsi soluta vnitas in vlcus & vulnus diuidatur, cum hoc tamen aliud vl-

cus

Li. ar. me.
c. 8. & de
conf. art.
me. c. 6.

Libr. 4. de
off. ext.
27.

cus & aliud vulnus significare videntur: nam ea vnitatis diuifio quæ in carnosa fit parte, & ex vulnerando relicta eft, & ab vno quopiam tellorum fafta, vulnus propriè dici meretur, vt expreffis verbis diffinierat Gal. Quamobrem Guido & reliqui Chirurghi vulnus diffinierunt, folutionem continuitatis in mollioribus partibus extrinsecus incidentem, quæ recens fit, cruëta, fine vlllo pure, quod Latini plagam nuncuparunt, vlcus verò quòd ab erosione fit carnis ab interna caufa aut ex vulnere inueterato: nam ofsis erosio, non folutio continui, fed caries propriè dicenda eft. Sed ad vulneris diuifiones accedamus.

Vulnus igitur prima fui diuifione difsecatur in tot fpecies, quot funt quæ ipfum à fe ipfo differre efficere poffunt. Sic prima defumitur à natura partium quibus infidet: fecunda ab ipfa vnitatis folutæ effentia & cõplexu cū alijs morbis aut accidētibus: tertia à proprijs differētibus folutæ vnitatis: nèpe à quantitate, fpatio, figura, fitu. Quæ verò à partium natura funt, pro ipfarum diuerfitate diuerfa quoque nomina fortiuntur: nam quædam partes funt fimilares: & aliæ instrumentales organice & compofitæ, & fic pro ipfarum diuerfitate diuerfa quoque nomina fortiuntur. Præterea, pars fimilaris diuiditur in mollem, duram atque mediam inter duras & molles: partes autē molles funt caro & adeps: dure, offa & articuli: mediocres, neruus, tendo, ligamentum, vena & arteria. In partibus autem instrumentarijs vulnera quoque accidunt, impropriè tamem, quia earum vnio folum per adhærentiam & coagmentationem partium simplicium conftat, & membro fuccrefcit cõmoda figura, & ob id folutio illis cõpetit fimplicium ratione,

Li. 3. metho.
Libr. de cõft. art. me.

Institutionum Chirurgicarum

nisi partes scindere. Sūt autem ex organicis, quādam principes partes, quēdam his subseruientes, aliæ verò viles & abiectæ. In quibus ad præfagium & curationem multa notari digna suis locis leges.

Quæ verò à solutæ vnitatis essentia vulnerum differentiæ sumuntur, duæ sunt; ab ipsorum simplicitate vel cum alijs complexu petendæ. Simplex ea appellatur, in qua vulnus, nec morbum aliū, neque symptoma aliquod secum habet admissum, neque cum propriæ carnis deperditione, aut contusione est. A symptomatis etiam complexu oritur vulnus cruciās, dolorosum, pruriēs, vel cū delirio, resolutione, spasmo, animi deliquio, sanguinis profusione, sed simplex quædā solutio vnitatis existit. Compositū verò vulnus id censerī debet, cui adiungitur vel intēperies, vel dolor, vel inflammatio, vel quoduis aliud quod alienum sit à vulneris simplicis natura & conditione.

Tertia diuisionis vulnerū ratio desumitur à proprijs differentijs ipsius solutionis vnitatis, ex vulnere & vulnerate excitatē. Inter quas primū locū sortiuntur quæ à quantitate vulneris desumuntur. Sic vulnerū quoddā est magnū, quoddā paruū, aut longum, breue, angustū, latū, profundū, vel in superficie, aut æquale vel inæquale. Sic à figura appellatur rectū, obliquū, cauum, retortum, rotundum. Ex causa verò quæ extrinsecus accedit, non paucae emergunt vulnerum differentiæ: nam si celsim feriat, dicitur plaga vel vulnus: si punctim ab acuto tello, punctio: si collisum à re graui, in carne quidē consultio, sicut in osse, sed in eo proprius fractura, at in membrana, neruo atque vena ruptio nuncupatur. Quarum sanē causarū inscindentū, quæcunq; longiore

giore sunt acie pungunt, quæ mucrone sunt præ-
tenui, ut sagittarum animalium morsus. Contundit,
casus, violentia, motus vehemens, vociferatio. Mul-
tifariam agunt venabula, retusa tela, & quæcunque
vulnerando contundunt. Ex quo fit tres esse pri-
mas solutæ unitatis differentias: vulnus quod par-
tis est mollioris aut mediæ, ut cunis, carnis, pin-
guedinis, venæ, arteriæ, nervi aut membranæ:
punctio quæ vniuscuiusque partis perforatio exis-
tit: cõfusio seu collisio mollioris partis frequens
interior diuisio, externa facie integra. Durio-
ris verò partis, ut ossis, quod irruenti corpore
duro, dum non intro cedit, nec in se compellitur,
solutio fractura est: cæterum si propter mediæ
ossis spongiositatem intro cedat, parte extima si-
mulante integritatem, pari ratione cõfusio in
osse reperietur. Ex quarum partium læsione va-
riæ reperiuntur nominum differentiæ: nam in car-
ne plaga seu vlcus soluta unitas nuncupatur: fra-
ctura in ossibus: conuulsio seu distensio in ner-
uis: auulsio in ligamentis: ruptio in musculis: con-
tusio vel collisio à re graui in vasis propriè in-
cidens. Est & ecchymosis, cum ab ictu sanguis
subter cutem effunditur, liuorem in parte in-
ferens, quæ ut plurimum cum contusione rup-
tioneque incidit. Præterea causæ quæ vulnus
influxit, materia & figura, magnitudo & vires
extimandæ sunt: quippe materia aut lignea est,
lapidea, arundinea, ferrea, ærea, plumbea, cor-
nea, aut vitrea. Figura item, quæ aut acuta est,
aut obrusa, recta, curua, angulosa, sulcata, aut
speculis alata. Magnitudo teli consideranda
etiam est, & vis etiam irruentis: item teli ip-
sius vires intueri licet, nam aut simplex est, aut

venæ.

Institutionum Chirurgicarum

venenata qualitate intensum existit, simplici vt cauterium & septicum medicamentum, venenata, vt tela toxico immersa, aut rabidi canis, serpentis morfu: quæ sanæ non amplius simplicia solitaria sunt vulnera.

Signa.

Signa verò vulnerum, sensuum iudicio conspicua sunt, præsertim cùm præcesserit notitia causæ vulnerantis: ictus nimirum ab ense, gladio, lapide, aut alio teli genere: signis autem distinguere, quæ pars intra partem extrinsecus solutam diuisa sit, maioris est momenti. Inscissa autem vena, sanguis abunde profunditur, eoq; abundantior, quo maior ea fuerit. Profluit autem continenter & equaliter nullo subsultu, sanguis crassiusculus atque rubicundus: ab arteria verò tenuis, flauus, feruidusque emanat, neq; is æquabiliter, sed pulsu quodam & saltu. Nervo autem seu punctum seu celsissimum vulnerato, motus ac interdum sensus perit, aut certè offenditur, torporq; accidit partibus vulnerei subiectis, dolor ingens excruciat, inflammatio parri succrescit, nonnunquam in gangrenam desinens: febris, & sæpe delirium excitantur, conuulsio quoque insequitur, idq; frequentius pūcto, & quadantenus fecto potius quàm præciso nervo. Vulneratis quidem tendonibus aut membranis, quæ tum calvariam, tum reliqua ossa cōuestiunt, eadem signa sed obscura obtinuit, multoq; magis cæsis articulorum vinculis. Os vulneratum esse, si nudatum est, crede, aut saltem cōtusum. Insuper, quam intus partem, vnumquodq; vulnus penetrans attingat, sic nosces: si ex capitis vulnere meninges vulnus occupauerint, atrocissimus dolor inest, qui & mansit, adductisq; maxillis & spiritus contentione exacuitur. Protinus vomitio consequitur: sanguis intro effusus

effusus nonnunquam vel é naribus, vel ex auribus, vel ex oculis promanat: sensus interdum obtunduntur, nerviq; distenduntur, nec multo post febris, atque mox delirium, exoriuntur, præsertim si inflammatio eas partes occupaverit. Si cerebri quoque substantia offenditur, ut facile fit, cum amplificatum (ut in plenilunio) omnem capitis cavitatem implet, mens vacillat, & omnia symptomata exacerbantur, ac sæpe cerebri portio excidit. At si alius in cerebri vetriculos vulnus sit inflictum, aut si caui sint oculi, repentina mors sequitur. Cum pericardii vulnus in cauum subit, expiratione flatus erumpit, atq; vel aloës, vel myrrhæ, vel aristolochiæ pulvere in vulnus effuso, mox amaror impartitur ori. Vulneratis pulmonibus præter hæc, spiritio spumans, cruenta que fertur, spiritus difficile atque cum sonitu illiditur, & marcor ac febris (ni repente homo moriatur) ipsum corripit. Consauciato corde aut pericardio, protinus extrema frigescent, & mors in propinquo est, præeuntibus frigidis sudoribus, effuso spiritali calore. Transfixum diaphragma præcordia conuellit, summam infert difficultatem spirandi, delirium quoque, nonnunquam rursim & spuitionem cruentam. Vulnerata gula, nullus cibi potusve transitus est: nam quidquid assumptum fuerit, protinus euomitur, singultus, animi defectus, & plerumq; convulsio distorquet. Et vetriculi vulnere, quod in capacitatem subit, cibus & potus erumpunt, vomitio quoq; frequens est, & singultus. Dissectis intestinis fæces minimè descendunt, sed in abdominis spatium dilabuntur, graui exorta putredine, atq; plaga vel fæces ipsas, vel earum odorem fundit. Iecoris aut lienis vulnus, cum per summam est, præcordia ad spinam reducit, cruentas,

tum

Institutionum Chirurgicalium

rūm defectiones, tum vomitiones mouet, lateris pū-
ctiones, doloresque ad iugulum quod ē directo
est, animi defectiones atq; febrem, & alui pro-
fusio, quibus tandem corpus quasi atrophia liques-
cit & absumitur: & quod alius vulnus infligitur,
animi defectione frequenti, sudoreque frigido
mortem accelerat. Rene etiam læso, mictio fit cruē-
ta, eaque parcior, dolor ad inguina atque testes de-
uoluitur, vrina sub abdomine collecta hydropis
quamdam speciem exhibet. Eadem propemodum
& percussa vesica exhibet, atque insuper vomiti-
onem, singultum, deliria, vrinæ profusionem
ex vulnere proijcit. Discissa spinæ medulla, infu-
mæ partes resoluuntur, earumque motus ac sen-
sus, omnisque functio interdicitur, vt etiam modò
stercus, modò vrina, modò semen præter volun-
tatem exeat. Rarò insuper simplex vulnus existit,
sed ferè partes plures occupat atq; comprehendit,
ex quibus & multa & varia signa existunt.

**Vulnerū
iudicia.**

Adeo iudiciorum in vulneribus cognitio Chi-
rurgo apprimè necessaria est, vt ipsi ignoratis,
neque predicere, neque efficere quidquam certū,
tutum ac vtile possit: & ob id sciendum est, quæ
vulnera lethalia sint, ac insanabilia, & quæ diffici-
lem curationem habeant, aut quæ promptiorem.
Est enim, vt monet Celsus, prudentis hominis pri-
mū, eum qui seruari non potest, non attingere.
Elicies quidem ex tribus vulnorum omnium iudi-
cium: ex partis nimirum affectæ substantia, vsu at-
que actione: ex propria ipsius dispositionis essen-
tia: & accidentibus, quæ vulnerato superueniunt.
Iudicat enim Gal. magna & graua vulnera nō me-
diocriter habere periculum: nam siue in parte prin-
cipe

Lib. 5.

4. meth.

eiſe ſint, ſiue ſua natura magna ſint, ſiue mali moris, ſemper verenda ſunt. Sic vulnera capitis, thoracis & ſimilium, lethalia iudicat Gal. item, quæ adeo magna ſunt, quòd futura aut ligatura indigeant, cuiuſmodi ſunt, quæ principales muſculos per trãſuerſum ex toto diuidunt, magnalq; venas, neruos, & arterias habent ſolutas. Vulnera etiam cacoerhe eſſe, quæ in articulis ſunt, arbitrandum erit : vbi enim tendones & nerui ac ligamenta carne vacua, atq; oſſea loca ſunt, hîc doloris, vigiliarum, conuulſionis & delirii periculum inſtat. Quorum etiã vulnerum meminerat Hipp & Gal. ſtatuentes ea eſſe, quæ ſunt in capitibus aut ſinibus muſculorum, & maximè neruoſorum, ſiquidem capitibus eorum nerui adiunguntur, & ſinibus tendones. Libr. 5.^o
aphor. 66

Lethalia & inſanabilia ſunt vulnera cordis ſubſtantiam attingentia, ſicut & tumores præter naturam: item magna & profunda vulnera ſubſtantia cerebri, iecoris, diaphragmatis, œſophagi, ventriculi, aſperæ arteriæ, pulmonis, lienis, ciſtis fellis, renum quoq; & tenuium inteſtinorum, ſicut quæ ſpinæ medullam lædunt, & venas & arterias magnas iuxta fauces ſcindunt.

Ea autem vulnera, non ex neceſſitate, ſed ut plurimum lethalia dicuntur, quæ ad prædictarum partium regionem perueniunt, vel eas leuiter duntaxat attingunt: quæ ſi rectè tractentur, conualeſcere poſſunt, & ob id non ex neceſſitate lethalia debent iudicari.

At vulnera ea omnium tutiſſima ſunt, quæ in partibus carnoſis exiſtunt, vbi veng parue & arteriæ & pauci nerui reperiuntur, & ea quæ in corporibus boni ſucci & habitus inſiguntur.

Medio autè modo ſe habet vulnera, quæ in capite muſcu-

Institutionum Chirurgicarum.

musculorum carnosorum longè à iuncturis & tene-
poribus, thorace & ventre incidunt. In quibus si
peccatum sit, vereri oportet ne lethalia fiant, & ob
id cautè est procedendum. His omnibus fidem ma-
iorem ad salutem aut ad mortem prædicendā præ-
stant accidentia quæ superueniunt, aut secus: nam
febris, syncope, perturbatio mentis, conuulsio, gra-
uis dolor & copiosus sanguinis fluxus verenda om-
nino sunt: si verò citra hæc curatio fiat, securitatè
ac certam salutem promittit. Cum autem pericu-
losa vulnera esse dicimus, periculi nomine, vel mor-
tem, vel partis sphacellum dicunt, aut affectû par-
tis impotentiam perpetuâ & sensus aut motus abo-
litione intelligimus. In summa, quæcunq; vulnera
magno impetu & magna vi illata magnam attule-
re noxam & grauiâ accidētia, vel interiora viscera
læserunt, ea omnia habenda sunt inter lethalia aut
difficilia. Quòd si hæc omnia adinuicem cum vi-
ribus laborantis conferre volueris, poteris quidem
& coram populo ac magistratibus certum proferre
iudicium de salute aut morte laborantis. Quæ sanè
omnia sūma animaduersione expectare atq; digno-
scere peritus Medicus debet, vt si quando illi corā
magistratu de illatis vulneribus pro testimonio
dicendum sit, rem totam ad veri normam expri-
re queat: quæ vna cautio illi summopere tenen-
da est, vt nunquam à vero discedat, præsertim vbi
de capite agitur, nec inuore, inuidia, odio aut alia
vna perturbatione affectus, aut metu minisve cu-
iuspiam impulsus, à Dei timore, à veritatis amissi
declinet, sed vulneris naturam, magnitudinem, se-
dem affectû, & quæ in eo lethalia aut secus symp-
tomata apparuere, accuratè describat, & quoto die
insequuta mors sit explicet quæ intus læsa sint,
quàm

quàm altè telum descenderit, vt cautè & prudenter sententiā proferat, cauens ne temere quidquā pronuntiet: nām sepe ex minimis & omnino contemnendis vulneribus mortem inopinatò succreuisse visum est. Quippe dictum est ab Hippocrat. ab omnibus cuiusvis generis vulneribus mori homines contingit: sicut & magnis & lethalibus citra vllam spem laborantium plurimos saluti esse restitutos: vt etiam loco citato, & in epidemijs mille historijs retulerat idem author, & Galen. lib. 8. de vsu part. Nam vires, inquit Gale. vbi valentes sunt, omnia contemnunt ac tolerant: vbi verò infirmæ, vel à quouis offenduntur. Et ob id proferendum non est in iudicio, si non fuisset vulneratus nunquam interiisset, quantumuis in victus ratione peccasset: nec sufficit dixisse, vulneratum mortem nunquam subiisse, si omnia secundum rationē effecisset: siquidē nō solū fame tuæ consulere teneris & opinioni, sed nihil quod cedat in damnum laborantis, aut liberorum eius proferes: nec omnino culpam regeres in percussorem, si re veravulnus suanatura lethale non fuit. Sed curationem etiam adhibeam recensear, ne vel incuria, vel ignoratione, periisse eger videri possit, aut mancus su-
peresse.

2. porrhē
ti.

Libr. 6:
apho. 18.
Libr. 10.
meth.

Institutionum Chirurgicarum

DE VNIVERSALI VVL- nerum curatione

INSTITVTIO. II.



V LNERVM curatio
(propter diuersa, quæ consi-
deratione digna se se offe-
runt) adeo est varia & dif-
fusa, vt neque memoria te-
neri, neque intellectu discer-
ni, atque comprehendi fa-
cile possit. Quapropter cõ-
pendio ea omnia, quæ huic

ministerio necessaria sunt, complecti studui, in-
itio sumpto à communissima vulnere indicatio-
ne. Omnis itaque continui solutio, vt Gal. est mēs,
vñionem & agglutinationem postulat, & ad sui me-
dellam indicat, quæ in instrumentalibus quidem
partibus dissectis minimè perfici potest, in simpli-
cibus quibusdam, carne videlicet ac pinguedine,
potest, in osse verò solum interueni calli, nisi in
pueris. Constat enim quod diuisum est, vñione
esse sanandum, quod vñioni diuortio sit contra-
ria: at verò per quæ ea fieri debeat, non est ita fa-
cile inuentum: nam operatio hæc à natura ceu opifi-
ce, suarumque virtutum & alimenti adiutorio per-
ficitur, atque etiã à Medico, ceu idoneo naturæ mi-
nistro. Vt autē coalitionis finem assequamur, qua-
tuor veluti scopis vti oportet: quorum prior est,
vt extrinsecus incidentia, quæ multa labris vul-
neris intercidere possunt, qualia sunt pili, sanguis
concretus, arena, puluis, ossiū frusta, armorum cus-
pides,

Li. ar. me.
c. 90. 91.
92.
Li. 3. 4. 5.
& 6. me-
thod.

pides, & alia minuta infixa ex vitro, aut ligno, vel hasta, ea omnia amoveantur. Secundus scopus, extrema distantia applicare, atque ad se ipsa adducere iubet. Tertius sic commissa labra atque adducta conservare. Quartus læsæ partis substantiam tueri servareque præcipit. Quibus accedere quintus scopus potest, ut symptomata quæ succrescunt corrigamus.

Primam itaque intentionem assequemur ammotio-
ne causa vulnerantis, si quid eius aut alterius rei,
quæ coalitum vulneris impediat, ibidem manse-
rit. Nam licet causa externa nullam præter in cu-
ratione vulnerum indicationem, quia protinus
abiit, ut Gale. est mens, magni etiam est momenti
ad cognitionem: nam talem impressit effectum qua-
lis ipsa est, & vis quæ vulnus effecit. His habi-
tis, dum insiguitur & remanet in parte vulnera-
telum, aut teli pars, aut quodvis aliud, ante om-
nem curationem, tanquam impedimentum, sui re-
motionem indicat: quamobrem illud prohibens,
protinus oportet instrumentis aut medicamen-
tis auferre, si prius diligenter consideraveris, an
extrahi possit, & an tutò, & rursus an postea vul-
nus curari possit, vel frustra sit carnem ulterius la-
cerare: cum hoc tamen, si spes vitæ subest, reo ex-
tracto, tentare extractionem oportet, id quæ vel pro-
tinus, si fieri possit, ante inflammationem, vel
postea, carne putrefacta. Instrumenta autem
talita sunt effingenda, qualia postulaverit teli in-
fixi forma, aut modus infixionis. Nam sic tela
longa & angusta, ut sagitta est, educenda sunt par-
te aduersa, præcipue quæ magis laniant, si retro,
quæ si contra trahantur: itaque contra aperta via,

5. met. cap.

Institutionum Chirurgicalium.

caro deduci debet ferramento apto, deinde ubi apparuerit, si mucroni arūdo inhæret, propellēda est sagitta, donec ex altera parte apprehēdi possit. Verū si hasta discessit, solumq; mansit ferrum, digitis aut forcipe apprehendi debet & extrahi. Quod si per quā partē infixā est sagitta extrahere velis, eodem modo ampliato vulnere, digitis, volfellis, aut forcipe quā mollissimē ac citra dolorem extrahes.

Quod si tela sint spiculata & parua, forcipe ibidem comminui debent, vacuumq; & mune ab his telum educi. Verū si spiculā maiora fuerint, fixis scriptorijs calamis contegenda sunt, ac ne diu lacerent, sic euellenda. Alij spicula ipsa forcipibus, aut tenaculis apprehendunt, atq; ita telum eximunt.

Quod si telum latum sit, & reconditum, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere ipsi quoq; ingens vulnus adiiciamus: euellendum ergo est genere quodam ferramenti, quod Diocleū eraphiscum Græci vocant.

At si tela rotunda sint, nempe globulæ, plumbeæ aut ferreæ, quæ bellicis tormentis mittuntur, sic extrahenda veniunt. Corpus vulnerati hominis ea figura constitui debet, in qua erat in eo tempore quo vulnus accepit, atque ita quō tetenderit telum speculo explorandum est (hoc autem in omnibus telis extrahendis obseruandum erit) si autem eger id non potest, iacens saltem, ita debet collocari, ut ad eam figuram maximē accedat. Quo facto, latius vulnus aperiendum est, idq; quo inest, ea qua venit recipiendum denticulata forcipe, si eam vulnus adniserit, extrahendum. Quod si telum
infi-

infixum sic intus lateat, vt non satis commodè extrahi possit, dimittendum est, donec natura ipsum trudar aut manifestet : tela aliquando integra intus infixa, cicatrice obducto vulnere, citra noxam deliquerunt, & longo temporis spatio partem eam abscessu occupante ac dirupto exilire visa sunt.

Præterea non sat est considerare tela intra vulnus mansisse, sed diligenter rimari oportet, an carni, an ossi vel articulis adhærentia & fixa sint. Nam si carni, tunc vltra considerabis an præsit in superficie, & qua venas magnas non ruperunt, ea tantum parte extrahenda sunt : quòd si altius penetrauerint, aut ea parte, si telum amplum sit, aut si secus vt antea dixeram, cauentes venas, arterias, nervos, & ne magna fiat sanguinis profusio, maximè si fluxio detinebatur telo infixò, quo extracto sanguis libere profluit.

Verum si tela ossi inhæreant, non nisi attrahendo ipsa eximere tutum est : eo autem vsque mouendum est telum, donec is locus laxetur in quo mucro infigitur, & tunc vel manu vel forcipe telum extrahendum est. Quòd si telum altius in osse descenderit, quod cognoscimus si firmiter nulla vi moueatur, excisorio cultro osse, quod iuxta est exempto, aut etià terebro, si crassum sit, prius perforato, quo facilius telum extrahemus.

At si in articulo infixum telum fuerit, circa vulnus duo membra fasciis auenisve deliganda, & per has in diuersas partes deductas trahenda sunt, vt tendones, ligamenta & nervos distendant, quibus extensis, laxius inter ossa spatium est, vt sine

Institutionum Chirurgicarum

difficultate reſum recipiatur : ſed illud quoque videndum eſt, ne quis neruus aut vena aut arteria à telo lædatur, dum extrahitur.

Quibus peractis, quæ impedire poſſunt vulneris vñionem, diligenter rimari oportet, ſuperſit ne aliquid intruſ extraneum, vt pili, ſpinæ, oſſicula, ſurculi, lapides, vitri fragmentum, puluis, arena, ſanguinis grumus, aut aliquid eiſdem naturæ. Quæ ſane medicamentis, ſi manu, aut tenaculis vel penicillis abſtergi vulnus non poſſit, auferenda ſunt. Verùm ſi oſſis fragmentum adhuc periſſio adhæreat, prætermiſſis de hac re opinionibus, ipſum digitis, forcipe aut quouis alio inſtrumento prius extrahes, cauens ne membrana dirumpatur, lacereturve, dolores enim & conuulſiones non raro accerſit, & ob id tutius eſt forcipe ſcindere, circa periculum venæ aut arteriæ, quàm violenter euellere : raro enim coaleſcet os ex toto ſeparatum. Reliqua verò medicamentis ſimplicibus extrahes, præmiſſa vino facta alluſione : poſtea verò reliquum extrahit diſtaminus, rapſia, ſagapenum, ammoniacum, ariſtolochia radix, rana combuſta, radix arundinis, propolis, viſcus, opopanax, ſex vini uſta & fermentum. Quod etiam efficacius præſtat emplaſtrum ex radice arundinis & melle, vel alio quod recipit lapidis magnetis. ℞. j. radice ariſtolochie vtriuſque ana. 3. j. polypodij, viſci, ana. 3. j. ſtercoris anſeris. 3. j. ſ. ammoniaci, galbani vino diſſoluti, ana 3. j. propolis. 3. ij. olei liliorum. 3. ij. mellis. 3. j. fiat emplaſtrum. Cui ſimile efficies linimentum ex puluere magnetis cum aliquo detergente in rotunda poſito, ita vt rotunda non attingat rem quam niſimus extrahere.

Secun-

Secunda vulneris curandi intentio ab ipsius morbi natura, in partium separatione sita, petenda est: quæ labra quæ dehiscunt committere & vnire docet & præcipit. Neque enim agglutinari vulnus potest, nisi prius orarum ipsius ductio fiat. Varijs autem modis coniungi in vnum dissidentia possunt, vinculo nimirum, futura, & fibulis. Vulnus quidem si simplex est & exiguum, atque in parte molliore constans, sola partis deligatura orbiculatim fascia circumdata, coalescere facile potest. Coalitionis eius opifex & præcipua causa natura est, quæ alimenti interuentu ex sanguine carnem generat, partibusque vulneratis ex æquo applicat, vnde coalitus fit. Deligationum autem triplex est modus: vnus agglutinatorius: ex pulsiuus alter: & tertius ad retinendum proficiuus. Primus quidem simplicissimis vulneribus & ossium fracturis ex vsu est: expulsiua deligatio varicibus, sinuosis vlceribus, & his in quibus præcauere ne ad partem ampliùs fluat, aut quod retinetur exeat, curamus: retentius ligationis modus his proficiuus existit, quibus non licet compressionem moliri, vt in gutture & ventre, vbi solùm mens est medicamenta continere fixa in parte. Fiant autem ligaturæ ex linteo veteri, mūdo, & non admodum tenui, at cum compressione mediocri, & sine nodo, solùm futura alligata, vt placuit Cello & Gal. fascia autē sit eius amplitudinis quæ impleat longitudinem vulneris sufficienter. At verò vbi maius vulnus fuerit, labraque longè dissiata, tum vt coëat vulnus, futura opus erit, tum etiam ligatura, atque ijs præsidijs quæ glutinandi vim habeant, quæque collectam sanie deliccare commodè queant. Sui autem carnosæ partes

Li. 5. de
officina
med & 6
Meth. 5

Institutionum Chirurgicalium

partes vulneratae per longitudinem musculi commode debent, ut quae futuram facile admittant: nam transuersae fibulae opus habent: quae sanè tribus modis uniri & coniungi possunt. Primo futura ex filo forti, aequali & laevi, cuiusmodi est sericum, in communibus saltem vulneribus: in quo opere necessum est primum punctum efficere in medio divisionis vulneris: deinde alterum in medio spatio utriusque lateris, & eodem modo deinceps procedes, ut inter duo quaeque puncta punctum intercedat, donec vulneris labra rite commissa fuerint, ita ut futura, nec nimis rara, neque admodum crebra sit: nam illa non coniungitur: haec verò plurimum afficit, & inflammationem accersit: item futura neque nimis arcta sit, ne dolorem concitet, & impedimento sit expulsiioni superflui, neque nimis laxa, quia labra non coalescent. Atque ubi acus una cum filo permeauerit specillo huic parti applicato, veluti fulcrum & adminiculo nitatur, ne cum filo labrum etiam trahatur: postea duobus nodis ligatum filum scindatur, aliquantulum remotè à nodo. Hanc autem futuram incarnationem vocarunt Chirurghi, proficuum quidem praedictis carnosissimis vulneribus quae ligatura coniungi nequeunt. Deinde glutinatorijs utendum est, quae collectam humorum colluviem desiccare & consumere queant: ac ne amplius influat prohibeant. Verum in cutaneis affectionibus, & membranarum aut intestinorum vulneribus, alio suendi modo utendum est (praesertim si fluxus sanguinis alio uti non coefferit) qui sit ad pensum & modum quo pelliceae vestes fiuntur: quae futurae modum sanguinis retentivum aut fluxus cohibitivum nuncupant. Quibus futuris tertia addi potest labiorum unitorum conservativa, similis quidem

dem prædictis, minus tamē compressa, quia solum
nitimur vnita continere labra, interim dū vlcus cu-
ratur: ex quibus constat triplicem esse futuræ mo-
dum. Quod si adeo patens vulnus fuerit, vt futura
aut ligatura eius labra comitti non possint, sibilis
impositis adducere ora solebant antiqui, sed harū
nunc vsus perijt, & in lenibus vulneribus, aut fa-
ciei, earum loco ea futura que sicca à Chirurgis ap-
pellatur, successit: quæ sanè sit ex pannis adstrin-
genti glutine illitis, & parti admodum, filisque seri-
cis validioribus ab viroq; linteolorum capite im-
positis & inuicem copularis: linteola sint magnitu-
dine, quæ membro læso congruere videatur: glu-
tinum verò recipiat puluere sanguinis draconis,
thuris & mastichis, sarcocollam, picem & polynem
farinæ volatilis, quæ omnia cum oui candido subi-
gi debent, & supra pannos extendi: qui vtrinque
postea ad latera vulneris ad pollicis vnus distan-
tiam positi, agglutinandi sunt, atque post ex-
siccationem comprimendi sufficienter: nam polita
fiet cicatrix, aut amplior, & euidentior, si labra non
satis comprimantur. Alios coniungendi vul-
nerum labra modos breuitatis gratia, & quia iam
ab vsu recesserint consulto prætereo: præter quæ
quod ferè omnes Chirurghi eorum meminerūt: sic
enim vulnera ciliorum, aurium & narium ac labiorū
suntur modo secundo vt plurimum.

Sequitur tertius scopus in vulnere curatione
seruandus, vt diductorum ora, quæ iam in vnū per
adductionem coniancta sunt, maneat, & seruentur:
quod iisdem ferè auxilijs perficitur, quibus in
idem adducta sunt, congruo inquam membri posi-
tu, quiete, deligatura, atque futura, adhibito albu-

me oui, ac si id non profuerit, & pars ex humidioribus sit, addito pulvere thuris & sanguinis draconis. In qua re statuendum est, duplici ratione agglutinari quæ commissa sunt: alia quidem per se, nulliusque alienæ substantiæ interuentu, vt caro ipsa, & quæcunque sequacem habent ad vñionem materiam, præexistenti similem factam, quæcunque vero dura siccaque sunt, vt ossa, nerui, ligamēta, cutis, & quæ seminalia sunt, eorū partes sine glutino coire non possunt. Denique adhibebis siccātia auxilia, quæ duplici nomine proficua sunt, vt Hipp. est mēs de vlce. & Galen. 4. Meth. cap. 5. & 5. cap. 2. nimirū vt absumatur humor suffusus, & vt restitatur vñitas: illud quidem fit absumpta humiditate, quæ tum ex affluxu humorum, tum ex morbo & intemperie partis congeritur: hoc verò, quia partes redduntur similes sano, qua similitudine conciliata restituntur vñitas. Itaque medicamenta quæ cruentis vulneribus statim proficua sunt, omnia habent vim siccandi & non nihil adstringendi, vtroque autē nomine contrahunt partes diuisas, & idcirco seruant inter se coniunctas: repellunt præterea influentem humorem: exprimunt si quid inter oras funditur, quod possit contactum impedire: redigunt solurā partem ad siccitatem naturālē, neque suppurare humiditatem permittunt: cū hoc tamen nō sunt adeò sicca, quòd omnē humiditatem cōterant, vt quæ cicatricem inducunt: præter id quòd morfu carēt, & facultate detergendi: qualia sunt quæ nuper diximus primo die debere apponi. Idē. profectò facies sequenti die, leniter semotis ligamentis, & sic eodē modo, donec labra vñita esse compertias ex futura laxitate, & carentia doloris, & excrementorum in vulnere: quo tempore & antea vino vtēris stiptico,

co, maximè post futuræ abscissionem, ne vnita labra faciliè secedant.

Partis autem substantia adseruatur (quod quartus scopus pollicetur) duob9 modis: vno custodito eius tēperamēto, substantiæ modo, & habito respectu ad partis officiū. Tēperatio partis similib9 præexistētī tēperamento perficitur. Sic caro & adeps quæ humidiores sunt, medicamentis egēt minus siccis quā articuli, qui sicciores. Pari ratione attēdimus duritiē & molliē ac densitatem & raritatem: sic duræ partes sicciora desiderāt, & molles minus sicca. Præterea officiū præstantius maiorem roborationē in particula quærit, & sic multa oportere cōsiderare dicemus parte secunda circa particulam affectam. Verū defenditur à dolore & inflammatione, vel quouis alio symptomate, multis modis: namque faciliè ad partem dolentem humores affluunt, etiam si corpus plethoricum non sit. Et ob id dolorem mitigare oportet & fluxionē auertere, atq; partis calorē cōpescere, deposito sanguine (nisi sufficiēter ex vulnere fluxerit, aut laboras debilis fuerit) per sanguinis detractionē, primò ē lōginquo, ac mox ex proximis vulnere partibus. Itē victus parsimonia & ex tēperatis aut refrigerantibus cibarijs. Similiter omni diuersionis genere, vt. 4. Met. c. 6. Ga. cōsultat. Prohibemus etiā defluxū ad partē, repellentib9, situ mēbri cōmodo, frigoris, & fascijs vt cōsultat Hipp. li. de offi. Me. tex. 24. 25. 26. & 1. de frac. 25. & 26. Itē habita ratione totius corporis, vt cōsuluerat idem author li. de vlce. à principio. Quib9 præmissis, vt ēris oleo rosaceo, aut supra partē vulneratā emplastro ex bolo, aut in parte affecta ex radice solani trita, & folijs malux coctis & pistatis cum vnguento rosaceo, aut butyro, yaccino.

Postea

Institutionum Chirurgicarum

Postea verò leuibus medicamentis (ante septimū si cacochimiae signa praeualuerint, aut post ipsum si fecus) corpus purgabis, veluti manna, casia, catholico, aut syrupo ex infusionibus violarum & rosarum, iuxta ideam humoris peccantis.

Corriguntur porrò in vulneribus eueniētia symptomata, pro ipsorum varietate. Nimis enim sanguinis profusioni, vinculis, fascijs & ligamentis exposita imbutis, aut adstringenti vino; puluere restrictiuo, qui ex Armenia terra, leporis pilis, sanguine draconis, thure, & manna eiusdem constat, oui albo excepro & admoto, tum quiete & congruo membri positu medemur. Conuulsioni, inguinibus, ceruici & neruorum propaginibus admotis, & calente lana pingui oleis lenitiuis imbuta super imposita: seruata tamen prius exacta victus ratione, corporeque purgato. Fit autem vnctio in spasmo ex oleo liliorum, violaceo & anthemidis florū, costino, laurino & butyro recenti, additis styrace, calamintha & rubia, mastiche chia, oliuano, & similibus. Syncopi & animi defectionibus, vini meracioris haustu, frictionibus validioribus, clamoribus & strepitu; & facies ex rosacea aqua vino optimo irroretur: sic enim faciliē reuiuiscit æger: arcenda, tunc, à conclauī ingredientium turba est, & aqua frigidiori lauandus æger. Dolorem sedamus varijs ingenijs: auersione facta sanguinis missione, aut purgatione: anodynīs item remedijs, foribus, caraplasmatīs ex mica panis lacte imbuti; vitello oui & croco, interdum momentum opij ob vehementiā doloris admiscere cogimur. Delirio succurrimus sanguinis missione, si vires valētes sint, purgatione, somniferis admotis, & crurum lotionibus atque similibus. Paralysis etiam quæ superuenire nō raro

ro affolet, peculiaria expostulat præsidia, vt suo loco latius monstrabo.

Vulnerum in genere naturã, differentias, causas & signa atque curationem, pro instituto hucusque scripsimus: superest quarundam specierum ex his quas memorauimus, & partium etiam principalium seorsum gratia exempli meminisse: cæteris quæ specialiora & singularia sunt, prætermittis, vt studio quotidiano, diligentia atque vsu practico Chirurgus ea expendat. Sic profectio inter vulnera, quædam sunt simplicia, & quædam composita, quarum rationem & curandi indicationes seorsum scribere instituo quã breuissimè, prætermisso simplici vulnere: nam quæ generatim diximus, ei solum proficua existunt.

DE VULNERE CONTUSO INSTITVTIO III.



constet esse plurima vulnerum, quæ per primam illã & communissimam intentionem seu curationem sanari non possunt, neque eorum labra vniri, quod caro deficiat, contusa sit, tumore affecta, intemperie extraneata, fluxu sanguinis sordida & præuè affecta, aut alijs accidentibus oppressa: ob id secundam intentionem, hoc est remotionem prohibentis morbi adiuncti aut symptomatis, non causæ, vt in omnibus simplicissimis vulneribus dictum est, moliri prius oportet, quàm vel labra vniantur, & cicatrix induci possit. Sic initio sumpto

Institutionum Chirurgicalium

Li. 4. me-
tho:

sumpto a contuso vulnere, sciendum est, huiusmo-
di vel aëre alterari, vel durum esse & callosum, aut
dolore vel phlegmone, aut alio quouis tumore
coaffectedum. Itaq; in huius vulneris curatione qua-
druplex erit indicatio seu intentio exequenda. Vna,
accidentia mitigare: altera, adiunctum morbum
auferre: tertia, contusam carnem suppuratione
conterere: & quarta, loco eius, quia vicus rema-
nebit cauum, carne implere, præter cicatricem.
Nam certum est, inquit Gal. siue confusa fuerint
circumposita vulnere loca, siue phlegmon, aliuf-
ve tumor in his constiterit, propriam eius sanatio-
nem vulneris solius non esse, sed prior illius affe-
ctus qui cum vulnere est. Præmittamus, carnosam
particulam telo tum scissam, tum contusam esse:
præmissa debita vitæ institutione, quid deinceps
agere oporteat indicant, primo, prædictæ affectio-
nes, seu symptomata, quæ vulnere accedunt: sic do-
lor primo mitigandus est oleo anethino, camemeli-
no & liliorum, aut si calor coeperit elucescere, oleo
rosaceo & vitello oui, linamento excepto & parti
admo. Quod si tumor præsit ex confluxu ad par-
tem, fluxionem aliò auertes, & fluxurum humorē
vene sectione imminues, quantum affectus magni-
tudo, doloris immanitas, & magnitudo inflammati-
onis præsentis aut imminentis postulauerit, ac vires
ferre possint: quod etiam facies victu tenui & re-
frigeranti. Reuelles autem fluentem humorem san-
guinis missione ex opposita parte, si plurimum tu-
mor aut dolor non vrgeant, cucurbitis, frictioni-
bus & ligaturis oppositarum partium. Viētis insu-
per repellentibus, vt oleo myrrino, rosaceo, vngue-
to ex bolo Armeno, oleo & aceto, quo partes circu-
iacentes illuminantur: emplastro etiā ex pulueribus
myrr-

myrtillorum & oui candido cū rofaceo. Reliquos autē vitiosos succos iuxta eorū naturā purgabis, vt antea scripseram. Præterea carnem cōrūsam, & humores, qui iam in partem vulneratam decubuerunt, in pus vertere curabis quā citissime, tum simplicibus, vt malua cōcta, radice althææ, pane triticeo, aut farina triticea, cū oleo & aqua, vel fomēto vtēris ex aqua calida. Sic ex compositis eo vtēris, quod recipit radice althææ, radice cucumeris agrestis ana. ʒ. j. florū camemali, & seminis lini ana p. j. origani & hyssopi ana m. f. ficuum pinguiū, nu. vj. coquātur, & eis pressis & cōtusis adde galbani, mirrhæ, styracis liquidæ, œsypi ana ʒ. j. f. fiat emplastrū. Aliud cōficiēs, vbi calor præualuerit, quod recipit maluarū & vioiarū ana. m. j. radice althææ, li. f. coquātur iure carnis absq; sale, & adde farinā hordei & tritici ana. quod satis vt fiat emplastrum. Prodest & tetrapharmacum, ac digestium vulgò appellatum, ex oui vitello, & terebinthina.

Qua prouidentia facta, vulnus deinceps diligenter inspiciēs, sit ne sordidum, cauum, plenum, aut dilaceratum. Quod si sordidum sit, detetgendum erit melle rofaceo, mundificatiuo ex apio, vnguento apostolorum, aut facto ex farina hordei, cicera, fabarum, orobi, ouorum vitellis & melle. Verū si sordities interanea sit, & caro quoq; vitiosa, vnguento rubeo, aut Aegyptiaco vtendum erit, quo facilius exsicceetur vlcus, donec ad puritatem perueniat.

Tunc verò considerandum est, an cauum vlcus super sit, quo tempore carne implere curandum summa diligentia erit. Cui vsui inspiciere oportet, quod possit carnis generationē remorari: nā cū in
carnis

Institutionum Chirurgicarum

carnis generatione excrementū duplex prouenire
soleat: alterū quidē crassius, vt sordes: alterū verō
tenue vt sanies, ac cū ex tenui hoc excremento vul
nus humidū reddatur & ex crasso sordidū, duplici
medicamentorū sorte egebit, nimirū modicē sic
cantibus & detergentibus. Verū hęc non sunt
quę verē sarcotica existunt, sed quę remouent im
pedimenta carnis generandę: nam verē sarcotica
(vt reperies secunda parte, ca. de generantibus. car
nem) alterius sunt naturę, nimirum quę carnem si
mitem pręexistenti reddere nata sunt. Cęterum
quę vtrumque pręstant simplicia, sunt thus, thu
ris lacryma, cortex thuris, mastix, aloës, vinum ru
brum austerum, pix, resina, farina hordei & fœnu
gręci, aristolochia, iris, farina orobi, lupinorum, pæ
nax, centaurium, polium, glaucū, cadmia, pōpholix
& alia id genus. Composita etiam non pauca repe
ries, vt puluis qui recipit oliuani, aloës, sarcocol
lę, sanguinis draconis, radis ireos, ana. p. j. pro
dest vbi fluit ad vulnus plus humidū, quā par sit.
Aliud recipit thuris, mastichis, myrrhę, boli Arme
ni, sanguinis draconis, farinę hordei, ana. p. j. fiat
puluis quo cum melle rosaceo vtēris. Conficies au
tem vnguentum huic vsui proficuum, quod recipit
resinę. ℥. ij. terebinthinę. ℥. iij. mellis. ℥. j. s. thuris,
mastichis, myrrhę, ana. ℥. ij. olei lib. s. cerę. ℥. v. fiat
vnguentum. Aliud etiam conficies maioris momē
ti, quod recipit agrimonię, absynthij, centaureę,
chelidonię, scabiosę, semperuiuij, cynoglossę, cau
lium rubrorum, plantaginis, ana. m. j. ex quibus
succus extrahatur, & adde aceti. ℥. iij. olei rosari
℥. ix. cerę albę. ℥. iij. axungię berbecis lib. s. resi
nę. ℥. x. coquantur lento igne, & adde ammoniaci,
galbani in aceto dissoluti, ana. ℥. s. terebinthinę.
lib. s.

℞. f. mellis. ℥. iij. thuris, mastichis, ana. ℥. j. fiat unguentum.

His factis, hæc medicamenta & alia, quibus vfusus es ad carnis generationem, hac lege mutabis: quo enim vlcus fuerit humidius, eo ficcioribus vtêris, & è contra minus ficcis: verum feruare oportet corporis & partis naturam contraria prorsus lege: nam quo humidius fuerit corpus, aut membrum vulneratum, eo minus ficcis vtendum erit, & quo ficcus, ficcioribus, siquidem similibus fieri debet præexistentis carnis conseruatio. Nam productam carnem ei quæ præfuit, similem esse oportet, vbi igitur pristina ficcior fuerit, nouellam quoque ficiorem fieri cōuenit. Sic protectò facile erit carne vlcus implere, & ad antiquam figuram reducere.

Vlcus autem ad planitiem seu cauitatis plenitudinem, & æquabilitatem reductum, cicatrice obducendum erit: quod facies medicamentis quæ nō modò superfluam, sed naturalem quoque humiditatem absumant: sunt autem talia quæ adstringendi modicè facultatem habent, & plurimum siccant, epulotica à Medicis nuncupata. Quorum simplicia sunt galla, balauftium, ostrea vsta, cortex malorum granatorum, malicoriam, ipina Aegyptia, bolus Armenus, terra sigillata, cerusa, plumbum vstum & lotum, lithargyrium, cortex pini, & vstū & lotum, squama æris, alumen vstum & lotum. Sed ex compositis sunt plurima huic ministerio apta, vt forus qui fit ex balauftijs malicorioque vino incoctis: item sunt putueres qui recipiūt corticis pini. ℥. j. nucum cupressi, centaureæ minoris, aristolochiæ vstæ, ana. 3. ij. cerusæ, lithargyrij, ana. 3. f. fiat puluis, quo vulnus respargatur. Eundem vsum præstat unguentum. q. r. cerusæ. 3. iij. lithargyrij

Institutionum Chirurgicarum

gyrij. 3. ij. albumina ouorum nu. iij. adde minij. 3. 3. caphuræ. 3. ij. olei rosati. li. j. f. aque rosarum. 3. ij. albumina ouorum. nu. iij. ceræ albæ. q. s. fiat vnguentum. Aliud recipit lithargyrij. 3. f. cerusæ. 3. j. olei rosarum. q. s. fiat vnguentum cum cera. Emplastrū etiam cōficiēs. q. r. cerusæ, lithargyrij, ana. 3. j. terebinthinæ. 3. x. thuris, mastichis, aluminis, coctlearū limacū vitarū, ana. 3. f. caphuræ. 3. j. coquantur lithargyriū & cerusa, oleū & cera lēto igne, & adde terebinthinā, & postquam semoueris, adijce pulueres. Quibus etiā supercrescētem carnē demes, si addideris vnguenti Aegyptiaci, aut Apostolorum medicum, vel chalcanti, atramenti furoris, calcis viuæ, sublimati hydrargyri aliquid. Quē quoq; vsum prestat aqua quæ recipit aquę vitæ. 3. ij. æruginis rasilis. 3. ij. misce, vel alia. q. r. hydrargyri sublimati. 3. ij. aluminis crudi. 3. v. aquæ rosarū & plantaginis. 3. v. coquantur ad consumptionem quartæ partis. Quod si non profuerit, nouacula licebit additā carnem abscindere, aut cādenti ferro inurere.

Verūm si cicatrices nō probē fiant, curandum est, eas quantū possibile fuerit poliras efficere, aut si prauē procedāt, corrigere: sic recentes in crassā de sūt diachylone, lithargyrio nutrito oleo in quo vtriusq; brioniæ radix in octa fuerit, calamintia in oleo cocta, argēti spuma cū rosaceo lota. Quōd si crassa ac dura fuerit cicatrix, attenuāda est oleo balsamaræ, radice cucumeris agrestis trita & imposita, pinguedine pueri nascētis cum argenti spuma, oleo liliorum, de myrrha & gummi cuiusuis cōditionis in aqua rosarum dissoluta. Aqua etiā quæ hoc modo stillatur vtilissīma est. Excipe myrrhæ, aloës, styracis, ana. 3. j. mumiæ, baccarum lauri, ana. 3. i. mediocriter teruo, & in alembico vitreo lento igne

Igne distillato. Præstat & huiusmodi linimentum quod recipit olei de tarraro. ℞. iij. mucilaginis feminis psyllij. ℞. i. cerusæ in oleo rosaceo dissolutæ ℞. j. salis gemæ. ℞. ij. fiat linimentum. Huius nature est emplastrum. q. r. axungie felle. ℞. iij. lithargyrii ℞. j. æruginis rasilis, vitrioli combusti ana. ℞. ij. fiat emplastrum.

Quod si vulneris caro contusa plurimum sit laniata, si labra vulneris fuerint dura & callosa, si caro contusa in gangrenam degeneret, scalpello (si nihil obstiterit) corium amonendo renouare oportebit, deinde cõsuere. Verum si aut ex frigore, vel ex contusa carne, defectu caloris, in pus verti nequit, tunc quidem vnguento Aegyptiaco, donec caro illa excidat, & vlcus humiditate superabundanti orbarum appareat, procedendum est, & postea exsiccantibus & abstergentibus, & his quæ nuper diximus, proficua esse in cauo vlcere, rem agere oportet.

DE VVLNERIBVS NER- uorum & neruorum partium

INSTITVTIO IIII.



Nerborum ac neruorum fere omnium partium officium, dignitas, & substantia adeo munere præstabilissimo funguntur, vt sensus & motus vehiculum sint, & alijs ministerijs assistant. Verum à cerebro oriuntur, à quo parum dissident, nisi quatenus

Institutionum Chirurgicarum

compactiori materia sunt constituti, ob vsus quos exequuntur, tum sentiendi, tum musculis circumfusi in tendones desinentes vbique motus arbitrios efficiendi: quorum substantia mollis est, humida, forma oblonga, tereti, & alba tenui membrana obducta, & inter seminaria & similiaria membra numerati. Eiusdem ferè naturæ sunt tendones, siue enervationes, in secundo neruofarum partium ordine habiti, qui à musculorum extremitate originem ducunt: nâque cùm neruus à cerebro aut spinali medulla ad lacerti initium terminatur, in eo inseritur, & in multas ac minimas & capillares partes, aut membranaceas fibras diuellitur, quæ totum musculi corpus intertexunt: denuo in fine coalescunt, & corpus quoddam album, densum & satis latum generatur, chorda cōmuni nomine appellatum: cuius munus est, parti sibi annexæ motum absolvere: sentit autem & mouetur ea ratione, qua nerui est particeps, & ob id mixtam habet naturā inter neruum & ligamētum: tantoq; neruo est durior, quanto ligamento mollior. In tertio autem neruofarum partium ordine sunt vincula, seu neruea ligamenta, quæ ab osse oriuntur, & in osse aut musculo terminantur, omnino sensus expertia. Sunt postremo inter partes nerueas, panniculi neruei seu membranæ ossa contegentes, ex quarum substantia plures partes in corpore procreantur, vt intestina, vesica, vterus, vtraque membrana cerebrum inuoluēs, & aliæ id genus, quarum vulnera magni sunt momenti, & ob id maiori diligentia opus est in eorum curatione.

6. Meth. Neruea igitur substantia vt Gale, visum est, vulnerari potest vno è tribus modis: per sectionem nimis, puncturam & contusionem. Præterea si
accidat

accidat neruum celsim vulnerari, id vulnus, vel tranfuerfum, vel iuxta longirudinem infixu erit, atque ex horum vtrifq; quoddam fir, sine substantiæ carnofæ amiffione, quoddam cum carnis & cutis deperditione: in vtroque etiam, vel ex toto neruus præcifus est, vel ex parte difsectus: quod pariter puncturis aduenire solet, quæ aut manifestæ sunt, aut cæcæ & occultæ, quarum ora sic coniunguntur, ac inter se coeunt, vt sensum effugiant: quæ rursus vel secundum partem nerui fiunt, vel iuxta medietatem, aut secundum totum perforatum relinquunt. Dum verò contusio neruo accidit, ea quidem erit, vel sola vel simplex, absque carnis diuisione & nerui attritione, aut cum manifesta continui solutione: adeò vt quandoq; neruus nudus appareat, interdum punctus aut sectus. Insuper cum aliquo ex vrgentium symptomatum genere complicantur, nempe ingenti dolore, inflammatione, aut conuulsione premuntur: aliæ mites sunt: aliæ simplices, & nonnullæ compositiæ. Atque hæ sunt diuisiones à morbi essentia desumptæ.

Signa quibus nervosarum partium vulnera cognoscuntur, ea haberi debent, quæ ob earum vehementem sensum protinus succrescant, velut sunt dolores ingentes, inflammationes, resolutiones, conuulsiones, febres, deliria, & frequenter mors. Cum hoc tamen quantumvis nervosæ partes sensu tactus polleant, non est arbitrandum fauciati nerui inseparabile signum esse dolorem, vt multi sunt arbitrari: quod Auicenn. finiter statuit dicens: Sæpe neruorum vulnera perducunt ad spasmum absque antecessione læsionis prauæ, & non fit in eis excusatio, quia in illis fit apostema magnū, absque dolore magno, & faciliores eorum dispositiones

Signa.

4.4. trac.
4. cap. 51

Institutionum Chirurgicalium

Sunt febres, & apostemata multa apparēt in alijs locis quā in vulneribus, & sitis & vigiliæ & deficitio lingæ. Ex quibus constare videtur, conuulsionem fieri posse aut inflammationem, nullo præcedente vehementi dolore, id quæ vel quia sensus obrunditur & vitatur instrumentum, vel ob partis conditionem, vt de musculo, capite vulnerato refert Gal. in quo protinus succrescit conuulsio: in femore item & partibus genu anterioribus, in cuius vulneribus repērina cōuulsione & morte, absque dolore corripitūtur laborātes, ob idq; stauendū est, vt inquit Gal. cōuulsiones & mētis cōmotiones sequi inflāmationes neruofarū partiū, tanquā proprias vulnerū neruorū notas: quibus accedit febris cōtinuus associata rigoribus, nullā seruans periodū: paralysis etiā dum neruus ex toto præcisus est, aut arguit copiosā humiditatē ad neruū confluxisse, sed id mōstratur, quia præcedūt tumores.

Ex sensus acumine, quo neruosa partes poliēt, & ex colligātia cū cerebro pōit grauissima & periculo plena esse nariū vulnera: siquidē ad leuē adhuc neruorū lēSIONē acutissimī dolores sequūtur, quos celeritū inflāmatio subsequitur, & lege cōiortij ad sua principia retrahūtur, & cōuulsi sūt, sitq; tūc passio acuta & lethalis, quia in ea protinus corrahitur seprū trāuersum, & deficient respiratio cor oblaquitur. Sed futurā cōuulsionē mōstrant tumores subito euanescentes, aut insaniā, vel dolorē lateris acutū. Vulnera quæ trāuersē sunt, deteriora sunt his quæ lōgitudinaliter, sicut ea quæ neruū peritus nō scindunt. Sic contusiones, verēdæ sunt ob humorē crassū & viscidū qui ibidē colligitur, quo facillimē nerui vel replentur, vel putrescunt. Quæ omnia maximē succrescunt, cū iuxta articulos vulnerus

Li. 3. Inc.
th. c. 1.
aph. 63
Lib. 1. de
loc. aff. c.
3.
5. aph. 1.
2.
Præf. 4.
gum.

mus fuerit illatum, ob ingentes dolores qui ibidem concitantur ob quantitatem tendonum ibidem infertorum. Et sic iuxta dignitatem partis nervosæ læsæ, aut officium, de periculo iudicare licebit, & prout exactiori sensu prævaluerit, vel maiori fruatur cum cerebro colligantia & communione.

Prædictarum partium vulnera, ut gravia & periculosa sunt, ita in curatione & Medico & laboranti magnum faceffunt negotium. Ob id duo hæc in animo habere oportet, nimirum, ne quis dolor vulneratam partem occupet, & ut partem affectam ab inflammatione tueamur: quibus servatis, omnis cōvulsio, quæ ab his causis suboriri solet, prohibetur. Quamobrem, vulneris consolidationem accelerare non expedit, sed apertum custodire, ut per id nervi vulnerati sanies expiret, quo interdiciamus & febris & cōvulsioni aduentum. Quæ sanè omnia ut exactè possis exequi, vitā institues in oībus rebus non naturalibus exquisitissimā, eū victum ministrando qui tenuissimus sit à principio, usque dum symptomata mitescant: frigidus etiā & modicè siccus, potus, aqua decocta cinnamomo aut radice cichorii & deurata. Aer sit tepidus, non calidus inflammationem accersit, sicut frigidus nervis maximè aduersatur. Cubiculus sit etiā ab omni frigido præmunitus: lectulus mollis: quies utilissima, & frictio levis, præcipue partium oppositarum: alius laxa usus clysterium. Quibus sic institutis, considerabis an corpus plenum sit & scateat pravis succis. In qua re siue plenum sit, siue secus, semper à sanguinis detractione auspiciari curationem oportet, idque à principio ex distantiore parte, quo certius futura accidētia & inflammationem inhibeamus: quod si iam adsint, & propinquiore loco, ut quod in parte affecta aut prope ipsam est,

Curatio

Institutionum Chirurgicarum

evacuemus, ea quantitate, quam vires permiserint, & mali præsentis aut imminens sequitia postulaerit. Quo facto, cascia aut mâna, vel quovis alio phar-
maco, leui tamé & leniête, corpus purgabis, & dein-
ceps ventrem mollem esse diligenter curabis.

Quatenus verò ad vulnus attinet, præter indica-
tiones quas superius adduximus, omnibus vulneri-
bus cômunes, huic vulnere fortî & parti affectæ,
quædâ sunt peculiares: nimirû vulneris forma, quæ
licet alijs sic cômunis huic peculiari dote magis ex-
vsa est. Nam aliter transversalis sectio nervorum
quâ longitudinalis tractari debet, & aliter pûctura
latens & obcæcata, quâm aperta & patês curatur:
aliter nervus contusus & suo modo detectus, & cû
carnis deperditione. Quamobrem iuxta cuiusque
ideam curationem instituere oportebit.

**Dener-
uo con-
tuso.**

Lib. 6. me-
tho. c. 3.

Nervorû cotusio inter molestas & cacoëticas af-
fectiones annumeratur à Medicis sapiëntissimis, ra-
rò tamé accidit, vt Gal. statuit. Est enim interdum
scissuris aut pûcturis nervorum deterior, & curatu
difficilior: nâ in nervis, qui nō nisi acerbissimo cru-
ciatu & lōgissimo tēpore in sanie verriuntur, nō acci-
dit quod in reliquis cotusionibus, quæ citò & secu-
rè sanescûnt, quia nervi putrefacti nec amplius au-
gentur, neq; coalescûnt. Sic profectò Gal. in contu-
sis aut ab alto delatis primam operationē instituit,
sanguinis detractionē, nulla prohibête causa: victu
requisitissimo instituto, cauêtes tamé in hac curatio-
ne medicamenta aut humida, aut pus movêtia, quia
nervi sicut caro suppurationē non admittûnt, quod
seniei generatione vehementissimis doloribus cru-
cientur. Quapropter mox à principio partē fouere
oportet oleo rosaceo & masticino, aut vnguento
alabastrino, aut camemelino, sambucino & irino, &
similibus,

Li. 4. me-
tho. c. 6.

similibus, quæ calfaciendi & citra dolorē siccādi vires habeāt. Verū si cutis dissecta exulcerataq; fuerit, ea medicamēta opportuna sunt, quæ exsiccant etiā, & simul fluxiones prohibēt, ac dolores sedēt, & disgregatas partes vniāt: quare in vulnere imposita terebinthina & hipericonis oleo cooperiatur emplastro ex fabacea & lētica farina, oximellitē & sapa cū puluere lūbricorū terrestrium & mastiche: aut emplastro ex betonica, masticchino oleo soluto: tota enim pars contusa, quæ in via ad putredinē est, valde exsiccati debet, quo sana etiā cōseruatur. Quod si aliqua vulneris cruditas apparuerit, & dolor nō quiesuerit, præparetur medicamentū ex terebinthina, pice liquida, manna thuris, vitello oui & croco, & vniuersa pars cōtusa in circuitu foueatur oleo lūbricorū, masticchino, rosato cōpleto. & caememali. interim tamen frictriones & diuersiones fiant, & iterum si fuerit in augmento dolor, sanguis mittatur. Verū si inflāmatio succrescat, medicamentum appone ex sapa, oleo rosaceo, farina hordei & modico aceto, in quo infusa sit lana cassyi, & eis vrēris donec malum decrescat.

Nisi erratū aliquod cōmittatur, proculdubio sectio nerui longitudinaliter inflicta cæteris securior existit. Sic præmissa totius corporis per victū tenuē & sanguinis missione prouidentia, vulnus ab extraneis mudare oportebit, & partes vulneris adinuicē, si cutis satis pateat, sutura & fascijs vnire & vnitatē cōseruare, vt in sequēti paragrapho reperies, & in ima parte emissarū aliquod relinquere, quo sanies collecta effluere possit, postea affectū locum ab aliena fluxione custodire, seruata a partis vulneratæ rēperie, ne dolor subsequatur aut inflāmatio, cauētes semper, ne in vulnus sanies aut humiditas.

De neruo longitudinaliter seciso.

Institutionum Chirurgicarum.

Li. 6. me-
th. c. 2.

miditas aliqua colligatur, facile enim putrescit ner-
vea substantia, vnde prava sequuntur accidētia. Quo-
fit, vt torūda illita terebinthina & oui luteo in ue-
liviore loco immissa, necessū sit sanie per eā partē
primis diebus expurgare, vulneris circūterētia inū-
cta oleo rosaceo, myrtino & mastichino, donec nul-
lū amplius inflammationis aut cōuulsionis periculū
immineat. Verū si cutis & caro quæ superiacebat,
deperdita fuerit, adeo vt nervus nudatus appareat,
nullū præstātius adinuenit Gal. medicamētū, quā
terebinthinā, & reliqua pharmaca, quæ temperatæ
sint caliditatis, maioris tamē siccitatis, quorū sub-
stātia tenuis sit & fluxilis, stipticitatis & omnis mor-
dicitatis expers. Porro siccas nervosas partes à
putredine præservat, eas corroborat, & omnē dolo-
rē tollit, & ob id terebinthina, præsertim lota, om-
niū cōsensu, nullū est præstātius medicamētū. In-
super expendendū est, nudatos nervos nō posse fer-
re vim & efficaciam medicamētōrū, quæ ex euphor-
bio & similiter acribus emplastris sūt: optimē igitur
eo casu calce elota, multo oleo rosaceo aut ma-
stichino soluta, aut quod ex pōpholyge medicamē-
tum sit, salutare & tutum admodum est. Deniq; om-
nia medicamenta actu calida sint, non tamē impen-
se, & guttatim instillanda, & linamenta mollia im-
ponenda, & pars fouenda vt dictum est.

De ner-
uorum
scissio-
ne trans-
uersa.

Quod si transversim nervus scindatur, cōsiderare
tūc oportet, an ex toto, an ex dimidia parte saucia-
tus sit: nā si totus præcisus fuerit, merus nullus in-
stat, licet debilis supersit particula, præsertim si ner-
vus insignis fuerit magnitudinis: cuius curam ratio
cōmunis est cū ea, quā mox explicuimus. Verū si
tantū ex dimidio scissus sit, cōuulsionis aut phleg-
monis natus impēdet periculū, cōmunicata inflam-
matione à disiectis fibris ad non disiectas & cōmū-

hione ab ipsis nō sectis excitata. Quo casu lōgē tenuiori victu instruito longius licebit sanguinē extrahere, & vt cōsult Gal. oleo calēri vbertim & fēpius in die inungere oportebit: si in manu aut brachio fuerit vulnus, axilas, collū & spinā: si in crure aut pede, inguina, pedē & spinā. Mox verò cōsiderare oportet morbi naturā, hoc est neruū transuersim præcisum, qui sui vnionē indicat, prius tamen cutis, si nō satis pateat, ampliori diuisione aperienda dilata daq; est: postea futura vnā cū carne, si fieri possit, discussū neruū vnire oportet, neruis prius coniunctis, & veluti adhærentibus, quo tempore carnem profundius suere oportet, neruis in tactis, hos enim suere nō licet, nā fat est ad vnionē, coallitus quem efficit & conseruat carnis profunda sutura, hoc enim tutius est: nā punctura ex sutura facta, aut ignis contactu, summopere læduntur neruosa partes. Postea adhibebis torundam per infimum emissariū vt antea dictum est, terebinthina & vitello oui imbutā: aut ipsam terebinthinā calidā inijcies guttatim, & desuper appones aliquod exemplastris quæ mox referam, si prius dixerō, quod si ichor aliquis, aut subtilis humiditas à vulnere emanauerit, ad ficciora transire licet: nam ea quæ viriliter exsiccant, licet ea nerui excarnes non fexant, in transuersalibus vulneribus admittuntur: quæ ratione in duris corporibus nequaquā verendum est eis vti. q. r. terebinthine. 3. ij. olei hypericonis. 3. j. sulphuris vini nō petrosi, sed leuiss, subtiliter pulverizati. 3. ij. misce & aliquārisper bulliāt. Præstat & aliud q. r. olei terebinthine, mastichini & lūbricorū an 3. ij. euphorbij recētis & subtiliter pulverizati. 3. iij. croci. .j. misce. Ex vsu quoq; est aliud. q. r. lūbricorū præparatorū, 3. iij. caudæ equinæ, 3. ij. pul-

li. 6. me-
tho. c. 3.

Institutionum Chirurgicalium

pulueris betonicæ & vrticæ, ana. ʒ. j. olibani. ʒ. iij.
carnium limacum quod satis ad vniendum reliqua.
Quod si hæc non suffecerint, ad exsiccationem vl
ceris, curabis dolorem omnibus modis mitigare,
quo minus trahatur ad vulnus, superposito empla
stro cui insit virtus corroborandi, exsiccandi ac pu
tredinem inhibendi sine multa adstrictione: quod
poteris cōficere ex dictāno, mattricaria, polio, cha
ma piteos, consolida, iba, betonica, lumbricis terre
stribus & farina lupinorū, fabacea & oleis supra di
ctis. Quod si suspicio inflammationis suboriarur,
hoc emplastro vtēris, quod recipit florum rosarum
& myrti ana. m. j. betonicæ, camemali, ana. p. f. co
quantur in vino rubro & pistentur, & adde farinæ
hordei ʒ. iij. farinæ fabarum ʒ. j. olei rosati & masti
chini ana. ʒ. j. f. lixiu quod satis, vt fiat emplastrū.
Verūm si transierit septima dies citra inflammatio
nem aut aliud accidens, mundificatio ex melle vtē
ris, quod recipit lithargyrii vino albo loti. ʒ. ij. olei
mastichis cere & mellis ana. ʒ. j. misce. Quod si his
omnibus factis vniri vlcus adhuc non possit, pul
uere vtēris ad vniōem vtilissimo, quod recipit pul
ueris lumbricorum terrestrium præparatorum, gra
næ tinctorum, equisei i, olibani, aristolochiæ ana
partes equales, misce & fiat puluis tenuissimus, quo
sinus impleatur. Hunc etiam vsum præstat vnguen
tum quod recipit centaurij minoris, plantaginis, cy
noglossæ, pilosellæ, consolida vtriusque ana. m. j.
Verumū terrestriū li. f. cū modico vino & aceto terā
tur & maceretur seprē horis, deinde adde sepiarie
tis li. f. picis, resinæ ana ʒ. iij. coquantur ad aceti & vi
ni cōsumptionē, & colature adde ammoniaci, galba
ni, popanacis, in aceto dissolutorū an. ʒ. v. terebin
thine ʒ. j. f. thuris, mastichis, sarcocollæ, ana ʒ. iij.

teroci 3. ij. cere q. s. fiat vnguētū, quo vtrius maximē in robustis corporib9, donec partes ac accidētibus immunes vntas esse coperias, & curationē finies emplast. barbaro, aut diapalma, vel emplast. Græco.

Gal. de neruorum tendonumve puncturis sic refert, eadem verba Paulo & Aetio attestantibus. Nerui & chordę pūctura, propter sensus vehementiam, & quoniam hæc pars principio continuatur, prompta est ad neruorum conuulsionem excitandam, ac tunc præsertim, cum nihil exirorsum expirar, obcæcato cutis vulnere. Quibus constare videtur, puncturarum quasdam esse hiantes, apertas, & manifestas, & rursus aliās & longe grauiores occultas, & in quibus ora & extrema caro & cutis sic inter se coniunguntur & coeū, vt sensum effugiant. In quibus profectō ingentes dolores, conuulsionēs, febres, inflammationes ac deliria ocysimē & lethali-ter succrescunt, nisi magna diligentia praueniatur. In cuius vulneris curatione plurimum confert oras angustorum vulnerum punctorum esse apertas, vt calidum medicamentum extrinsecus applicatum, per eas vapores educat, attrahens humiditatem circa affectum locum in alto latentem.

Qua de re in huiusmodi puncturis orificium in cute duabus sectionibus rectis diuidere oportet: sectio autem ad modum crucis debet fieri, nam hæc est quæ rectos angulos constituit: item sanguinē exire permittes: tandem curabis ne labra coalescāt, sed sic aperta custodies, quo coacerbatæ humiditates minus ibidem morentur, sed virus perpetuò effluat. Cauebis ramen, ne scissio admodū parula sit, ne detegatur plurimum neruus. Quibus factis, diligenter curabis dolorem mitigare, inflammationē & accidentia inhibere: quod facies si aerē tepidum parauc-

De ner-
uis pun-
ctis.

Lib. artis
me. c. 22.
Li. 6. me-
th. c. 3. 4
3. de cōst.
pha. ge. 1

Institutionum Chirurgicarum

paraueris, cubiculum lene, habitationem iniurijs teporum præparatam, & vltimò victu tenuissimo instituto, donec tempus accidentium præterierit, saltem septima dies. Præterea mox à principio sanguinem mittes iuxta virium robur & accidentium fænitiam, aut corporis plenitudinem. Item ventrem curabis mollem esse, tum clysmatis, tum leui pharmaco, vt antea dixeram, & paulò distantiùs à parte affecta defensionis appellatis vtièris, quale est quod ex bolo conficitur vulgariter.

His autem præmissis, puncti nerui curatio medicamenta ex postulat, quæ & tepidum calorem excitent, & validè siccent, tum quæ ex substantiæ suæ natura attrahendi vim habeant, & tenuium sint partium, siquidem nudato neruo, omne curantis consilium eò dirigi debet, vt minima cum rosione siccer. Huius naturæ medicamenta sunt oleum sabinum, sambucinum, irinum, sicionium, de terebinthina, aut iasminorû, aut oleû in quo ferbuerit terebinthina, quæ citra dolorem ac morsum (quod maxime cauendum est, vt Gal. consuluerat) ad intima permeare possit: quæ etiam actu calida adhibenda sunt, & eis amiscebis euphorbij modicum, vel sulphuris viui, quantum cum oleo tenui ad sordium spissitudinem redigi possit. Laudat etiam Gal. terebinthina cum sulphure aut euphorbio vsum, ranquam vnicum præsidium, aut ipsam solam, quæ tenuis sit, clara, lota vino aut aqua betonicæ. Ex quibus varia apud antiquos & iuniores inuenies parata medicamenta, ex quibus guttatim instillabis in vulnus parum: & desuper appones vnguentû quod recipit resinæ pini claræ & odoratæ ʒ. xij. olei laurini, terebinthina ana ʒ. ij. gummi elemi electissi-

Li. 3. ar-
ris me.
Li. 6. Me-
tho.
Libr. 5.
Aphor.

mi 3. iij. ponatur primò refina & gummi in vase
æneo nido super ignem lentum, cum perpetua agi-
tatione, donec liquefcant: deinde addatur laurinum
& terebinthina, & iterum bulliant & pariter agi-
tur, & cum crassitiè acquisierint, per stamineâ per-
coletur, & quod stillauerit ac percolatum est, vsui
seruetur in vase vitreato, & vsus tẽpore extẽdatur
super tenue corium, ac supra vulnus & eius circun-
ferentiam apponatur, est enim mirabilis efficacit̃.
Cuius loco vti possumus emplastro de gũmi elem,
vel de centaurea Guidonis, aut ex farina fabarũ, hor-
dei, orobi pari portioneq; decocta in lxiuio & oxi-
melite. In circuitu autẽ vlceris, quo partes & min-
doleant & minus inflāmentur, fovere oportet oleo
rosaceo, mastichino, aut camemelino, vel lumbrico-
rum. Quòd si res ex voto successerit, persista in his,
donec integram consequaris sanitatem.

Verũm cũ in huiusmodi curatione sympto-
mata maioris sint momenti, ob id ea præcauere vt
dictum est oportebit, ac si adsunt, mitigare sedula
diligentia, initio sumpto à dolore: quem mitigare
poteris, & simul saniem extrahere, primò mitiori-
bus, vt oleo ex vitellis ouorum, rosarum, lumbrico-
rum, aut oleo vetusto, aut iasminorum vel sabino,
idq; facito ter quaterve in die, dum calorem nan-
ciscuntur temperato maiorem, & vlcus eo tempore
leniter absterges gossypio sapa madido & expresso,
atq; calente. Confert & id quod recipit euphor-
bij. 3. j. olei rosacei & lūbricorũ ana 3. j. coquatur, &
coletur oleũ. Prẽterea ex vsu est emplastrũ q. r. mus-
ci quercini m. ij. furfuris. p. j. olibani 3. j. coquatur
in vino, donec in formã pulvis redigatur. Alterũ re-
cipit micæ panis in lactebubulo imbutæ, olei rosati
& camemali, & vitella triũ ouorũ, & ex reliquis q. s.
fiat

Institutionum Chirurgicarum

fiat emplastrum, quo vtere, quantum par sit, vt doloris vrgentia mitigetur: nam in neruorum vulneribus nulla ratione adhibenda sunt, quæ humida aut suppuratoria existunt, & ob id ad alia protinus est transeundum. Præstat & aliud ex floribus came mali, fertulæ campanæ, maluarum, farinæ hordei cum iure capitis verbecis, & cribratis, addito rosæcco cum sapa & virellis ouorum fiat emplastrum, cui adde pulueris vermiū terrestrium. 3. iiii. vnguenti rosati. 3. j. f. Securius autem conficies ex farina fabarum & lentium cum sapa, linixio & oleo rosaceo & camemelino, ac terebinthina & croco. Quod si dolor adeo sit vehemens, ad maiora cogit vrgentia ratio peruenire, quale est quod recipit micæ panis in lacte bubulo maceratæ quod satis, papaueris albi modicum, opi. g. iiii. contundantur optimè & calida loco dolenti adhibeantur, tandem omni diligentia oleis & emplastris partem fovebis.

Verum si conuulsio fiat, coniectabile est in vulneribus neruorū, plerūque ex repletionem succi mordentis succrescere, lacertis, tendonibus aut neruis aliena humiditate repletis, qua nonnunquam inflammationem patiuntur & conuulsi sunt: licet aliquando ex acrimateria irritat motus potius conuulsiuos, cerebro quoque compatiēte fieri conperiamus. Quibus cognitis causis, eodem victu tenui vtēris: sed qui sit facilis & boni succi, quo vires non periclitentur: ac si sufficienter sanguis missus non fuerit, parcè tamen iterum mittes, non quidem quantum exigit affectio, vt Galen. consuluerat, quia opus est viribus robustis. Purgabis igitur corpus, & frequentibus clysmatis aluum turbabis: tandem caput, collum, totamq; spinam dorsi inunges oleo liliorum calente, laurino, costino, spicato.

Libr. 1. ad
Glauc.

ex pulegio, aut cumino cum castoreo, vel ex terebinthina, quibus aromatum aliquid adjicies: confert & vnguētum marciai o, vel pinguedo lupi, aut vulpis, aut parui canis. Quod si nō profuerint, balnea olei communis ex decocto hyssopi, calamenti, pulegij & similium proficua erunt. Si tamen convulsiones, deliria ac febris, nulla cōuenientium vi remittantur, ex Galen. & reliquorum veterum decreto nervus totus præcidendus est, & pariter si puncto masculi capite convulsio fiat: sine motu enim aut sensu particula superest, cæterum accidētia remittuntur, & superstes manet laborans,

Quod si inflammatio vrgeat, considerandum est, an in vna vel in pluribus partibus (vt sæpe in nervorum vulneribus accidere solet) adnascatur, & vt cunque sit, eam præcauere oportebit: aut si adfuerit, mitigare & resolvere: quippe nervosarum partium inflammationes, non admittunt medicamenta quæ alijs inflammationibus sunt proficua: nervi enim nullam refrigerationem aut repercussionē admittunt, sed sanguine missio & defensus supra partem affectam appositus, inflammatis, ea sunt adhibenda quæ dolorem leniant citra humiditatem, vt rosaceum iuxta vulnus irrigatum terquaterve in die. Postea discutere quod influxit oportet, & partem roborare: quominus recipiat, & magis ac facilius receptum discutiat. Qua ratione ab antiquis quàm plurima comprobantur medicamenta, veluti fabacea farina, orobi, cicerum, hordei, lupinorum, cum oxirhodino aut oximellite, vt recipe granatorum semidulcium, m.ij. decoquantur in vino nigro & subtilissime terantur, & trāsmittantur per cribrum, & adde farinæ hordei. 3. ij. pulueris

li. de morbis mul. c.

3.

li. 6. mer.

c. 3. & lib.

3. c. 9.

Itē Aetius

14. ca. 29.

& paulus

li. 4. c. 54.

Institutionum Chirurgicarum

foliorū rosarum & camemali ana. ʒ. j. olei rosari, & rob. q. s. pro emplastro. Transacto principio, discussionem materię curare oportet eo. q. r. foliorum mialuarum, violarum & rosarum, meliloti, ana. p. j. hordei, fabarū detractis corticibus, ana. p. j. medullę panis. ʒ. x. bulliant in sufficiēti aquę quantitate, donec hordeum aperiatur, deinde per cribrum transmittantur, vbi subtilissimē contriueris, & adde olei rosati cōpleti, camemelini ana. ʒ. ij. rob. q. s. fiat emplastrū. Tandem quo magis quieverint accidētia, eo magis resoluētia addere oportet. Verūm si ad suppuracionem vergat inflammatio, ad suppurationē confugiendum est, sed quę vim habeāt calfaciendi cum temperata humiditate: fiat igitur cataplasma ex farina triticea communi oleo & aqua, aut ex farina triticea, sapa & oleo rosaceo, addes tamen camemali nonnihil: & sanie collecta curabis quā citissimē extrahere, facili enim neruea substantia putrescit, quod summopere cauendum est in hac curatione.

Ceterū quia nerui substantia ex humida materia à frigido coagulata efficitur, ob id à calidis & humidis, aut à sanie non expurgata, vel ab inflammatione prauē curata in putredinem & corruptionem degenerat, succrescente nonnunquam adeo copiosa humiditate, aut crassiori substantia, quod nisi citò praueniatur, in integram membri corruptionem coniectandum sit. affectum commigrare. Quo fit, vt causticis medicamentis, & valenter exsiccanibus vtendum protinus sit, vt est vnguentū Aegyptiacum, vnguentum rubrum, & alia quę ex myli calthūde acusti, squāmā aris, & similibus, sunt quorum siluam reperies cap.

de esthiomeno.

DE VV LNERIBVS VE-
narum & arteriarū ac de sanguinis pro-
fusione
INSTITVTIO V.



V M. difficile admodum
sit venarum vulnera curare,
& longè difficilior arteria-
rum, quia sanguinis & spiri-
tus profusiones & pericu-
losæ & difficiles existunt,
præterquam quod plerum-
que accidat in magnis vul-
neribus, diligenter oportet,

harum partium vulnera & sanguinis fluxiones hac
institutione docere curare & compescere. In qua
agendum est, de vtriusque partis vulnere & sangui-
nis fluore, qui longè magis urgere solet. In pri-
mis statuendum est, quod licet multis modis ex ve-
na & arteria sanguinem fluere conspiciamus, nimi-
rum aperta, exesa, aut vulnerata, nos hac in parte
non loqui nisi de vulnere vene, & arterie. Vulne-
rantur etenim huiusmodi vasa ab incidentibus
gladio aut sagitta: ab his quæ rumpunt, vt casus,
ictus aut repletio vasorum, vel à lapide aut ligno
conrudentibus.

Constabit aliquod prædictorum vasorum esse
discissum, ex vulnere copiosum sanguinem pro-
fundente. Sit ne vas arteriosum, cognosces, si san-
guis cum impetu aut saliendo profluat, ac flauus, fer-
uensq; appareat: quod si crassior sit & nigror, cum
quiere, sine pulsu ac citra saltum effundatur, indi-
cium est, ipsum à vena fluere.

Institutionum Chirurgicalium

¶ Vt cunque tamen sit, omnium sententia periculosum est, ni citò præueniatur. Quippe accersit protinus syncopen, conuulsionem, lingultum, & delirium, ac si ex arteria fluat, longè citius mala hæc succrescere conspiciamus, & protinus mortem. Cum hoc tamen statuunt authores non contemnendi, arteriam per transversum discissam, citius coalescere, quàm si longitudinaliter vulnerata fuisset, ob dilatationem, quia hoc modo dirupta, non permittit coalitum: vt cunque tamen fiat, difficilior est sanatu arteria quàm vena.

Curandi autem ratio duabus tantùm indicationibus constare videtur: primò ad fluxus cohibitionem astringente, qui maioris est momenti & urgentiæ, secundò ad vulneris coalitum. Primus insuper tribus omnino modis complerur: avertentibus nimirum, tum sanguinem, tum ipsius impetum reuellendo, aut deriuando: item sanguinem incrassantibus, & topicis auxilijs. Reuellunt autem citra euacuationem (nam in magnis profusionibus, id est laudabilius) cucurbitæ siccæ, frictions, ligaturæ partium oppositarum. Verùm si non profuerint, ad venæ sectionem erit perueniendum, ex parte opposita, quæ parca sit & repetita: deriuationes verò in his fluxionibus rarò sunt ex vsu, licet aliquando profint. Quo facto vtendum est, frènantibus, atque intercipientibus sanguinis impetum, quorum alia sunt incrassantia: vt lentes, oriza, iuiubæ, fructus omnes stiptici, ac syrupus ex rosis siccis & cotoneorum: alia stupefacientia, & simul condensantia sanguinem, & vias, veluti aqua frigida, tum epota, tum circa locum, ex quo profluit sanguis proiecta, minimè supra vulnus ipsum: nonnulla etiam frigida, vt syrupus ex granatis, rosis, portulaca & simi-

Amilium. Quòd si his factis non quieuerit sanguinis fluxus, ad topica auxilia deueniendum erit. Primò igitur ex vsu erit digiti admotio super os vulneris blandè & sine dolore comprimens: item vulnus forinsecus fascia alligabis ex tenui linteo, cuius fasciæ primi quatuor quinq; ve amplexus profluëti vasi iniiciantur, abhinc vasis radicem versus donecere licet, præterquàm in cerebri membranis. Præterea puluillis ex stupis oxicato madefactis & expressis vrëris, qui post admotionem pulueris adstrictorij vulneri alligandi sunt. Quòd si in promptu non sint, post admotionem pulueris tres aut plures pânii linei oxicato madefacti & expressi medicamentò sanguinè supprimenti imbuantur, & vulneri applicentur. Præstat insuper futura (maxime vbi nulla partis substantia deest) qua faciliùs labra vniantur: sic vulnere repurgato à sanguine concreto, ipsius vulneris labra in idem adducenda sunt, manuum opere, vbi sic ad manus vulnus se exhibet: postea consuuntur futura communi, qua qui pelles suunt, facere solent, præsertim si magno impetu sanguis prorumpat. Acus autem dum vlcus fuitur, satis altè in carnem mittenda est: post hæc puluis adstrictorius superponendus erit, deinde stupæ oui albumine & puluere adstringente imbutæ superponendæ sunt. Quibus peractis, membrum affectum deligandum erit, & situ appositissimo collocandum. Quòd si consui non possit vulnus, quia aliqua deest substantia, linamentis & ellichinis, aceto, oui candido, vel adstringente medicamento imbutis & expressis, vulnus opplendum erit, & desuper sponsa aqua frigida expressa imponenda & obliganda est.

Verùm si adhuc his factis non subsideat fluxus,

et medebris præfione totius venæ vel arteriæ, quando scilicet in profundo delitescit, & mox pulvis aliquis sanguinem cohibens super vulnus imponendus erit, ac desuper stupæ, aut spongia adstringentibus medicamentis imbuta & expressa alliganda. Cæterum si scissionem verearis efficere, funiculo vasi sanguinem fundenti circumposito (præsertim cū venæ vel arteriæ in cōspectu sunt) denudato vase, & hamo apprehenso, mox filo setico excepto valenter ipsum adstringes, post hæc medicamentum agglutinans vulneri impones, & membrum fascijs decetibus deligabis, & situ convenienti appones.

At si hæc omnia prodesse non videantur, ferro candenti crustam inducere curandum erit, idque maxime cum vasa sunt putredine corrosa, & ante tertium diem ligaturam ne admoueto, nisi sanguis fluxerit.

Medicinalia verò quæ huic vsui proficua computamus, sunt veluti emplastrum q. r. thuris, aloës, ana partes æquales, excipiantur albumine oui & cū pilis leporeis apponantur. Alterum recipit boli Armeni, ʒ. ij. terræ sigillatæ. ʒ. f. farinæ volatilis. ʒ. j. gyphi, calcis viuæ, ana. ʒ. j. thuris, aloës, ana. ʒ. f. fiat pulvis qui albumine oui excipiarur. Aliud item recipit calcis viuæ, sanguinis draconis, gyphi, aloës, thuris, viridii, ana partes æquales, cū cui albumine & resis araneorū excipiantur. Eundem vsum præstat pulvis qui recipit boli Armeni, sanguinis draconis, thuris, aloës, ana partes æquales. Item aliter recipit lapidis hæmæmis. ʒ. f. thuris, masticis, boli, resis araneorum, gallarum viridiū, ranarum exsiccatarum, gyphi, fuliginis, farinæ volatilis, ana. ʒ. j. viridii combustæ, calcis viuæ, tragacanthi,

cāhi, ana. 3. j. f. rasurę corij arteris, vel hyrci, char-
te papiraceę, pilorum leporis, & bombacis torre-
factorum, ana. 3. f. stercoreis afini. 3. iij. fiat pulvis
tenutissimus. Alia etiam reperies quę proprietate
quadam idem beneficium præstant, quę breuitatis
gratia subriceo.

Superest vltimò iam fluxione cessāte, vlceri pro-
videre, quod sui tantū vnionem indicat: vnitur au-
tem præter saturā, medicamentis consolidantibus:
arteria quidem siccoribus tantum eget medicamen-
tis, quantum siccitate venam superat.

DE VVLNERIBVS

abdominis

INSTITVTIO VI.



V M euentissimum sit, & enen-
tu quotidiano confirmatum, ven-
tris vulnera esse nulle modis cu-
ratu difficilia & periculosa, ob id
diligenter studendum est ratione
huius difficultatis & periculi nos-
se. Quapropter primò sciendum
erit, an ad aliquod vsque viscus ex his quę in ven-
tre continentur, telum peruenerit, & ipsum vul-
nerauerit, an secus: nam ex huius rei notitia pēdet
& periculi ratio, & curandi difficultas. Per ventrē
igitur totam eam accepimus regionē, in qua à dia-
phragmate infra vsq; ad pubis, os nutritiōalia mē-
bra & ijs seruitētia continen- tur, vt iecur, ventricu-
lus, lien, enes, intestina, vterus, vesica, vtreteres, se-
minis vasa, mesenterium, omentum, & venę ac ar-
terię grandiores: sic ventrem Græci appellarunt

Institutionum Chirurgicarum

Epigastrium, Latini abdomen, & Arabes myrrhac. Componitur ex duplici cute interiori pinguedine copiosa, musculo membranoso, pāniculum carnosum appellatum à neotericis, octo musculis diuersi modè procedentibus constructum, cui subijcitur membrana quædam prætenuis, totum subcingens ventrē, & interiora omnia continens, peritoneam appellata, seu membrana abdominis vel syphac.

Ventris igitur vulnus cognitio adeo per se innoteſcet, ut signis non indigeat: sat enim erit telli figuram nouisse, ad penetrationis aut secus cognitionem: sed ulterius considerare oportet, an profundum sit vel superficiale: quod si superficiale sit, ex tactu & specillo explorabis facile. Verū si intus permeauerit, & id ductu specilli cognoueris, tūc ultra inquirendū est, an ex partibus contentis aliqua fuerit lesa, vel solū sanguis delapsus fuerit in spatium ventris cauū, è quo nulla est extrinsecus via, quo fit, nō minus graua esse vulnera ventrē penetrantia, quā quod viscus aliquod percusserit. Nā ob id dānauerat Hipp. in prog. apostemata intestinorum, quæ extra rumpuntur. Cognosces autē omentū percussū fuisse & vulnus penetrasse, ex eius portione per vulnus prominere. Vētriculum fuisse lesū, ut refert Celsus, quia singulū patitur & bilis vomitum, & cibum ac potum mox ab assumptione reddit. Præterea sanguinis eruptio paucissima est, quia graciles sunt illius venę, chylus per vulnus emittitur, aut ingestus cibus, spiritum etiā apparet sanguineum, & dolor acerbis, ac præcordia indureſcunt, & postea sequuntur vertigines, febres, animi defectus & syncopes, cum sudoribus diaphoreticis, & extremarum partium perfrigerationes. Hæc præ fauciato sub dextera parte præcordiorum, est
fun

funditur sanguis crassus, interdum biliosus accedit vomitus, ructus etiam foetidi subsequuntur, pulsus parui & frequentes, laborantes fiunt tristes & iracundi, colore cineritio foedati, cum tussicula & dolore usque ad ingulum dextrum: febris adest intensa, & vrina atque alui excrementa cruore affecta excernuntur, cum putredine & sanie vulnere sub spurias costas in parte dextra apparente, aut eā partem attingente: & si inflammatio hepar apprehendat, hæc omnia deteriora fiunt. Lienem affectum ostendit vulnus in sinistro latere inflictu, per quod exit sanguinis crassus & feculentus, cum præcordijs eā parte tensis: adest & sitis ingens. Si vulnus intestinorum aliquod permeauerit, sterqus attenuatum, aut foetor per id exit, nonnunquam bilis per os redditur, ac non raro cibus & potus, cum febres & si ex gracilibus sit aliquod percussum, eadē signa apparent, ac in læso ventriculo, & affectio periculiosior & sanatu difficilior, è contra verò in crassiss. Vesicam vulneratam ostendit redditus sanguinis cum vrina, aut vrina per vulnus excreta, & nonnunquam suppressa: dolent inguina, & iuxta pubem, talem euomunt sic affecti, & singultunt: aliquando vrina redditur cum anxietate: in qua pus aliquando apparet, incurabile vulnus esse arbitrantur omnes auctores. Renes esse vulnere perfoßos monstrat vrine cruor, vel omnimoda suppressio cum totius corporis tumore: mortis citissimæ præludiu: adest dolor iuxta inguina & testes cum foramine è regione illorū illato. Vterū læsum ostendit sanguis per pudendum fluens: dolor iuxta inguina, coxas, & femora: vomitus adest biliosus, & nonnunquam foemina obmutescit, aut mēte turbatur, cum oculorum dolore & vulnere in infimo vētre. Venā magnā sau-

Institutionum Chirurgicalium

riatā esse ostendit magna sanguinis nigri profusio cum extremorum frigiditate, & pulsus languore, & sudore frigidissimo, atq; animi defectione. Ar etiam verò sanguis spirituosus impetuosè fluens, floridus, ruber & copiosus, cum syncope, & breui morte.

Cæterū cū nullum prædictorū vulnerū periculo careat, hoc minus & tardius accidit, illud verò magis & citius, prout symptomata succrescunt graviora aut minus gravia: ob id antequam superveniant, providendum est diligentia ea præcauere, & vulneri subvenire. Quòd si simplex sit, nec omnino posthabendum, nec timendum erit: facili enim vel ex ipso partis rore hæc vulnera sanantur, nisi aut corpus sit pravis succis scatens, aut aliquis musculorum abdominis adeo latus, quòd conuulsione vereamur, vel difficilem partium coalitum: quia respirationi naturali sunt opus, & ad ventris excrementa propellenda. Quo fit ut hæc omnia considerare expediat, tum ad præsagium, tum verò ad præcautionem: & ob id simplici vnione coniungere labia oportet, sutura & fascijs ac agglutinantibus calidioribus adhibitis.

Semora omni vulneris complicatione, siue telum infictum sit, siue sanguinis fluxus, siue symptoma aliquod acsit, aut inflammatio, vel inreperamentum, conijcere mox oportet, an omnem periculum excidar, an intro percussum fuerit, hoc enim nullam aliam in artifice diligentiam requirit, quàm vulnus curare: illud verò maiore requirit, nam cū membrū hoc adiposè sit natura, facili alteratur & corrumpitur, & ob id inspicendum est, an aliquā ab ambiēte acceperit mutationem: quòd si nullam acceperit & album apparuerit, alio ipsum in propriam sedem repones,

repones, leuiter ac blandé manibus propellendo, succelsiué tamen & paulatim, donec ingressum fuiffe percipiamus. Quód si perfrigeratú aliquátis per apparuerit, vino tepido aut aqua decoctionis camemali & betonicę foueatur, donec calefcatur & molle fiat, & si opus fuerit, vulnus leuiter dilatare, seruatis intestinis poteris, quo facilius subingrediatur. Verúm si putruerit, aut incorrigibile alteratione in prauum coloré muretur, sequi oportet Gal. cõsiliú, qui de hac curatione sic scribit. Nos verò quoniam scimus cibi substantiam compositam esse ex pelliculis, siue tenuibus membranis, ac arterijs venisque quamplurimis, quorum initia ex maximis orta sunt, sanguinis quidem profluvia cauebimus proinde id quod supra nigricans positum est, vinculo excipiemus: quod post vinculum est, amputabimus, curantes vt vinculi fines extra vulnus perdeant, quo nimirum facilié eos, cum ex vulnere suppurante euomentur, accipiamus. Quo fit, vt cum demigratum aut fuscum fuerit, nulla ratione reponendum sit, sed fuscam partem totam, vsque ad albam & sinceram amputare decet, modo dicto à Galen. Celfo, Paulo, & reliquis authoribus, reposito omento, vulnus suere oportet, & curare vt inferius leges,

Li. 17. c.
16.
Lib. 6. c.
52.

Quód si intestinorum aliquod prolabatur, inspicendum tunc est, an ipsum quoque vulueratum sit, aut secus: si primum, mox abluere vino oportet in quo abstrynthium, camemali, melilotum, anethum & roris fuerint incocta. Deinde ipsum suere oportet pelliõnum sutura, & vtraque fili pars extra ventrem promineat, vt glutinato vulnere possit retrahi. Neque obstat huic operi Galen. qui gracilis

6. Met. c.
4.

difficil-

Institutionum Chirurgicarum

difficulter vniri, & ieiuniū impossibiliter scripsit. Cumq; intestinum cōsurum fuerit, respergatur mastiche vel quouis puluere adstringente, & agglutinatorio, & in cauum vētris immitratur. Verū si intestinum lāsū non sit, & excidat (quod nusquā fiet, nisi musculus abdominis rectis præcisis, & aliquando obliquis, crassa quippe nō excidēt, nisi medius venter scindatur) extra prominens, verēdum est ne inflāmerur, ne in tumorē flatuosum crescat, vt reduci non possit. Tunc quidē primō fouendū est vino in quo ferbuerint anisum, foeniculum & cuminum cum melle, aut catellum vel columbam, vel gallinam per mediū scindes & puluere ex discutiētibz flatū resperges, & intestino tumēti admouebas. Quod si flatus na discuti nō possint, nec intestinum suo loco restitui, vulnus dilatare obruso ferro, ne amplius intestina lādantur, opori ebit, & quo facilius intestinum possit remitti. Ceterum in scissione curandum est in vulneribus rectorum abdominis musculōrum, per rectum efficere, etiam si transuersis noceas: nam ob colligantiam quam habent, melius hæc ferre possunt quā si cōtra feceris.

¶ Intestinis in suum locum restitutis, curandum diligenter est vulneris labra vnire, & sutura vnire continere. In qua re, licet varij sint suturæ modi, nostri temporis Chirurghi ratione & experimento ducti, solū vniunt eo qui labra profundius simul omnium diuisarum partium apprehendit acincurua, longiuscula, triangula: o cuspide, & filo lineo duplici & equali traiecto, pellionū sutura simili cōiugit. Quo facto agglutina: orijs vtēris medicamentis: inter quæ vtilissima rebebinthina calida cum aliquo puluere restrictio, & transfactis tribus quatuorve diebus vtēris emplastro barbaro applicato.

aut

aut eo quod ex vitumine, & aceto paratur: sed vtilius est, qđ diapalma appellatur: interim tñguina oleo rosaceo & mastichino fonebis, & cōueniēti ligatura partem & ventrem conteges: corpus dein ceps quieti obseruanter mandabis, & cubare supra latus vulneri contrarium curabis. Præterea præcauere oportet, ne vel pars inflāmetur, vel alia accideſtia ſuccreſcant, ſanguine ſufficiēter miſſo, & tenui victus ratione inſtituta: in qua re plurimum purgationi innitēdum non eſt, niſi inclinante malo, neq. vomit: ſat enim erit clyſmatis emolliētibus ad ſæcam duritiem vti, vel agglutinantibus, & adſtringentibus vulneris ratione, quale eſt quod recipitur caponis aut inteſtinorum vel extremitatum verbecis, in quo hordeū, camemalum, anethum & furfures coxerint, & vitellum oui ac mel roſaceum ſuperaddes. Et poſtea aliud cōficiēs ex vino auſtero, & drachma vna pulueris ad ſtringentis, præſertim ſi vulnus in craſſis inteſtinis fuerit. Deinceps quid agendum ſit monſtrant ſymptomata: nam curandū eſt dolorem, & tormina inteſtinorum ſedare forū vini, in quo ſerbuerit ſemen a niſi aut ſoeniculi, melilorum aut camemalum & abſynthium.

Ventriculo læſo vulnus eodem modo curetur: cæterum cibaria ſint leuiora, vt panatella, amyllum, & reliqua huius naturæ, & potus aqua chalybeata, fugiendūq; erit ab omni purgatione ex eligente trahenteq; pharmaco, ſat enim erit caſia vel māna: affectio quidem huius mēbri periculoſiſſima eſt.

Iecur aurē fauciatū lethale dānum aſſert, tan oq; grauius, quanto in eo vas aliquod grandius diſciſſum eſt, perit enim protinus cor defectu alimentati, antequam ſanguinis impetus compeſcatur. In cuius curatione victus ſit tenuis, cæterum copioſi nutrimenti

Institutionum Chirurgicalium.

crimenti & agglutinantis virtutis, vt ius extremitatū animalium cum borragine, in tybo, lupulis, plantagine & similibus: vtatur panatella, & aqua chalybeata, vel decocta cum rolis liccis. Secetur vena, præsertim iecoraria oppositi lateris, à qua paulatim sanguis bis terue extrahendus, & leuiter iecur & sanguinis massa diluto rhabarbari ex aqua cichorij & plantaginis purgetur, vel clysmatis vtatur ex decocto cōsolide maioris, equiseti, cetaurij maioris, addito saccharo & oleo myrrino. Vtatur laborās tragacatho, bolis ex spodio, terra sigillata, ex bolo Armeno, cū succo pentaphylli aut arnoglossæ, tabellis ex rhabarbaro & similibus. Venti (quia vereri sanguinis fluxum semper oportet) adhibeantur medicamēta sanguinem sistentia, vt succus equiseti, plantaginis, pentaphylli, pilosellæ cū thure, aut manatharis, vel puluere rhabarbari, sanguinis draconis & cetaurij maioris ac similiū. Inunges quoque dorsum & ventris regionem nuper dictis oleis, addito oleo absynthij.

De liene affecto nil ampliū dicendum est, quam fugienda esse (sicut in iecore) medicamenta nimium calida aut adstringentia, ne absumpra tenui, & nutritura humiditate, crassa remanente in duritiem immedicabilem degeneret. Quibus consideratis, facile erit reliquorum membrorum prouidentia habere: renes enim, ferè eodem modo præcauendi

& curandi sunt. Vesica tamen rarò coalescit: at qui cū hoc auxilia prædicta supra pubem

adhibenda esse consulit beni-

gna Medici conditio.

DE VVLNERIBVS THO-
racis

INSTITVTIO. VII.



HORACEM Medici
omnes eam nostri corporis
partē appellant, quæ est in-
ter claviculas, & inter septū
transuersum. Diuiditur au-
tē interius secundū sui lon-
gitudinem in duas partes, à
validis quibusdam membra-
ris, quæ anteriori parte, of-

fibus, pectoris, posteriori spinæ vertebri inferuntur,
mediastinum à Græcis nuncupatur: nec propter
hoc duo ventres, sed vnus tantum est, continens
cor cum eius capsula, phrenon siue diaphragma,
pleuram, venam cauam, arteriam adorti, asperam
arteriam & œsophagū: quæ omnia membra ea dig-
nitate & præstantia prædita sunt, vt vulnerata ma-
ximū periculum inferāt, & Medico curamro mag-
num negotium. Et ob id thoracis vulnera adeo
sunt periculosa, quod nos monent diligenter tra-
ctare cognoscere, quā tendant, vt possimus finem
artis in re hac grauisima consequi. Prætermisso
simplici thoracis vulnere, vt potè quod nihil eua-
riat à communi curatione, reliquorum, quæ thora-
cem perforant meminisse solum oportet.

In his itaque vulneribus præter morbum & causas
(quæ vel incindētes vel pungentes sunt) particu-
las affectas intra thoracem diligenter curandum
est dignoscere. Primò thoracem esse perforatum
monstrat

Institutionum Chirurgicarum

monstrat anhelitus per vulnus emissio, maximè ore & naribus clausis, quod per candelam ardètem & lanam carptam, iuxta vulnus positam percipies, si vel flama dimoueatur, vel pilus lanæ. In qua re duo tibi sunt expendenda: primum est, ærem illum non esse portionem eius qui ore aut naribus fuit attractus: quippe is ad pulmonem solummodo peruenit: qui verò per vulnus exit, is est qui per idè vulnus permeauerat in thoracis dilatatione: quo fit vt sic affecti nō rarò voce priuentur, quia maior aëris portio trahitur à thorace per vulnus, quàm ad pulmonem per os, & sic deficit in efflatione ad vocem materia. Secundum est, non semper hæc vulnera, quantumvis specillo id exploratum sit, ad inanitàe thoracis permeare, quia mediastinum tunica, quæ thoracem iuxta os ensiforme diuidit longitudinaliter, interdicat, ita vt conspiciamus ea parte fistulosa vlcera, & confusum thoracem non permeare ad cavitatem gratia prædictæ tunicæ: & sic medicamenta, quæ iniiciuntur, ibidem manent, citra id quod aliquid eorum intra thoracis cavitatē prolabatur: quod nouisse ad rectam curationem maximi est momenti. Quibus signis accedit laterum dolor & grauitas, pondus iuxta mendosas costas ex sanguine ibidem prolapso, item sputum sanguinolentum. Et quia pleuram simul perforari est necessum, tussis sequitur, plerumq; sicca, dolor validus, quia valida est, neruosa, ciuidi contumax, & maximè sensibilis; quo fit vt inflammationes & conuulsiones non raro accerfat ac febres.

Cordis vulnus monstrat nigri & crassi sanguinis magna profusio, si dextra eius pars sauciata fuerit: si verò sinistra, florentissimus & clarus effertur, vnde totius corporis æqualiter languescunt, faciei color

tor pallidus fit, sudores frigidi & pravi odoris pro
rumpūt: pulsus euariant: extrema frigida fiunt, ani-
mus deficit, & citissimam mortem minatur: nā cor
ob innatā nobilitatem diuortium non patitur. At
ferē eadem signa suboriuntur vena caua intra tho-
racem vulnerata.

Pulmo cum thorace perforato sauciatur, spiran-
di difficultatem procreat, sanguinem spumeum, cla-
rum, rubeum, sine dolore fundit, non tamen valde
calidum: ex ore tamen subitō tussiendo, multus in-
terdū spumofus & rarus emittitur: ex vulnere aer
cum sonitu exit. Nonnulli si in vulnus inclinātur,
loquuntur, & iuuat: si in aliā partē, obmutescūt, &
conuelluntur: facies etiā modō inflammatur, mo-
dō dealbescit, vltimō pallida remanet.

Septum transuersum vulneratum ostendit respi-
ratio magna & crebra, tussis cum stercore & dolo-
re, mentis alienatio, sputum liuidum, sitis, cibi fasti-
dium, rigor & vulnus circa notas costas: præcordia
tenduntur sursumq; contrahuntur, sanguis spu-
mans exit per os cum gemitu & dolore per vniuer-
sam humeri regionem, & conuulsiones ac inflam-
mationes protinus subsequuntur.

Nullum prædictorum membrorum vulnus, neq;
ipsa thoracis perforatio periculo vacat, sed omne
periculosissimam existit: alterum tamen altero ma-
gis, prout dignitas aut officium dignius fuerit, aut
vulnus maius. Et sic cordis, pulmonis & septi om-
nino lethalia sunt. Quod si penetrantia sint citra
alterius membri læsionē, quę iuxta dorsum existit
periculosiora sunt, quā quę in parte anteriori,
propter venas, arterias, nervos, œsophagum, aspe-
ram arteriam & ligamenta cordis.

In prædictorum vulnerū curatione id primō cu-

Institutionum Chirūrgicarum.

curabis, nimirū, ne sanguis aut alia humiditas ad
cavitatē thoracis dilabatur, & si quid iā collectum
fuerit, diligenter euacuare, ac præcauere, ne ex vni
uerso corpore ad affectā partē aliquid fluat. Secun
dō vulnus abstergere curabis siccare, & ad cicatri
cē ducere, prouidentia habita mēbrorū quæ intra
thoracem lēsa fuerint.

Sanguinē in thoracē profundi aut ibidē diu de
tineri prohibemus (asserēt Gal. manifestum esse
pectore vulnus perforatum patiente, sanguinē ex
vulnere ad spatium quod est inter thoracem & pul
mones fluxum tandē suppurari) præhabita diligen
tia piulcis & corporis prona figura, aut excitata ius
si, & corporis cōmōtione, elatis pedibus sanguinē
extrahere. Prius tamen facta cōsideratione de vul
neris loco, sit ne in magnis venis aut arterijs, vel in
paruis: nā si in paruis sit, nulla opus erit diligentia,
quia & parū sanguinis decubuisse in thoracem erit
coniectandum, & eū calor insensibiliter discutiet,
aut per communes canales expurgabit. Quod si nō
satis fuerit, antequā vel concre scat sanguis, vel in
pus vertatur, vtendum est, vel syringa, vel catet hē
re, immensā, quæ suctu piulci modo, sanguinem &
humiditates attrahat: quem quoque vsum præstat
vehemens exsudatio, nisi vas aliquod magnū adeō
diruptum sit, q̄ semper fluat sanguis, quo tempore
veritum est à Gal. id efficere. Quod si sanguis in
grumos mutatus iam sit, hoc vtēris medicamento
q. r. pulueris rhabbari, aut radicis rubiæ. 3. s. mu
nimæ scrup. j. cum aqua plātaginis, potui dabis: con
sulant etia coagulū leporis dilutum in oximelite,
aut aqua hordei: item porriges theriacæ antiquæ
cum aqua scabiosæ. 3. s. exteriūs verō aqua hordea
cea cum oximelite per syringam projiciatur.

Pro-

Prohibebis autē vltiorē fluxū sanguinis, tū ex
trā corpus, tū ad thoracē, frictionibus extremarū
partiū, & brachiorū: tū sanguine misso, si copiosus
nō fluxerit ab extremis & distātoribus partibus:
sin aliter, ab his quæ maiore cōmunionē cū parte
vulnerata sortiuntur. Prodest etiā ex vtraq; palna-
tela sanguinē mittere: quod facies enemate prius
iniectione, & proba vitæ & victus instituta ratione, pri-
mis septē diebus tenuissima, ex panatella, amylo, iu-
re aut pyris assis: etiam potus sit aqua pluuialis aut
deurata. Prohibebis etiam humorum decursum ad
affectam sedem, corpore purgato manna, casia, aut
serapio ex infusionibus violarum cū modico rha-
barbaro.

His factis, & prout rei necessitas indiget, institu-
tis, ad vulneris curationē & accidētū mitigationē
omne dirigatur. Chirurghi consiliū, semper habita-
eius quod in thoracem decubuit prouidentia. Pri-
mō tamen vulnus considerabis, ac si vel duobus
locis fuerit illatum, vel grādius, tunc protinus fo-
ramen obturabis: quippe defectu respirationis fa-
cilē perit homo. Postea verō sciscitandum erit, an
vulnus sit sine fractura costæ, & sine profusione
sanguinis ad thoracem: quo tempore longē tu-
tius est vulnus fuere, & per primā, vt aiunt, intērio-
nem curare, si nullū vas aut mēbrū ex præcipuis læ-
sum apparuerit. Verū si confiterit non posse natu-
ram cōterere quod intus fluxerit, tunc quidem le-
uiter aperto vulnere, & separatis labris, flamula
inniussa madefacta oleo Apaticij, vel si manus ru-
ruda filo alligata, ne procidat in cavitatē thoracis,
curabis, cauens ne impedimento sit eductioni pu-
ris: nam eo tempore flamula vtilior erit, quæ mado-
fiat oui albumine, cum puluere agglutinatorio.

Institutionum Chirurgicarum

aut terebinthina abietina, positis desuper stupis eodē modo. Ac si res sine fluxu interno aut externo, & citra accidentia processerit, sequentibus diebus vtēris digestiuo ex terebinthina & oleo rosaceo: demum cū pus apparuerit, dete sorio linimento vtēris, q. r. mellis rosati. ℞. ij. terebinthinæ ℞. iij. succi apij & plantaginis, ana. ℞. j. coquantur modicē, & adde vitella ouorum nu. ij. farinæ hordei & fœnugræci ana q. s. fiat linimentū. Alterū recipit mellis. ℞. j. myrrhæ, thuris, sarcocollæ, ana. ℞. ss. farinæ hordei & fœnugræci ana. q. s. fiat linimentum: parti verò externæ emplastrum diachalcitidis postea appones. Quod si cū fractura costæ fuerit, aut musculorum intercostalium contusione, accedit tumor quidam veluti aere aut tenui liquore plenus, qui compressus cedit, & si diu permittatur, ob vitium humoris costas carie corrodit, ob id fascijs pro:inus, & medicamētis resoluētib⁹ prius, donec euanesca, vtēris, & postea curato vulnere vt dictum est, si fractura costę etiam adfuerit, oxicroceo emplastro appposito vtendum: ita tamen vt vulneris locus apertus maneāt, quo facilius expurgetur, donec costam coaluisse constiterit.

Verū si res nō cedat ita prosperē, sed mille accidentibus vt solet turbata, cuique vt postulauerit subueniēdum, & vlcus longē aliter curandum. Sic dolorem mitigabis epithemate ex decocto althææ, violarum, camemali, anethi, seminis lini, fœnugræci, si febris non adfit, alioqui violarum & rosarum. Vaguento etiā q. r. vnguenti resumptiuui. ℞. j. f. dialthææ. ℞. j. pinguedinis anseris & anatis, ana. ℞. ss. butyri receris & olei amygdalarum dulcium. ana. ℞. j. croci parum, cerę. q. s. fiat vnguentum. Inunges etiā locum oleo nardino, si hyems fuerit, aut camemel-

no: si verò ætas, rosaceo aut violaceo: ex quibus cum farina hordeacea, seminis lini & vitellis ouorum & sapa cataplasma conficere poteris. Quod si tussis adfit, & respirationis etiam difficultas, cū omnino thoracis vulnerū cōsolidationem impediatur, mīscēda protinus est decocto q. r. hordei mūdī p. j. glyzyrrhizæ. ʒ. j. quatuor seminum frigidorum maiorum, ana. ʒ. s. iumbarum, passularum, ana. ʒ. f. penidiarum. ʒ. ij. sacchari albißimi. ʒ. iij. coquantur diligenter, & manē ac serō eo vtatur laborans. Præstat syrupus violaceus, capillorum veneris, de glyzyrrhiza, aut teneat ore diadragacāthū, vel diapenidion. Quod si sanguis copiose fluxerit à vena vel arteria dissecta, & tum intra, tum verò extra profundatur ex arteria omnino iudicare lethale esse vulnus oportebit, præsertim si non ex vasis musculorum intercostalium, aut pleuræ: & pariratione si ex vena aliqua interna, quæ obstruari medicamentis non possit. Præterea si ab interna fluat, præter dictam rationem res periculosa est, quia copiosior fluxio ad cavitatem thoracis prolabitur, & si extrinsecum foramen obrueris, intrus manet omnis sanguis extra venas; si apertum permiserit, cum sanguine spiritus etiam profunditur: verūm vtcunque sit minus periculum exit foramen obstruere. Sic clauso vulnere, & eius labris quæ dissident, in idē coactis, præsertim opera & manu Medici, vbi vulnus ad manū se exhibet aut facta decēti ligatura vel sanguine in venæ scissione concreto, foris medicamenta impones aut linamenta emplastricis medicamentis respersa, vt oui candido cū thure, mastiche, aloë, bolo Armeno, farina volatili, aut leporum pilis minutim incisis, aut fiat pulvis ex aloë, thure, gypso, cū prædictis pilis. Laborati, etiā

Li. 7. de
compo.
phar. loc.

Institutionum Chirurgicalium

Li. 6. de
comp.
phar. lo.

si à canitate profluxerit, porriges lapidis hematitis scrup. j. cū aqua portulacæ: aut vt Gal. cōsultit fiat trochisci ex acacia, rosis, balauftijs, gūmi tragacanthæ cū aqua pluuiali: laudantur trochisci de charabe, de terra sigillata, & diadragacanthū, cū bolo Armeno: probatur portulaca, & cētinodiū, & saccharum rosaceum. Pectori verò extrinsecus adhibere oportet ex vino nigro adstringente bolo Armeno, & oleo myrtino, epithema.

Verū si sanguis ad cavū thoracis prolabatur, sepe numero ante vulneris cōueniētē absterfionē, & optimā exsiccationē, exterius angustatur foramen, intrus verò manente sanguine aut quauis alia humiditate laborātes suppurati fiunt. Quo tempore lōgē aliter curationē instituire oportebit. Dixerat enim

Libr. de
coac.
piz.

Hipp. Quicumq; vulnerati in thorace externa vulneris parte sanati, interna verò non, periclitantur, aut verendum est ne suppurati fiant. Qui verò sic laborant difficulter sanari restituantur, nisi humor ille, qui in thoracis spatio continetur, absumatur: quod fieri solet aut per internas regiones, velut per spurum & asperā arteriā, aut lotij copiam, vel albi copiosam eductionem, aut per vulneris orificium, vel alio denuo facto. Prætermisiss igitur euacuationibus puris aut humoris in thorace contenti per vrinam aut album aut naturæ commissis (nam in hoc naturam non licet imitari) tribus modis procedendum est in hac curatione. Per spurū nimirum, cū huiusmodi humor mouetur, feruare oportet Hipp. methodū saniei coctionem fomentis adiutuando, per spongas ex decocto althææ, violarum, hordei, scænu græci & similum, cū butyro recenti & oleo amygdalarum dulciū. Pro sunt & serapia, atque eclegmata, & decoctū hordei cum

Li. de ha-
mo. in
prim.

cum saccharo, & saccharū rosaceum, cum aqua decoctionis lentium, & fabarum.

Interim tamen vulnus curabis apertum tueri, vt per ipsum, quantum puris aut reliquarum humiditatum præfuerit, extrahatur. Quod facies puilcia aut incuruata syringa, vel canulo imposito, applicito exterius aliquo medicamento cui insit exsiccandi potentia, temperata attractione non exposito, quale describit Gal. vt emplastrum de gratia dei, aut de gummi elemi, aut aliud. q. r. resinæ pini, ℥. s. cata visci quercini, propoleos, ammoniaci, galbani, ana. ʒ. j. ceræ. ʒ. iij. liquefat cera, postea resinæ vltimò omnia miscēda sunt, & adde pulueris aristolochiæ rotundæ, consolidæ minoris, ana. ʒ. ij. & fiat vnguentum. Quod si canulus immitti, nec intus seruari possit, linea tenta quotidie imponatur, donec ad cauum perueniat, filo tamen alligata, & terebinthina abietis calida imbuta: quod sanè præsidium maioris arbitror momenti, quàm quoduis aliud, excepto eo quod recipit resinæ claræ & odoratæ. ʒ. vj. olei laurini, terebinthinæ optimæ, ana. ʒ. j, gummi elemi. ʒ. i. liquefiant in vase æneo, sæpius agitando donec liquefiant: deinde addantur laurinum & terebinthina, & iterum parum bulliant cum perpetua agitatione, postea per stamineam colentur, & quod instillauerit vsui serua: est quidem incredibilis efficaciam in huiusmodi vulneribus in corio extensum & supra partem applicitum, facto per medium corij foramine, per quod pus expiret. Quod si ob angustum canalem pus exire nequeat, inijcere oportet per syringam mulsam, vel vinum mellitum: vel fiat decoctum quod recipit hordei mundi, lentium, ana. ʒ. ij. equiseti, glyzyrrhizæ, & hyssopi, ana. m. f.

Institutionum Chirurgicarum

aque. q.s. fiat hidromel, additis mellis aut serapij ro-
facei, si febris vrgeat. §. iij. iterum parum bulliat &
colentur, quo tepido bis terne lauibis: quo facto, la-
borans se inclinet supra latus perforatū, aut tussiat,
quo facilius cum lauacro pus exeat. Quod si iā pus
exire non compareat abstergetibus vtēris, & sicut
reliqua vlcera curabis, vulnere carne repleto, & ci-
catrice inducta.


Lib. 2. de
morb.

Verū si quæ in thorace continetur materia, suf-
ficiēter expurgari nequeat, ne in ptisim & immedi-
cabile damnū cōmigrēt affectio, nouam sectionem
facito, quo exeat pus supra septū prolapsū, idq;
inter tertiam & quartam costam: quod magis pro-
bandum videtur, quā inter quartam & quintam,
aut quintā & sextam, quod dictū esse arbitror, si
vulnus spinam versū vergat. Quod facies in co-
starum longitudine, scalpelio potius quā igne, licet
Hipp. aliter sentiat, quia intelligit de tumore ibidē
suppurato: sed a pertionē facies nō procul ab spina
dorsi, quo magis recedās à septo transuerso, quod
Hipp. summo perē cauere in huiusmodi aptioni-
bus iubet. Quod si robustus æger videatur, sectio
in cavitatem vsque penetrare poterit, pus tamē ne-
que subito, neq; confertim extrahes, sed lentē, pau-
larim, & singulis diebus: si verō imbecillis sit, pene-
trare vsque ad pleuram sat erit, quo paulatim pus
exfuder, aut naturæ vi aperiatur, & sensim exeat.
Postmodum verō partem collues vt dictū est, vel
mellicrato, aut vino mellito ex decoctione stella-
riæ herbe, aut caryophyllatæ, & trifolij. Atque
hæc sufficiant, nam passim quæ desunt

reperientur.

DE CAPITIS CONTUSIONE,
& vulneribus

INSTITVTIO. VIII.



IN VVLNERVM
capitis curatione due frequē
ter se offerunt mōstroſe rari
tates: vna quidē nō paucos
periſſe, vel ſola cutis capitis
excoriatione. Cuius occasio-
ne dixit Hip. nullum capitis
vulnus contēnendū fore: nā
ſæpiſſime ex huiusmodi vul-
neribus confidēter cū negligētia curatis, plures in-
terſiſſe conſpeximus, non ſine magna Chirurgico-
rum admiratione & artis opprobrio. Altera quidē
ex vulneribus magnis cum cranei fractura, & non-
nūquam diſruptis membranis, ac forſan medullaris
ſubſtantiæ parte diſciſſa, citra vllam artiſicum ſpē
aliquos ſanitati eſſe reſtitutos. Quod animadu-
ſum velim, nequis quidquam aut temere commi-
tat, aut negligenter prætermittat, vel ob deſperatio-
nem deſerat: ſæpe enim præter ſpem multa felici-
ter ſuccreſcunt, ſicut alia confidenter & temerariē
neglecta improſperē ceſſerunt. Nec mirādum pro-
fecto eſt, cū tot tamq̃ue varia & ſcitu digna ac
neceſſaria in quouis capitis vulnere exiſtant: ſed
rem, Deo aſpice, ſic aggredior, præmiſſa vulnerū
capitis diſtinctione.

Li. devol-
ner. capi-
tis.

Vulneratur itaq̃ue caput vno ē quatuor modis:
primo quidem per contuſionem: quā rursus tribus
contingit fieri modis: vno ſolū carne contuſa: ſe-

K 5 cundo

Institutionum Chirurgicarum

cundo cum vlcere: tertio cum interna cerebri contusione, & cōmōtione maxima: & quouis modo accidat, fieri potest, citra cranei fracturam, aut cum ipsa, aut cranei cōtusione. Secūdo vulneratur scinditurq; caput cranei fractura intus latente, aut oculis conspicua. Tertio cū solum scinditur capitis cutis vsq; ad caluariam, sine vlla ipsius apparente lāsione. Quarto & vltimo scinditur capitis cutis pericraneo integro manente. Prouenit autem huiusmodi varietas ex percutientis viribus, & telorum differentia, quippe telum aut secat, aut pūgit, aut contundit.

Quibus suppositis, hāc institutionem in duas potissimum partes placet diffecare: in quarum prima de vulneribus, quæ celsim aut punctim insiguntur citra vllam contusionem, est institutum differere: in secunda verò de contusis vulneribus.

Partes igitur quæ lædi possunt in capitis vulneribus, præter extimam cutem tres solū esse possunt, videlicet craneum, membranæ internæ, & externæ, ac cerebri substantia.

Licet seniores Medici varias caluariæ fracturarum species descripserint, nos verò Hipp. imitantes plures tanquam inutiles ad Chirurgi ministerium, & notitiam prætermittimus: illas dumtaxat annuerantes, quæ sæpius occurrunt, & Chirurgo maius negotium facefiunt. Quinq; solum tanquam frequentius euenientes enumerationi, fissuram nimirum, rimam, vulnerationem, collisionem, & oppositionem. Certum enim est caluariæ os pro telli ictus, atq; ossis varietate, variè quoq; frangi contingere. Quarum specierum, quæ veluti primum genus se habent, plures species continēt: nam in iuo sum-

to à sede teli, quę veluti genus est omnium fracturarum quę ab acuto telo fiunt, cum ab acuta exacte teli acie fractura in osse imprimatur, & tantum vestigiū teli representat, à Græcis rognē, à Latinis incisio, & sedes teli dicitur, quia recta, & angusta superficiei ossis scissio est, ut Gal. diffinit, cui aliquando accidit fissio seu rima, quę verē ossis fractio est maior, aut visu difficilior, ita ut à capillorū imagine, capillationem, seu capillarem fracturam nominarint Chirurghi. Hęc etenim dum intima petit aut diploide mēdit, trichismos Græcè vocatur, & Paulus nominat arctissimam rognē: in qua fracturarum forte mirum non est si plures differentię reperiantur, dissidentes solum quoad magis aut minus, nā sunt inter ipsas, tenuiores, & tenuissimę, lōgiores, & breviores, rectę & curvę, superficiales, & profundę, quę iam ad aliud genus proximē videntur accedere. Rima, prout fractionē dicit à gravi & obruso telo, & hac ratione secunda facturę speciē designat, ferē semper contusioni adiūcta est, & varijs innaturatur nominibus, iuxta varios fracturarum modos. Quippe aut à corpore gravi, obruso & non inscindente os frangitur, & tunc solum rima tantum apparet: vel os in plures partes alteritur, cuius pars extrudatur extra, & intrudatur intra, quo meningis internę afficiuntur, & vocatur ecpiēsma, quāficompresio, & effractio, Arabicē antiq̃a, Latine rima seu fractio. Verum si in rima exterior lamina cranei tantū, aut interior, vel utraq; dum secunda lamina à prima hiat, iuxta medium meningis cōprimens, egisoma appellatur, à Latinis diffractio dicitur, seu separatio. Ad rimam autem reducitur alia fracturę fors, quę fit cum ex ictu vehemēti, à telo etiam gravi & obruso ossa calvarię proprijs suturis

Li. 6. met.
c. 6. & 9.

Institutionum Chirurgicarum

futuris disiunguntur, aut frustratim diuisa inuicem cōpinguntur, quo cavitates & sinus inæquales apparent, quæ vocatur à Græcis, camarosis, ab Arabibus curamotos, & à Latinis cameratio & abscissio, cuius Hipp. non meminit.

Tertia fracturæ species eleuatio dicta, etiam in plures alias diffecatur: nam telum secans vel cranei superficiem signat, frustrulum ossis diuidens, quod vndique eleuatur, & recedit à proprio loco: quæ fractura Græcè appellatur aposceparnismos Arabicè, alberia, Latine rimularis fractura. Aliter fit dū à telo ossis superficies exciditur, non tamen vndique separatur, sed alicui parti adhæret, Græcè dicta encope, Arabicè, angin, Latine eleuatio. Tercio fit cum profundius telum imprimitur, & os sic eleuatur, vt membrana cerebri pateat, Græcè aposceparnismos, etiam nūcupata ab Albucasi alcialsis, Latine verò comminutio nuncupata.

Quarta fracturæ species collisio dicta, quæ ferè sensui lateret, etiam sibi proprias fortitur diuisiones: quarum prima os habet inflexum, sed non disruptū, cum nulla appareat continui solutio, sed solum cōpressionē facta à corpore contūdente, vt mollibus contingit ossibus: quod Gal. his verbis docuerat. Collisio magna ex parte accidit in carne, quanquā mosse euenire nonnunquā videtur, idq; maxime in pueris, siquidem oportet, quod in sese cogatur omnino id quod colliditur, atque ita sit molle, vt absolutam duritiem non assequatur. Similem quandam imaginem huiusmodi collisionis vasa ænea aut plūbea referunt, dum à solidiori corpore violētia quadam impinguntur: nam absq; fractura cōtusa pars discedit, ibiq; cavitās quēdam percipitur: qui fracturæ modus Tlasma à Græcis dicitur, & ab Arabibus

Libr. 2. de
cau. mor.
cap. vlt.

bus alcafar, Latine collisio, impulsio & inflexio: hæc autem fracturæ specimen non representat, sed in sui ipsius natura remanet os. Secunda differentia huius speciei, dum vnâ cum collisione fissuræ seu rimæ conspicuæ cognoscuntur, appellatur Græcè entlasia, Arabicè hesema, Latine infractio, & pro maiori aut minori ossis parte deorsum aut in superficie prolapsa varias sortitur species. Vltima autem collisionis differentia fit, cum superior lamina sine fractura comprimitur, inferiore manifestam fracturam patiente: nomine autem caret, solum compositam fracturam licet nuncupare.

Quinta & vltima fracturæ species est, quam oppositionis appellant Chirurgi & Græci apochema, calamitosa quidem & lethalis, cū caluaria violenter percutitur, & alia parte aut opposita rumpitur cranium, & ibi rima tantum adest, & non sedes, aut cōtusio: vt expressis verbis dixerat Hipp. Frangitur, inquit, caluaria sub vulnere alia parte, quàm vbi pla-
ga est. Sed vt cōtrouersiam de hac re diu discepta-
tam apud authores diluamus, statuendum est, posse alia parte à vulnerata cranium lēdi, vt Hipp. & multorum est sententia: cæterum in caluaria, quæ futuram habet, credendum est, difficulter fieri posse: facile verò in futuris, quæ è contrario latere aut proximè sunt, nam facile dehiscunt, ac forsan in separatione serratos dentes & eminentias illas frangi: quo facile per fibras quib9 futuris alligatur dura mater diruptas, in cerebri mēbris colligitur aliquid, quod in pus aut corruptelam versum mortem inopinatò accersit: & hac via censeo posse fieri dāna, quæ authores reppererunt, in his qui ex huiusmodi vulnerib9 perierūt. Quibus omnibus fracturæ for-
tibus accedit alia, perforatio dicta, à telo acuto & oblon-

Li. de cal
ua. cura.

Institutionum Chirurgicarum

oblōgo inflicta. Atq; hæ sunt caluariæ fracturarū species, quæ potissimum speculatione dignæ existunt. Præter quas à recentioribus alię plures reperiuntur, à telo incidente, & à corpore suscipiente, formā capientes, vnde breues, longę, rectę, oblique, angustę, latę, orbiculares & alię huius conditionis non pauçę, quarum cuilibet contusionem adiungi affirmat Hipp.

Nec parui momenti est nosse telorum differentiationem, quibus caput vulneratum fuerit: sæpe enim & percurrente, & telo innotescit, qđ in vulnere occultum latiter Hipp. enim statuit tellū illud esse quo alter alterum vulnerat: in telo inquit considerantur pondus, prout graue aut leue est: figura, quatenus latum aut angustum videtur: à lato aut alterius figurę fit collisio, aut fractura: ab angusto inscissio aut punctura: frangit etiā casus ab alto. Sic Gal. de his sermonem habens ait, quod vulnera fracturęve omnes, inscissione, cōtusione, fractione, erosione, & tēsiōne pueniūt. Incindūt quippe arma quę acutę sunt aciei, vt ensis & gladius: cōtundit graue omne & purum, atque hæc tanto grauius, quanto vehementius irruunt.

Li. de off.
fi. Med.

Li. de cau.
mor. in fi.
Li. ar. mc.
c. 80.
Cómēt. in
3. de off.
med.

Signa.

Dictum est à principio huius institutionis, tria in capite præter carnem & cutem posse vulnerari, os, membranas, & medullarem substantiam. Quo fit, vt necessum sit vtriūq; partis læsiones docere cognoscere, explicantes cuiusque signi vim & efficaciam, ad ostendendam tum caluarię, tum membranarum aut cerebri ipsius læsionem. Cognoscimus autem capitis læsionem ex vulnere, tum sensibus, tum pathognomonicis signis, tum etiam indicijs aliquibus coniecturalibus. Sic cranei fractu-

ram,

ram aliquando qualis & quanta sit, visu cōperimus: quòd si delitescat, digitis optime exploratur: ac si id non suffecerit, specillo facilius innoscet.

Quòd si his omnibus tentatis cognosci non possit, ad accidentia vulnerum confugies: quippe hæc ut pathognomonica & propria specialius cuiusque partis damnum monstrabunt. Nam quædam crassam tunicam ab osse diuissam esse ostendunt: quædam sanguinem aut pus, aut ixorem, aut humiditatem reconditam declarant: quædam cerebri intemperiem, aut ipsum esse dissectum, vel vehementer contusum monstrant: quorum omnium ut certior fiat Chirurgus, primo ad laborantem accessu inquirat diligenter, quali telo sauciatus fuerit, si vehementer, si ex sublimi loco ceciderit, si in lapidem aut rem duram impegerit, aut à re tali ictum acceperit: à lapide proiecto, vel à telo in manu.

Insuper an accepto vulnere confestim procidat homo: quia lætiam fuisse animalem potentiam intus ostendit, & motiua instrumenta per consensum à cerebro læsa: sic vomitus biliosus permanens, fractam calvariā, & facultatem etiam intus lædī, & compati ventriculum designat, ut docuerat Hippocrates statuens quibus cerebrum dissectum fuerit, his febrem & bilis vomitum accidere.

Libr. i. de morbo.

Li. de coactis.

Pari ratione si vertigine corripiatur, anteriorem cerebri partem lædī ostendit Galenus. 3. de locis affectis. 4. acut. comment. 38. 4. aphorismi. 7. Similiter si ab ictu obsecratio succrescat: nam præter fractam calvariā, internam cerebri partē lætiam esse monstratur, si quidem ab ea nervi visceris, qui ad oculos compatiuntur, originem trahunt.

Li. de locis in hom.

Lib. 5. aphor. 50.

Cels. li. 5. Galen. 4.

de mor. & sym. ca. 7.

Longè

Institutionum Chirurgicalium

Longè maiori euidentia monstrat prædictam læsionem sanguinis fluxus ex naribus, ore aut auribus: quia membranarum aliquam, aut venarum quæ in ipsis sunt, disruptionem monstrat.

Verum si laborans obmutescat, cerebri vehementer concussionem, ac ex consequenti graue damnum ostendere statuit Hip. quam sanè concussionem vehementem raro sine damno alicuius partis cerebri adesse, euidētissimum est, cum vocalia instrumenta ex cerebro oriantur.

Lib. i. de
morn.
Li. 7. aph.
52.

Quod si dentium stridor adfuerit, cerebri tunicas noxam recepisse manifestè constabit: si tamen cum hoc stupidus laborans videatur, tunc quidem inquit Hipp. in capitis ictu, stupescētia malum.

Li. 7. aph.
54.

Quibusdam etiam stupor aduenit, musculis temporum affectis, & ex compressione fractæ caluariæ, vel punctura nonnunquam prodit.

Rigor etiam superuenire solet, & inordinatè, ac circa iudicatorios dies elucescere, qui noxam cerebro illatam ex vulnere cum fracto osse cōmostrat, quod natura acri humore laceffita nocuū expellere conetur: sed cauere oportet, ne rigores à corporis vitio succrescant, nam parum mali eo tempore ostēdunt, sicut plurimum craneo fracto.

Aduenit etiam febris continua, quæ si non à primo die inuaserit, ingentis mali præludium existit: nam euidentis signum est, ex materia sub craneo putrescente, vel inflammatione aliqua inchoante suboriri. Quod docuisse Hippoc. constat, nam perniciofa indicatur si decretorijs diebus appareat, vel ultra tempus inflammationis perduret, aut leui vulnere superuenerit, vel delirium commouerit, aut si nervorum rigor vel distensio, quæ ex vulnere orta est, eam non sinit. Ob id enim dixit Auic. Si in

Lib. de iu
diciis.
Li. de coa
cis præ.
Li. 4. aph.
58.

capitis

capitis dolore & ictu febris accenditur, & mentis perturbatio adest, caput inflammari manifestum est.

Quod si paralyfis accesserit, mox ab inflicto vulnere, cranei fracturam & cerebri ab osse compressionem ostendit: sicut dum postea procedente malo suboritur, indicium est inflammationis cerebri, aut obstructionis viarum ab humiditatibus illabentibus in neruorum exitus.

Si tamen apoplexia ex vulnere fiat, signum est, craneum con fractum esse, & cerebrum punctione aut vehementi compressione adeo affici, vt ventriculi eius laedantur. Certiores tamen reddimur de huiusmodi damno, si osse comprimente eleuato, eger respirare coeperit, & a noxa liberari: constabit ex laesione caluariae fieri, si febrem sibi habeat comitem. Epilepsia vero etsi raro vulneribus capitis succrescat, aliquando tamen meninges laesas esse ab ixore mordente demonstrat, in qua maior est motus conuulsui prouentus quam oblaesio sensuum.

Accedit vulnerato capiti conuulsio mille modis, omnibus tamen lethaliter, vt Hippoc. profert: quippe euidentissimum est cranei fracti indicium, & ex fractura laesarum membranarum ab inflammatione, si processu temporis succrescat, & a punctione & mordicatione ossis fracti, si mox ab inflicto vulnere. Sic pro ratione partis in caluaria affectae conuulsio suboritur: nam aliquando faciei altera aut vtraque pars conuellitur, vt in spasmo citnico.

Item oculi immobiles fiunt, & strabosi redduntur, aut quaeuis alia pars vulneratae parti opposita, vt cum vulnus dextra parte infedit, sinistra con-

L

uellis-

Lib. 5. a-
pho. 1.
Lib. 7. de
coa.

Institutionum Chirurgicalium.

uēllitur, aut ē contra: vel si in medio capitis vūlnū
insit, vtrūque latus conuelli conspiciamus.

Li. 7. aph.
24.

Li. 7. aph.
24.

Desipere capite vulneratos damnauerat Hipp.
dicens: In capitis ictu desipientiā quādoq; occurre
re, & malum esse. Pari ratione idē author dixerat, in
ossis præensione stupor aut desipientia, si in vacuū
apprehenderit, in osse præsertim præciso, quod in
capite est: non simpliciter tamen, neque vtrūque
hoc contingit, sed vsq; ad interiorem superficiem,
quam locus continet vacuus, in quo cerebrum con
feruatur, desipientia fit, siquidem passio iam mem
branis & cerebro proxima existit: cumq; igitur à
principio accepto vulnere desipientiæ fiunt, in an
capite se habēt. Quod si transacta quarta, aut septi
ma, aut decimaquarta apparuerit, in cerebro iam fa
ctam, aut fieri inflammationem.

Præterea somnia atq; vigiliarū excessus, si post
capitis ictum succrescat, inflammationem, aut irri
gationem cerebri monstrat, vigiliae ex caloris impe
rio, ac si dormitet laborans ignea phantasmata oc
currunt, facile expergiscuntur, clamant, delirant,
& capiti saepe manum admonent, & oculi sponte la
crymantur, & circa sensus tenebrae, aut accensae vi
siones apparent, aut sonorum non existentium au
ditus, quæ anteriorem cerebri partem laesam osten
dunt. Adest & delatio in somnum, vel ex irrigatio
ne frigidi succi, aut si mox ab illato vulnere sub
oriat, cum detentione subita animæ & corporis,
compressionem venarum cerebri à fracto cra
neo, vel nimiam sanguinis frigidi prolapsionem in
prædictos ventres.

Adest etiam aliud non minoris momenti signū,
dolor nimirum ingens, indicium quidem separa
tionis

tionis membrane ab offe: quo tempore colore inficitur cineritio aut liuido, & substantia fit aucta ob venarum, quibus alitur, scissionem, necno. & aliarum e medullis. Quo tempore dolores in sincipite & occipite adeo sunt vehementes, ut saepe laboras manum ad mouere capiti cogatur. Ad sunt & rigores quam plurimi: pulsus cerebro affecto vndosus: membrana laesa, ferrinus, aut conuulsionibus interceptus: oculi inflammantur tanquam si lippitudine laborassent.

Quibus iam apparentibus nulla prorsus in vulnere sanies generatur, sed veluti salutu apparet, aut caro ipsius ab offe discedit, vel laxatur, & subsidet. Nam ob id dixit Hipp. si in vulneribus prauis, & foris
bus tumor non appareat, ingens erit malum: quod
his verbis dixerat idem author. Si post febrem
vulnus colorem amittit, & pauca ex ipso effluxerit
rit sanies, & ger moriturus est, dum siccitas ab externa
terna causa non prodeat. Quod nosces, quia praua
accidentia protinus sequuntur, si ab intrinseco
vicio prodeat praedicta siccitas. Quae sane signa
pariter quandoque simul omnia apparent, interdum
vnum aut duo aut plura, aut nullum, & cum hoc
eger moritur, quia in leuibus & comenendis vulneribus
sepe cerebri commotio, quae multos reddit sic
affectos, grauissimum accersit malum: nonnumquam
transcolatio humiditatum, quae fit per fururas,
ipsis praestus vehementia de hiscentibus: tamen
haec mala non nisi transacta vndecima die succrescere
assolent, aut parum ante, cum antea leuissimum
apparuisse vulnus.

Li. 2. pop.
Li. 5. aph.
66, 67.
Li. de coar.
Li. 1. pro:
nost. 25.

Contu.

Ex capitis praestantia, dignitate & partium compositionum varietate & tenuitate substantiae, aut

tionis in
capite
curatione.

Institutionum Chirurgicalium

Lib. 2. de
frac. li. 4.
de mor.

sensibilitate prodit, nullum in eo vulnus contemne-
dum esse, quantumvis levis contusio sit: cuius pri-
mo loco institutum est agere. Est igitur æquimo-
ma, seu contusio, tumor tactu mollis, cedens, livi-
dus, & magna ex parte indolens. Qui sanè fit à gra-
ui quodam corpore obruso, & æquali, quod extrin-
secus caput percussit: contunduntur venæ exigue,
& diuortium patiuntur, sanguisq; cum tunicas ve-
narum transcolat^r, profunditur, cute externa inte-
gra manente. Cuius mali naturam expressit Galen.
atque etiam Hippoc. statuens partes contusas amit-
tere naturalem vnionem cum sanguinis profusio-
ne ad loca iuxta venas.

Contigit huiusmodi morbus in capite, vno è qua-
tuor modis: nimirum cum sola sit carnis contusio,
simplex & citra complexum alterius mal: secundo,
cum præter carnem contusam, etiam cutis discindi-
tur, & sit cum vulnere contusio: tertio, cum præter
externam contusionem, cerebrum intus quoque à
re contundente commouetur, & læditur: quarto ve-
ro, & ultimo, cum etiam cranium læditur, contu-
sumque, aut confractum efficitur. Quorum omniū
seorsum breuiter meminero, quo vtilior & clarior
fiat curationis institutio.

De sim-
plici cō-
tusione.
Li. 4. met
cap. 7.

Cum sanguinem contentum extra venas, in con-
tusione necessum sit putredine, aut alio vitio fœda-
ri, ni cito præueniatur, vt statuit Galen. Idcirco iux-
ta optimam rationem Medici, quamprimum studet
precauere scientes ægrè discuti posse, si iam in gru-
mos congerit, aut ad eandem partem alij humores
confluxerint. Quo studio primò diligenter cauent,
ne ad affectam partem, alienæ humiditates procum-
bant, tandem vt extra venas sanguinem profusum
dissipent, antequam ingruerit, & venas disruptas
compri-

comprimant, ac roborent. Quamobrem mox à principio ex Galen. & Auic. mente nonihil ex adstringentibus his, quæ dixerunt, admiscere oportet, donec Venarum tunica densationem adepta plus sanguinis non fundant: postea solis resoluentibus utendum. Sic primo mali accessu (si opus fuerit, sanguine misso) capiti derafo admouere oportet rosaceum omphacinum, aut ut Gal. placuit oxirrhodinum, aut rosaceum myrrino admixto, postea oui candidum aliquādiu agitatū, cum lini stupa exceptum, additis rosarum pulueribus: nam myrti puluis plus comprimit, quā in principio par sit, quinimò forsā sanguinem condensare est arbitrandum, adeo, ut resolutioni deinceps ineptior fiat. Sequenti die, nonnihil camemali adijcies, & si dolor creuerit, caput vniuersum rosaceo, ex olio maruro tepido bis ter in die inunges, & lanam eo imbutā appones. Quod si resolutioni magis inniti placuerit, puluerem addes ex rosīs, beronica, & calamento, & desuper lata splenia madefacta, & expressa, vino nigro decoctionis rosarum, beronica, & camemali apponantur. Præterea uteris emplastro confecto ex camemali, melilori, fursuris ana. p. j. farinæ fabarū & lupinorum ana. 3. j. pulueris myrti 3. s. cum sapa, litxio & oleo myrrino aut camemali fiat emplastrū. Quibus uteris, donec tumorem decreuisse comperris: & postmodum adhibebis vnguentum ex oleo anethino, camemelino & pulueribus, melilori & rosarum cum modico croco & cera, desuper linteolū duplicatū madefactū vino stiptico addito sale, & camemalq adhibebis. Confert & aqua vitæ, ac tandem superposito emplastro diapalma, aut oxicroceo, ad sanitatem perduces. Quod si contusio leuis sit, à quouis frigido superposito leuamē susce-

Li. 14. me
tho c. 3.
F n. 1. 3.
tra. c. 3. &
tra. 3. c. 3.

Li. 2. pha.
lee.

Institutionum Chirurgicalium

piat, siue lapis, siue ferrum sit, vel mica panis aqua frigida madefacta.

De contusione cum commotione cerebri. Verum si ex ictu vel casu, non solum contusio appareat, verum cerebri commotum, agitatum, & laesum fuisse confiterit, quod laborans obmutescat, & veluti catalepticus appareat: nam plerumque ex signis quæ cranium fractum ostendunt, pleraque solent succrescere: ob id maiori diligentia rem hanc tractare necessum erit: praesertim cum cerebri commotio plerumque fiat à grandiori casu ab alto, vel vehementi ictu, à quibus cranium aut futuras obladi non raro contingit, praesertim si his sanguis è naribus, ore aut auribus profiliat: indicium quidem disruptionis vasis alicuius membranarum. Postquam autem redierit laborans, licet vel mutus, vel omnino mente constans supersit, necessum est, dolorem, qui plerumque huic malo comes est, mitigare, caput roborare, & dilacerata vasa firmare & comprimere, & fluxum humiditatem aut saniem resolvere. Quibus consideratis, ne doloris inclementia humores ad caput euocentur, sanguis tunc mittendus est, quantum vires tulerint, non tamen confertim, sed per vices, quo magis fluxionem auerias. Victum praeterea tenuissimum institues, corpusque quieti mandabis in loco temperato & mediocriter lucido. Praeterea considerabis, caput omni arte esse roborandum firmandumque, & interim dolori providendum, & vltimò resolutioni humiditatum. Quibus visibus proficua sunt, quæ affectæ partis calorem innatum foveant: quem usum præstat lina dulci oleo calenti madica cum rosaceo, amygdalino, aut myrrino, camemelino, aut lilaceo.

liaceo & albumine oui. Leuato namque dolore, aut tertio die, hoc vtêris emplastro, quod recipit farina fabarum, pulueris rosarum, absynthij, myrtillorum, camemali, meliloti & sthœcados, ana partes æquales, albuminis ouorum, quod satis, vt cum oleo rosarum & camemali fiat emplastrum, addito modico vino. Quod si sufficere non videatur, discursionem valentiùs aggredi opus erit, ne quod in tumore relinquitur, suppurationem experiatur. Nec displicet cerato ex oleo Aparici confecto, vniuersum caput circumdare, aut ipso oleo fouere. Cui vsui probatum est quod recipit absynthij. m. ij. rosarum rub. florum camemali, betonicæ & sthœcados, ana. p. j. bulliant in vino rubro, postea contundito, & addito farinae hordei & fabarum, ana. ℥. iij. cimini. ℥. s. rosacei quod satis pro cataplasmate. Verùm si his exhibitis, tumorem nihil minui comperiamus, & molitiem, vel seruauerit, vel denno contraxerit, verendum est ne in pus mutetur quod ibidem contentum est: quo tẽpore ne intrus aliquid permeet, quãtissimè in suppurationem & apertionem ducere opus erit. Tunc enim vtêris (post fortũ olei dulcis in quo ferbuerit althææ radix) triapharmaco, quo mirum in modum id opus consequêris, aut alio ex emplastris suppurationi idoneis, cum critica farina, virellis ouorum & croco. Dissecto abicessu & extracto pure, vlcus curabis digerendo, quousque opus fuerit, & postea his quę abstergendi & exsiccandi vires habent, donec caro nouiter supererescat. Quod si cum vulnere accidar contusio absq; caluarie nocumento, cõtraria prorsus inethodo vrendum est: nam contusionibus adstringentia & resoluentia pharmaca satis sunt: at in vulnere

De vulnere caluarie cõpitis cõtuso.

Institutionum Chirurgicarum

contuso (quod calore destituatur pars, longè ma-
 gis, quàm in sola contusione, ubi integra manet cu-
 tis) suppurantia pharmaca mox à principio adhibe-
 re conuenit: nam ob id carnes contusas, in pus ne-
 cessariò mutari dixerat Hippocrat. Quo fit, vt si te-
 lo obruso, graui & inæquali, cutem, panniculum,
 & carnosam substantiam abrumpi contingat, cum
 partium contusione, craneo integro manente, mox
 vt ægrotantem adieris, si quid præter naturam in
 vulnere contineatur, protinus auferes, & si sinuo-
 sum sit vulnus, quo medicamenta omnes partes nõ
 attingant, si aliter fieri non possit, dilatare opor-
 tet, & minimè lichinis formare, aut quàm paucissi-
 mum, sed abluere vino, & coniungere quantũ pos-
 sibile fuerit, & abrasis capillis per vulneris ambitũ,
 si sanguis immodicè fluat, puluisculis præpedita-
 tur, aut siccis filamentis, vel oui candido. Et præ-
 missa euacuatione per sanguinis missionem, & par-
 ca ac refrigerante victus institutione præstita, ten-
 tatis omnibus distractionibus, exterius, doloris gra-
 tia partē vulneratā, & cōrūsam, rosaceo aut myrri-
 no oleo inūges, & intus ea admouebis quæ pus mo-
 uent, digestiua communiter dicta, donec sympto-
 matum præterierit suspicio. Studendum quidē est
 in huiusmodi contusionibus, quàm celerrimè con-
 tusas carnes, & sanguinem in pus vertere: minus
 namque phlegmone tentabitur vulnus, & ex seda-
 tione doloris robur parti addetur, fluxionesq; pro-
 hibentur: cauentes ne vlcus, aut aeris frigidi con-
 tractu, aut frigidis medicamentis recrudescat: quod
 maioris mali solet esse causa, vt ex Hippoc. constat.
 Nam minimè ad cicatricem vulnera duces, nisi me-
 dia coctione, vt ex eodem auctore & Gal. euiden-
 ter constat. Hoc itaque diligenter seruabis, vt con-
 tusum

Li. de vl-
 ceri.
 Li. de cal-
 cur.

tatum vulnūs prius coctionem experiatur, deinde non dolorosam absterfionem, alioqui plus attrahes ad vulneratam partem, postea nouæ carnis productionem ac cicatricem induces. Itaque per initia solo rosaceo vtêris, vel cum luteo oui, in mollioribus corporibus, in alijs verò, terebinthinam & oui luteum adhibebis, aut triapharmaco vtêris, nisi in inflammationis suspicio sit. Quòd si hæc non profuerint, pbatissimū est id quòd recipit olei rosacei & terebinthine, ana. ℥. iij. cere. ℥. j. croci, scrup. s. quòd si inflammationis suspicio sit, abluatur terebinthina, aqua betonicæ, & addatur farinæ hordei, ℥. j. Verum si carnis productum efficere velis, addes ʒ. ij. puluerum corticum thuris, & ʒ. j. aloës: postea super torum vulnus cataplasma appones, quod roborandi caput vires habeat, necnon & digerendi, ob pituitæ & humiditatis copiam, quæ in contusis sæpissimè accrescunt ad œdematis modum, quem admodum in curatione contusionis dictū est. Hoc tamen vnum animaduersione dignum iudicauī, eo quòd dictum sit suppurationis & humidis esse vrendum, id quidem cautè esse agendum, in contusionibus temporum & tendonum: nam sæpe grauiora mala & corruptiones succrescere assolent, & ob id pure expurgato, siccioribus vrèdum: nec displicet oleum A paricij.

Qualiter autem cognoscere & curare liceat vulnus contusum, cum cranei contusione aut subintra-
sione, tactu, & præscriptis accidentibus facile venaberis: quo tempore coniectandum est & discernendum, an hæc cranei contusio sit cū vlcere, aut citra ipsum, vel adeò magna sit cranei subintra-
& fractura, quòd mēbranas dirumpat, aut utcumq, aliter lædatur: quo tempore aperta contusione vul-

*De cōtū
sione cū
subintra
tione
cranei.*

Institutionum Chirurgicarum

nus curari, multi ex nostri, temporis Chirurgi cōsultunt: quod profectò formidādū erit: nā vbi vulnē rata caro nō est, fidere oportet, ac sperare plus effecturā quouis auxilio naturā, quā carne dirupta & ossibus perforatis, vbi longē minus potēs est, quā carne & cute protecta: & ob id sciendum est, contusionem cum cranei subintratione sine vlcere, primò desiderare cranei eleuationem, tum per capillorum euulsionem: nam cucurbitulam, licet multi consulant, formidare oportet, quia citius ad partē euocātur lēsi humores, quā eleuctur cranium: tum verò per ea medicamenta quę siccet, roborēt calfaciāt quę caput, qualia veteres illi cōmendarūt, solum Apaticij oleo liquatū isis, aut gummi elemi emplastrū, & capiti vniuerso appositam, subius facta ipsius oleiunctione. Quod si vel inflāmatio tentauerit caput, aut leniori velis vti curatione, fat erit, sanguine misso, capiti adhibere cataplasma temperans ex pulueribus rosarum, camemali, meliori & croci, cum oleo rosaceo & oui albumine & vitello, donec tumor subsideat: postea verò adhibere oportet emplastrum ex fermento, terebinthina & furfure aut ex melle, sulphure, & furfure, sale & puluere absynthij: vel vnguentum ex gummi elemi. Quod si hæc non profuerint, & accidia non supercrescant, satius erit (præsertim in capitis puerorum, & corporum mollium) os sic relinquere, quā cutem inscindere, & auxilia tentare, quæ maius damnum sunt allatura: curis enim, vtpote naturale tegumentum, incredibilis est efficaciz & vtilitatis. Verū si cum vlcere fuerit subintratio cranei, tunc quidem facta dilatactione sufficienti, & præmissa sanguinis euacuatione, & lenitione ventris, ac omni diuersionis

fionis genere, rem ages, velut cū craneum fractum existit, si accidentia præsunt, aut verearis: sin aliter, vnguento vtrius ex gummi elemi appposito, & supra vniuersum caput emplastro, quod recipit vini nigri. ℞. xvj. olei absynthij & camemali ana. ℞. j. mellis communis. ℞. ij pulueris rosarum, camemali, meliloti & furfurum torrefactorum ana. p. j. fiat emplastrum, additis duobus ouorum vitellis, & postea vt par est, vlcus curerur.

Verū si capitis vulnus simplex sit, cura vltam cranei lationem, neque ad ipsum telum percurrerit, tunc quidem mens erit, futura vulneris labra vnire, si in lateribus capitis fuerit, & in infima eius parte foramen relinquere, per quod penicillo appposito pus expiret: tandem in reliquis, vt vulnus simplex curari debet. Secus res se habet, si in summo capitis vulnus sit: non quidem elichinis efformare vulnus oportebit, vt indocti homines perperam & preter artis rationem faciant: nam vbi sanguis non fluit, aut abradi debet vulnus, abluere calido vino, & exsiccantibus curare, longe tutius est, quā paruū vulnus longē maius efficere quā telum. Quo tempore terbinthina cum oleo Aparicij vtrius, aut balsamo, vel vnguento Isis, donec necessum sit carnis generationi providere. Quod si vulnus etiā in summo capitis sit, & ex casu cutis plurimū sit disrupta, tunc quidē licet in summo sit, nō erit ab re cōseruatiua futura vnire, relicto foramine ad puris expurgationē. Quā sanē curatione, licet craneū detectū sit (si nullum præsit lationis vestigium) satius erit manus continere, quā leui timore cōtusionis cranei ipsum abraderē (licet id consuluerit Hippoc.)

quo

De sim-
plici ca-
pitis vul-
nere.

Institutionum Chirurgicalium

quo & vulnus maius fit, & ob id periculosius: sicca enim medicamenta maioris sunt efficacie, & valentia extrahunt illam sanguinem in contrusione conterere, iuvante cutis mediocri tegumēto. Nam ob id censeo plurimos perijisse, quia fidunt Chirur- gi magis abrasioni cum blandioribus medicamen- tis quam siccis citra abrasionem.

*De capi-
tis vul-
nere. cū
cranei
fractu-
ra.*

In nulla alia vulnerum aut ulcerum curatione, quod ego legerim, maior usquam suborta fuit con- trouersia, tum inter veteres illos sapientissimos, pri- mos artis professores: tum inter neotericos, & no- stri temporis Chirur- gos, quā in his capitis vul- neribus, quæ os fractum sortiuntur. Nam extant ex altera parte, Asiatici Medici, vt de Megere Sido- nio, & Eudemo retulit Galen. quibus solum mens erat siccis medicamentis prædicta vulnera curare à principio usque ad cicatricis obductionem: susci- pientes principium huius præcepti ab Hippoc. qui primus omnium ulcera nulla madefacere instituit, & omnia siccis esse curanda, eo quod verissimum sit, siccum sano esse simile. Id quod profectō maxi- mē erat necessariū in capitis vulneribus: tum quia ulcera, humiditatibus extraneis ex propria condi- tione abundant, quibus si medicamenta addas hu- mida, necessum est maiorem succrescere, & ad pu- tredinem subiectas partes deducere: tum verō ra- tione ossæ naturæ, qua caput maiori ex parte con- stituitur. Cui doctrinæ adstri- pularur Galen. sta- tuens in omnibus & in prædictis maximē, vidēdum esse eis, ac siccioribus vbi os fractum fuerit, sumēs pro exemplo vnguentum isis, barbarum, aut viride, & huius census alia. Quod sanē dogma, adeo reli- giosē & obseruauer & citra vllam distinctionem nostri temporis Empirici, & Chirur- gorum aliqui ob-

Lib. 2. per
locos. c. 1
Li. 5. per
ge. c. 14.
Lib. 6. me-
th. c. 2
Li. 4. me-
th. c. 5.

obferuant, vt neque alijs medicamentis, neque vlla
manus actione, aut oſium fractorum prouidentia,
extractione, abrafione, aut perforatione, quantum
uis membranas oblaedant, pungant aut dirumpant,
vtantur, ſed ſolùm exſiccantium, reſoluentium &
corroborantium efficaciam fidentes arbitrantur,
non ſolùm vanam & crudelem, ſed & pernicioſam
quoque eſſe reliquã curandi viam, ſiue blandis fiat
medicamentis, ſiue manus opera, maximè cum expe-
rimentis non paucis confirmauerint ſui dogmatis
veritatem & vtilitatem. Reliquam verò partem
tuentur Hippocrat. vt primus author, & Galen. lo-
cis citatis, necnon & Auicenn. Celfus, Paulus, &
alii ſapientes Medici, atque etiam noſtri temporis
Chirurgi, ſtatuentes fracta, collifa, & vt cunq̃e fo-
luta oſſa eſſe vel abradenda, vel euellenda, perfo-
randa, complanandamq̃e ſuperficiem, & poſtea
verentes inflammationem, humidis & blãdioribus
medicamentis, ac forſan minus ſiccis, quàm oſium
natura expoſtulet, vlcus curant omnes, excepto Hip-
pocrat. Probant hi authores rationem ſui dogma-
tis, quòd periculolum arbitrentur expectare vulne-
ris conſolidationem & curationem, donec oſſa fra-
cta coaleſcant, & poro ſeu callo medio iungantur,
quin antea ſucci & carnes vlceris lethali vitio cor-
ripiantur, vt frequentiſſimo euentu compertũ eſt
in his, in quibus citra vllam ferramentorum opus
tentarunt vulnus curare: quippe à ſeptimo die
plerunq̃e lethalia accidentia ſuccreſcunt, ob ad-
ductam rationem, adeò graua, quòd licet poſtea
craneum perforare aut abraderẽ tenes, nil pro-
ficere conſtet. Quo euentu moniti Chirurgorum
noſtri temporis terè omnes, mox à principio
ad cranci abrafionem confugerunt, vt ſeparata

Libr. de
vul. ca.
Lib. 2. de
frac. 57
eadẽ pa.
48.

parte

Institutionum Chirurgicarum

parte solura ossis, quàm citissimè exeat, quòd decidit intra cauitatem aut in osse est contusum, & caro ossi sano adhæreat, & vulnus pristinae sanitati restituitur. Hanc sane legem statuit Hippoc. hanc sequutus est Gal. dum apud Romanos Chirurgiam facitasset: & hos sapientissimos viros sequuti sunt alij, in re Chirurga illustres viri, Hispaniam degentes, cum euentu felici & plurimis exemplis probato. Hoc tamen contra Hipp. mètem esse arbitror, nimirum siue os abradatur, siue secus, semper vsos fuisse blandioribus & humidis medicamentis, vt de se Gal. refert cùm in Romam ab Asia rediisset, què sequuntur (licet varij in hac re fuerint) Celsus, Paulus, & Aetius, & omnes nostræ ætatis Chirurgi.

Verùm si quis controuersiam hanc diligentius & penitus examinet, ratione sumpta ab ipsa rei natura, proculdubio reperiet, neutram harum factionum absolutè veram esse, neque ex omni parte ad mentem Hippocratis, & ex consequenti, nulla ratione (vt iacet) exequendam fore. Censeo quidem primos decepisse alteram partem sui dogmatis, verissimam quidem, cæterum diminutam ac sæpius insufficièntem, credentes sicca medicamenta sufficere indistinctè, & indiscriminatim (vt ipsi arbitrantur) caulariæ quamuis fracturam reficere, & vlcus curare, citra vllam aliam ossium fracturæ prouidentiam, & quod deterius est, arbitantes, hanc esse mentem Hippocratis & veterum omnium, quorum fuit institutio & præceptum, sicciorum medicamentorum, quasi ipsi negauerint manualem operationem, & ossium abrasionem, quoniam nihil est apud Hippocratem, & Gal. ac reliquos viros strenuos vulgarius. Commendarunt quidem
sicca

ficca medicamenta, cæterum non negarunt ferramentorum vsum, vbi opus esset. Quippe nullis ossium tracturis ferrum adhibere, nouum profectò est: omnibus tamen cranes solutionibus subuenire abrasione aut perforatione vel ferramentorum opore, antiquum & Hippocraticum nõ est: hoc quidem virtio vertèdum est. Chirurgis nostri tẽporis: illud verò Empiricis, & alijs qui se nouæ ac particularis curandi rationis institutores venditant. Sic nostri temporis Chirurghi decepit Gal. qui Romanam Chirurghiam sequutus, quanquam siccis medicamentis plures in Asia viderit sanitati restitutos, quàm humidis, illis relictis, Romano more vtēs, humidis vti mille in locis probauit, præcauendæ inflammationis gratia, vt de rosaceo, farina triticea, & hordeacea, ac de alijs huiusmodi refert. Atque hæ sunt vtriusque factionis rationes.

Nos quidem post plurimos vtriusque dogmatis euentus, præhabita etiam maturiori consideratione, & præhabitis sapientissimorum in re Chirurga virorum consultationibus, arbitramur, vtriusque opinionis (quarum quælibet duabus constat partibus) alteram partem tantum esse veram, & ex vtraque parte vera constitui genuinam & verã Hipp. mentẽ & in hac re doctrinã. Sic Megetis & Posidonij sententia, qua tenent, in capitis vulneribus siccis medicamentis esse vtendum, tanquam verissimam arbitror, vt quæ primum authorem habuit Hippocratem. Quatenus verò, non proferunt, ossa esse abradenda, aut aliter ferramentis tractanda, id rejiciendum fore arbitror, tanquam omni ex parte doctrinæ Hippocratis aduersum, & ex opposito contrarium: necnon & Galeni, Pauli, Celsi,

Celsi, & Auicennæ, quantumvis qui hodierna die hanc factionem tuentur, huiusmodi authores in sui patrocinium aduocent, quatenus ad hanc partem attinet, imponētes profectò illis suum figmentum. Pari prorsus ratione censemus alterius dogmatis primam partem, quæ statuit ossa esse abradenda, verissimam securioremq; esse, & quæ (sicut probatum est) ad mentem Hipp. & reliquorum virorū ac Chirurgorum nostri temporis felicissimis exemplis confirmata est. Arbitramur tamen reliquam eiusdē factionis partem esse à ratione & Hipp. mente alienam, ut quæ blandis & humidis medicamentis huiusmodi vulnera esse curanda statuat, cum vulneribus, maximè capitis, nocua existat.

Quibus sic constitutis, constat vulnere capitis curationem, non omnibus ossium fracturis, per vulneris dilatationem & formationem, ac eorum abrasionem, aut extractionem exercendam fore, neq; omnibus denegandam esse manuum ac ferramentorum operationem. Cæterum utcumq; sit, siue ossa abraferis aut perforaueris, siue nihil horum feceris, semper siccis medicamentis utendum est à principio ad cicatricem, blandis & humidis nequaquam: nisi inflammatio vlcere, aut membranarum, vel quoduis aliud accidens tantisper eis uti consuluerit, aut alijs admiscere: quod si incautè & diutius fiat, longè grauius erit, quo magis os perforaueris, ac sine perforatione non tutum.

Ad instituendam veram, genuinam & legitimam curationem horum vulnerum, quæ cum cranei fractura sunt, quatuor consideranda se se nobis offerunt: primum, quæ vulnera dilatare oporteat: secundum, quæ formare, aut quæ secus: tertium, quam ossiū fracturam liceat abradere, perforare, aut quæ ossa euellere,

ouellere, quæ verò minimè: vltimò verò qualia de
beant esse medicamēta omnibus proficua, & an sint
alicui aliqua peculiaria. Circa primum statuen-
dum est, id vlcus dilatandū fore, cuius ossa abradere, aut
perforare, vel extrahere citra dilationem commo-
dè fieri nequeat: nam cū aliquod ex prædictis ope-
ribus citra maiorem scissuram fieri possit, id quidē
eligendum summoperè erit tanquam tutius: nā sæ-
pius nouacula maiū lethalius, quā telum percutiens
effecit. Præterea dilatare oportet sinuosum vulnus,
quo facilius medicamentum omnes partes perua-
dat, nisi commodam nactum fuerit expurgationi fi-
guram: rotundum autē vlcus non id necessariò ex-
postulat, licet vile aliquando sit. Circa secundū tu-
torem curationem vulnere capitis arbitramur, so-
lū ea elichinis formare, quibus os abradi neces-
sum est, & quibus sanguinis profusio adiungitur.
Quamobrem laudare non possum quorundā Chi-
rurgorum cōsuetudinē, qui nullum capitis vulnus
citra dilationē curare sciunt, efficientes in mem-
branæ & carnis separatione à craneo longè maius
damnū, quā telū, cū sola exsiccatione & vnione tu-
tiū & citiū ac iocūdiū curassēt, quā facta frustra
& inutiliter scissura & formatione, quo difficiliū
deinceps vulnus curatur. Tertium quod proposui-
mus ad legitimam horum vulnere curationē esse
necessarium scitu (ac forsan si à recto discesseris,
periculosius) est, quæ ossa ex fractis necessariò abra-
sionē, & quæ perforationē aut auulsionem expostu-
lent, ita ut citra id, longè periculosius euadat ma-
lum: & quæ licet fracta sint, maius & certius pericu-
lum minētur, si ferramenti vtaris, quā secus. Cui
vsi expendere oportet, quòd si ex vulneris signis,
ex vulnerantis vigore, ex teli acutie aut grauitate,

Institutionum Chirurgicalium.

& ex laborantis symptomatis, quæ mox à vulnere illato succrescunt, constiterit, lesum fuisse aliquo modo cranium, siue angusta fractura sit, siue sedes teli, aut cranei contusio, aut utcumque, vel in prima aut suprema cranei superficie, aut profundius in mediulio, vel in vitrea seu diploide appellata, maximè verendum est, ne temporis progressu, ignota scissuræ penetratione ad intima, perniciofa & difficulter reparabilia succrescant symptomata. Siquidem non raro disrumpuntur venulæ & arteriæ membranarum, & instillat sanguis, necnon ab ossis parte spongiosa, contusa aut discissa, quæ vel intra os putrescens, aut profundius supra cerebri membranas, vel ipsæ membranæ præ ictu dolentes & inflammatæ, aut malo suscepto per suturas cranei à pericraneo contuso, aut lesò, lethalia accersant accidentia, quibus nusquam subuenire possumus, etiam maiori diligentia eo tempore adhibita, quæ forsan non succrescunt, longè minori in principio præhabita, vel leui abrasione aut perforatione cranei. Verùm cum neque si id feceris tutius incedes: nam sæpissime ossæ abrado aut perforato à principio, eadem & forsan maiora ac certius, & accidentia & mortem succrescere comperimus, ex vulnere illato à telo, & eo quod melioris gratia Chirurgi manus fecere: ob id pròfecto diligenter disquirendum erit, quales calvariæ fracturæ, quæ vulnera feramentorū ope indigeant, quæ verò secus, ne duplex fiat vulnus & malum malo addamus sub specie curationis.

Cum potissimam abradendi ossa calvariæ fracturæ, etiam, necessitas sit, ut subsit aditus, succis qui intra calvariam transcolarunt (siquidem ut inquit Hipp.

Quod

Quod per angustum intrans, non autem exiens, affligit, & furere hominem facit) aut in cranei porroscitibus contusum est, antequam putrescat, & os purulentum fiat, membranasque vitiet ac cerebrum: ob id profecto sciendum est, ex fracturis quasdam esse, quas nec fermentis, neque quavis alia manus actione tractare citra maius & certius periculum possis: alias, quæ perforationem expostulant necessario: & nonnullas, quæ abrasionem quidem expostulant, perforationem autem minime: alias insuper quæ non id solum, sed & ossium avulsionem, separationem, aut elevationem requirunt necessario. Tunc sic statuendum est: quocumque tempore accidentia læsi cerebri appareant, monstrantia, vel aliquid cecidisse intus, vel intra calvariæ disruptum, aut in ipsa confractum, eo usque; caput abradere oportet, donec sufficiens aditus subsit his, quæ intus læsura sunt, aut iam lædunt. Quod sanè malum vereri oportet, si in calvariæ ossis, sutura, scissura aut contusio appareat, quæ interius permeare inveniatur abradendo, facta atramenti probatione: quo tempore penetrare ad meninges oportebit citra ullam dubitationem, alioqui vereri oportet ne membranas inflammatione aut corruptione lethale afficiat, exitum non habentes extranei succi. In quo sanè opere Hipp. ubi abrasio à vulneris principio facta sit, non permittit ad membranas usque perforare, sed parum ante subsistere (ne ferro abrasas, aut frigore diutius detectæ lædantur) id arbitratum naturam facile posse separare. Quam sententiam non semper exequenda arbitror: nam ubi aliquid prociidit in membranas, cuius occasione exitus queritur, caput abradere, & emissarium non efficere, irritum & inutile est. Quapropter, ubi post accidentium aduentum caput perforatur,

Li. de vul.
cap.

Institutionum Chirurgicarum

necessario aperienda caluaria est, quo pus expiret, nam tunc iam dura mater à craneo discessit: vbi vero constat aliquid prolapsum esse, & à principio abraditur, perforare oportet, sed nō eo die, quo fit ablatio, sed relicta tenuissima lamina, quæ facile commoueatur, subsistendum est. Secus tamen res se habet vbi internæ læsionis suspicio levis sit, licet fissura permeet, & parū adhuc confluxisse constet ex his signis quæ in vulnerando præcesserunt, aut adfuerunt: tunc quidem satius est ante integram perforationem & laminæ cōmotionem subsistere: nā sicca ebibentia, & resoluentia ac roborantia medicamenta sufficient profectō, reliquū discutere & extrahere. Quod si iuxta futuras vulnus fuerit illatum, ipsas abraderi nequaquā licet, sed à latere iuxta futuræ longitudinem vtrinque foramen excavare oportet: secus res se habet cū accidentia iam apparuerunt, & dura mater discessit à futuris putrefacta, & discissis filamentis.

Cæterum vbi ossa caluariæ fracta sunt, cōminuta, aut secus, ea tamen solutionis sorte, quod prædictis succis, qui vel delapsi sunt desuper, vel è venis membranarum aut cranei exsudarunt, pateat exitus, siue ossa dimota sint, siue nō sufficienter æqualiter sita, neque ferramentis tractare, mouere, abraderi aut aliter euertere, vlla ratione cōuenit: longè enim maius beneficiū susceperat, cute non admodū disrupta, ex ficcis & resoluentibus pharmacis, quàm ex fractorū ossium ablatione, aut separatione. Qui nimo ex hoc opere plurimū lædi naturam, & lethalius fieri vulnus est arbitrandū. Pari ratione vbi fractura, cuiusvis fortis sit, in capitis lateribus adfit, nullo modo ferramentis aut dilatazione vtiendum erit, sed futura aut vinculo & vniōne opus est, quātum

tum possibile sit, relicto purgationi emissario. Verum si telo acuto craneū pertorari cōtingat, vereri quoq; oportet ferramētōrū vsum: nam prāter id q̄ cōiectabile est, sufficiens foramē adesse, cauere oportet nouam & maiore capitis apertionem in huiusmodi vulneribus: quod si feceris, non errabis: nec si dimiseris, & siccis medicamētis vtaris, quia in extremitate parui foraminis externa foraminis superficie amplior est hiatus, quo facilius quā in alio vulnere sua medicamenta proficua sunt. Prātercā vbi solū craneum detectum denudatumq; est, protinus abradere suspēctione sola cōrusionis occultæ, periculo nō vacat: nam cū id opus adeo graue & timorofum sit, quantūuis id cōsulat Hip. aggredi solo timore percitus, vereri plurimū oportet. Sarius enim in hoc casu erit vti Celsi consilio, qui non solū in denudato craneo, sed in omni fracto osse emplastris & medicamentis exsiccantibus vtebatur: quod ego non cōsulerem in scissione aut fractura, libenter tamen in ossis denudatione: quippe tūc cauendum est à ferramentis & apertione ac dilatactione cutis & pericranei, sed protinus craneum cooperire & exsiccare pro naturæ modo oportebit. Pari prorsus ratione fugiendum est à ferramentorum vfu, vel vltiori apertione aut dilatactione, vbi percussio aut vulnus in vno est loco, & è regione in contrario suspicamur factam fuisse ossis cōmotionem, aut solutionem: quod difficillimum arbitror: sed lōgè difficilior & grauior est partē sanam, siue tumeat, siue secus, aut aperire, aut craneū ferramentis tērare. Maxime enim in hoc casu vtilitatis est, & ex necessitate naturę affectus prodit, siccātia & roborātia auxilia adhibere, & caput fouere omni arte.

Ceterum vbi solū teli sedes elucet, aut cōrussio

Institutionum Chirurgicarum

apparens, vel euidentibus coniecturis certa, abradendum quidem cranium est in fede teli donec solutionis vestigium delitescat, ibidemq; subsistendum, nec penetrandum ultra erit: nā id in huiusmodi vulneribus summē est grane & periculosum, sed mox ficcis vtendum medicamentis. At verò in contusione, abradendum quidem est, donec sanguis ab osse pullulet, subsistendumque dum ossis spongio sitatē complanaueris, & eo facto ficcis medicamentis vtēris.

Vltimò, si ossa adeò fracta sint, & à suis locis semota & euerfa, quòd vel membranas dirumpant, pungant, comprimant, ac dilacerent, ferendum nō est, quin protinus vel coequantur, & eleuata complanentur, ac si omnino excisa sint & separata quā lenissimē euellantur, ante quā membranas inflammarionem accersant. Quippe credibile non est posse naturam pati adeò molestam configurationem citra maximum damnum: præter id quòd sic oppressa nequibit ossa complanare suis, nec auxiliorum viribus citra manuum aut ferramentorum adminiculum, & ob id vel forcipe, vel eleuatorio instrumento, vel quouis alio idoneo, eo vsque dimouere ossa oportebit, donec membranæ à compressione, diruptione, punctioneque liberentur. Quòd si id citra ossis extractionē fieri possit, longè tutius erit, quā vi aut quouis alio modo euellere, & in naturam violentiam inferre: nam si ipsa absque molestia sit, complanare quidem & æquare atque vnire distracta ossa facillē poteris, maximē medicamentorū huius ministerio idoneorum adminiculo.

His suppositis, sciendum est, veteres illos Chirurges, & nostri temporis plures innumeras ferramento-

mentorū formas, quibus prædicta opera exequen-
rentur, excogitasse: quæ sanè potius apparatū osten-
dunt, quàm indigentiam compleant. Quibus reli-
ctis, quia eorum consideratio non est præsentis in-
stituti, tanquam firmum haberi debet, nullum aliud
ferramentum ossibus fractis abradendis, aut capi-
ti perforando, æquè idoneum esse, ac id quod ab-
rasorium appellatur. Quippe hoc solo instrumento,
quantum volumus, & quomodo instituimus, caput
abradimus, aut perforamus, citra aliud dānū aut mo-
lestiam, id quæ tutò facimus. Secus tamen res se ha-
bet, si post aliquot dies inopinatò accidentia suc-
crescunt: nam eo tempore si perforandum est, cy-
cliscis seu serrato circulo craneum perforare lice-
bit, quia tunc periculum non incumbit læsionis
membranae, quòd probabile sit iam à caluaria dis-
cessisset in alijs verò sufficit rasorijs diuersæ mag-
nitudinis uti, prout necessitas aut corporis vel vl-
ceris magnitudo postulauerit.

Abrasionis præterea opus incipiès ab ea par-
te, qua os euidentius fractum aut collisum appa-
ruerit: alioqui verò ab infimiori parte. Ac si fra-
ctura ossis oblonga admodum sit, sat erit in
apertione euidentiore abradere, & postea vtrin-
que procedere, non tamen æquè profundè ac in
loco dicto, ut ossis integritas adseruetur quantum
possibile fuerit, quo facilius ab ea parte po-
rum gignere incipiat natura, quantum possibi-
le fuerit: nam ob hanc rationem nonnulli consu-
luerunt, oblongam scissuram omnibus extremis
non esse abradendam, si per medium perforata est.
Et ob id sat erit craneum perforare quantum len-
tis est magnitudo, & sufficiat expulsiōni receptæ

Institutionum Chirurgicarum

humiditatis, & non sit aëri liberior introitus, postea membranas læsuri: ut cunque tamen sit, os rasum complanare oportebit & asperitatem lenire, & lenticulato ferramento, siquid acutum aut læsurū superest, auferre. Quæ sanè opera, leniter, citò & cautè facito, alioqui non leue malum ex vi illata, aut aëris contactu sperandum erit.

Non est profectò minoris momenti nosse, quando & quo vulneris tempore aggrediendum sit huiusmodi abrasionis opus. Cuius rei opinionibus præterminis, statuendum est, longè melius, quinimo necessarium esse mox à principio quātum possibile fuerit cranium abradere (dilatio quippe nullius est momenti neque usus) antequam virium contrahat quod supra tunicas procubuit, & accidentia superueniant: quo tempore, vel perniciosum vel inutile existit cranium perforare, aut abradere, nisi in his vulneribus, in quibus visum nō fuit à principio id opus efficere, quòd nullum apparuisset vestigium interioris mali, & cum hoc à septima die, aut ultra, si levis febricula vel dolor aut humiditatum defectus in vulnere apparuerit, tunc satius erit anceps experiri auxilium, quàm certò mori hominem permittere. Tunc quidem protinus perforare cranium oportebit: tum ut malo incipienti præueniamus: tum verò, quia si maiora succreuerint accidentia, frustra & erroneum fuerit cranium perforare. Neque interdicit Hipp. veritus primis diebus cranium perforare, quia id scribit, eo quòd dura membrana eo tempore adhærens adhuc existit cranio, & periclitatur læsione ab instrumento abrasorio; postea verò cū iam malum crescit, separatur, & sine periculo foramen fit. Quo constat, pulsationem huius membranae deterrunum esse signum,

signum, quippe arguit colapsam esse supra piam, quæ pulsatur, nam quietam esse arguit in loco naturali existere. Quibus factis, inspicendum diligenter est, ne ossis ramentum, pilus vel humiditas aliqua præsit inter membranam & craneum, quod conandum est pellere compressa respiratione, si vel pus, vel humiditas aliqua intus latitet.

Ultimum verò, quod in disputationem duximus est, siccis ne, an humidis medicamentis in huiusmodi vulneribus utendum sit, idque vel semper, vel in omnibus vulneris partibus. Nam adeo crevit Empiricorum temeritas & ignorantia, quod ubique vlcis, & semper siccis indiscriminatim utantur, sicut quorundam Chirurgorum nostri temporis rusticus timor, quod lenissimis & humidis, vel leviter siccis, utantur, cum siccitas minor, quam partis & vlcis natura exoptulet, sordidum & humidum reddat ipsum. In qua re statuendum est, utrisque esse utendum in capitis vulneribus, cæterum longè diversa ratione: nam siccis necessariò, & ex natura, tum partis, tum vlcis: humidis verò non nisi accidentium gratia: illa quidem vlcus curant: hæc verò accidentia mitigant, dolores leniunt, inflammationem arcent, aut mitigant, & cruda vlcera coquendo ad sanitatem adipiscendam coadiuvant. Quamobrem necessum est nunc docere, qua lege & ratione utrisque utendum sit. Quod sicca adhibere ab vlcis principio ad cicatricem, & ea perperam prætermiserint. Chirurgi nostri temporis, constat, ex Hipp. qui ita scriptum reliquit: **Vulnus in capite nullo humore humectare convenit, ac ne vino quidem.** Quam etiam sententiam confirmaverat alibi, dicens. Quin & cataplasmata pes-

Li. de vul.
cap.
Li. 1. de fra-
ctu, 58.

Institutionum Chirurgicarum

Li. 5. per
gen. c. 14
Li. 6. met.
Lib. 2. per
ge. c. 6.

Li. 6. per
gen. c. 14.

Similia quidem ea sunt, quæ sunt grauissima, sed & pleraque alia praua sunt, & abscessum prouocant, & tunc mucositatem amplio-rem, tum suppurationes molestas mouent. Galen. quoque medicamenta sicca laudat, blanda refugit, & mille in locis inquit ossi nudato necessaria esse, fugien-
daque emota à Græcis appellata, quòd linamen-
tis inunctis offerantur: & eadem parte idem confirmat, necnon ex Megetis & aliorum vete-
rum opinione & felicissimo euentu probat. Quod Paulus, Auenenna & reliqui sapientes viri euiden-
ter consulunt, maximè vt Gal. docuerat, vbi os nu-
datum est: nam inquit sicciora (quasi vt probatum relinquat sicca, omnibus vlceribus proficua esse) me-
dicamenta vulnerato capiti eatenus idonea esse, qua-
tenus os apertum est, quoniam capitis vulnera vbi os nudatum non est, nil proprius requirunt, ma-
gis quam in alia corporis parte, vbi semper expectanda est natura affectæ sedis. Deniq; cū vul-
nerū, quatenus vulnera sunt, cōmunis curatio, sicca-
ribus perficiatur (nisi in articulis & contusa car-
ne, aut aliquibus casibus specialiter) ob id pro-
fecto sit, quòd vulnus nō variatur, nisi siccetur, nec
carnem producat nisi siccetur. Siccitas tamen, quæ
ossibus fractis aut detectis, proficua est, longè in-
tensior futura est, quàm quæ vlceri solū commo-
da existit, ob id sicciora dixit Galen. prærequiri.
Quid igitur de blandis & humidis medicamen-
tis sentiendum est, an omnino ea ablegare oportet à vulnerum curatione, quòd suapte natura vul-
nus diuturnum ac sordidum reddant? subiectum
os, vbi nudatum est, corrumpant? & omnino ef-
fectum contrarium, quem res postulat, efficiant?
si quidem hæc omnia medicamenta ex illinientibus
sint,

finē, laxandi quē vim ac pus mouendi habeant, nec non & putrefaciendi atq; corrumpendi.

Si quis rem hanc diligentius pensitet, vtrisque vtendum esse reperiet, non tamen indistinctē & indiscriminatim, & vtrunque, sed hac lege instituta: nimirum siccis, dum vulnus nil aliud sibi habet adiunctum: & reliquis, si aliquid vulnere accedat, quod id expossulet & vlceris indicationem obumbrēt. Ceteram in siccorum administratione, cōseō non semper feliciter succedere, quia modum, mensuram & gradum metiri exactē nescimus: nam si id rectē efficere studuerit, proculdubio multo citius & certius sanitati restituerentur: quod profectō nō procedit, vt studemus, quia quibusdā siccis, alijs minus siccū adhibemus medicamētū. Vulnus itaq; capitis, si citra ferramentorū aut manus ope potest curari vt dictū est, vino diligēter abluerē, calido, siccis atq; modicē calidis medicamentis actū calidis tractare oportet, exēpris à vulnere prius quæ extranea fuerint. Vulnere verò à vino exsiccato, oleo ex Aparicio, quod calidissimum sit, quantū laborās ferre possit, vulnus implendū est, supraq; linteola oleo imbuta imponēda, & extremum vino iterū calido superponatur, & facta cōmodaligatione vsq; ad integrā curationē sic facito. Quippe huiusmodi oleum exactē glutinat & carnē ad cicatricē producit, præsertim si emplastri forma, cū terebinthina & cerusa, aut puluerib9 siccis, quos inferius referā, apposueris. Inter medicamēta sicca, huic vsui & omni vulnere cuiusuis sit partis p̄ficua, id maximē probatū experimēto & ratione cōperio, quo felicissimo euentu vsi sūt nō pauci Chirurgorū tāquā maximo secreto. q. r. myrrhē, thuris, masticis, sanguinis draconis, boli Armenici p̄parati, cathalorū rubeorū aloes,

Institutionum Chirurgicarum

aloës absynthij, ana. 3. s. fiat omniū pulvis tenuissimus, & p. cribrū quater coletur, vt remaneat sicut alcoholi: & quatuor vncijs olei Aparicij adde huius pulveris. 3. s. & agitentur tēpore vsus. Quo vnguento vulnus penicillis, aut citra ipsos, replebis leniter. Postea vnguento desuper vtēris nigro. q. r. olei rosati & mastichini ana. 3. iij. lithargyrii. 3. iij. minij. 3. j. aquæ vitæ. 3. atij. myrrhæ & mastichis ana. 3. j. prunelle, beronicæ ana. 3. ij. fiat emplastrum secundum artem, quod fiet nigrum ad modum vituminis. Sunt autem hæc vsui maximè proficua. Verū si vulnēri sanguinis fluxus succrescat, vino non vtēris, sed eodem oleo, frigidō tamen & pulveribus restrictiuis admisto: habet quippe singularem compescēdi fluxum efficaciam, maximè si desuper addideris oui candidum cum pilis leporinis. Quod si capitis vulnus cū cranei fractura euidentē sit, ac sufficienti expurgatione succorū, vel solum craneo detecto, aut cum lēssione in contraria parte ab ictu, vel cum ossium separatione, inæqualitate, & grandi confractiōne, ita vt manus ope non sit opus (vt dictū est, nisi oportuerit aliquod os separatim extrahere) nullo alio medicamento vtēris nisi vino, & oleo Aparicij: adeo enim validè exsiccat, vt neque saniem neque pus intus permeare sinat. Oleum hoc profectō caluariæ fractas ac diuisas partes, aut vnit, aut separat & educit: Sic vbi in contraria à vulnerata parte lēssio aliqua perferitur, ipsa eo præcalido inuncta, abrasis capillis, mirum in modum præcauet & curat, sicut emplastrum nigrum nuper scriptum. Pari prorsus ratione vbi abraferis os, siue penetrauerit abrasio siue secus, eādem curationis forma vtēris: hoc vno excepto, quod vulneris labra si cruda sint, si contusa, si inflammatione tententur, blandis

blādis medicamētis, vt quæ digestiua vocantur, le-
niēda sunt, & coquendū id quod digeri nequit, vt
paulò inferiūs leges. Verūm siccis vti medicamen-
tis, vt considerationem maximam expostulat, ita
omnino tutū non est. Nam triplici ratione sicca me-
dicamenta caluaria fracturis proficua existunt: rū
quatenus vicus est, pēperuō siccantia expostulās,
modicē tamen: tum quatenus ossa detecta sunt, quæ
custodire, protegere & fouere oportet, quæ opera
nullo alio auxilio tutiūs fiēt, quā per sicca medica-
menta: quæ tamen innatam oīsis siccitatem excede-
re non tenentur, alioquin non erunt proficua: tum
vltimò vbi os discessurum est, quo faciliūs emoria-
tur & tabescat, & facilius discedat: quæ vehemen-
ter & supra oīsis naturam siccare oportet. Quæ fa-
nē & delapsam humiditatem, aut pus ebibēdi & ex-
siccandi atque extrahendi vires habent. Sic profe-
ctò quæ sicca sunt & pulueris forma adhibentur,
plurimum siccare nata existunt: quæ verò vn-
guenti aut emplastri forma, licēt æqualiter siccis
conficiantur, nō tamē æquē siccant, ob admixta me-
dicamenta, quæ quodammodo molliora reddunt,
maximē si oleo liquentur & emollescant, præsertim
Aparicij. Itaque his liquatis supra omne vlcus vtē-
ris (si mens est ossa extrahere siccis) vt puluere iri-
dis, aristolochiæ, betonicæ, centaureæ, & reliquorū
quæ cephalica dicuntur, sin aliter blandiori forma
adhibitis. Huius naturæ est vnguentum isis, barba-
rū, de centaurea, betonica, gummi elemi, & simi-
lia: quæ ferē omnia aliquid viridi eris recipiūt. Quæ
vel admisto gummi elemi vnguento, vel oleo Apa-
ricij liquidiora reddes, & supra vlcus appones, ex-
teriūsq; prædicto oleo inunges, & madido ex eo lin-
teo superposito caput ligabis; & hac lēge ad vlti-
mam

Institutionum Chirurgicarum

num vsque curationis procedes, nisi aliquid adiunctū sit aut succrescat, quod prædictā & antiquā methodū euertere doceat: hac quippe curationis vi plures sanos se vidisse, quā humidis fiat: ait Gal.

Solent autem vulneribus succrescere inflammationes, dolores, cōtusiones quæ præfuerūt ab ictu: irē ex aliqua occasione vulnera recrudescūt adeò, vt sæpe posthabita præfata & generali vulnerū methodo curatiua, necessum sit, cuique pro indigentia subuenire: nam si aliquo ex prædictis accedente, siccis amplius vtaris, dubium nō est, quin vel dolorem, vel inflammationē adaugeas, aut sordidius & crudius reddas vlcus. Quamobrem diligēter considerabis, an membranæ, vel externa caro dolore, tumore & inflammatione tententur: quo tempore inhibendæ inflammationis & mitigandi dolores gratia, omphancino rosaceo calido, supra membranam vtēris, & exterius in vulneris circuitu, & quo magis ab inflammatione quæ præfuit, discefferis, tanto minus vtēris oleo, & adicies mellis, donec eo solo vtaris, positis supra os siccis elichinis, vel appones puluerem capitalem Gal. lib. 13. metho. c. 1. & lib. 6. c. 5. Labia tamen communi digestiuo curabis, cauēs ne penicillos digestiuo obductos, iterum rosaceo madefacias: nam impossibile est intrus ad ossa nō permeare: qua curatione plurimos deductos fuisse constat in ossium, & membranarum corruptionē & putrilaginē, haud secus quā ex cōtusione aut succorum prauorum prolapsione supra membranas aut cerebrum. Pari prorsus ratione blandis & pus mouentibus etiam à principio vtēris, vbi contusum ex carne aliquid est: nam si exsiccaueris proculdubio lædes, & vlcus aut sordidum, aut salitū & siccum reddes. Verū cū à siccis abstinueris, id

lentē

lentē & ſenſim facito, maiori parte digeſtini ex terebinthina adiecta, quā ex oui luteo: tandem huſ vtiſis, donec vlcus coctionem commoſtret, & inflammatio ac dolor miteſcāt: quo tempore ad ſicca iterum te cōferes medicamēta, quibus & abſtergas, & pariter ſicces. Cauendum tamen eſt in hac curatione, ne vulnus elichinis adeo impleatur, quod vel caro, vel membranæ, vel fracta oſſa nimis comprimentur, ac dehiſcant: hoc enim curandi genus ſæpe maius damnum attulit, & maiores dolores quā malum ipſum. Poſtea verò ſupra vulnus (vt ſecuriùs coquantur labra & contuſæ partes) eodem digeſtino vtiſis: ſed laudo magis tetrapharmacum: ac ſi calorem partis deficere conſtiterit, vel cataplaſmata ex pulueribus calidis impones, vel emplaſtrum aliquod ex dictis: deinde quæ carnis generationem præſtēt: veluti vnguentum medix confectionis, & in mollioribus corporibus vnguentum aureum: in adultis verò quod ex gummi elemi cōficirur, aut cerotum iſis, vel emplaſtrum centauræ, ſi liquidiora reddantur melle, aut oleo

Hac etenim via procedes, ſi rē feliciter cedere cōperias: verū ſi mēbranæ ſordidæ & prauī coloris appauerint, maiori indiget diligētia: & ob id addere oportet melli roſaceo aquæ vitæ modicū. At ſi ex pure inter tunicā & craneū innatate, ſordities ſubortitur, cōficere oportet medicamētū ex ſucco betonicæ & melle roſaceo, & præmiſſa coctione uſque ad ſucci conſumptionem, addes gummi elemi parum. Prodeſt etiā terebinthina abietis cū puluere ireos: verū ſi ad nigredinem vergat, & vereamur membranæ corruptionem, vnguento Apoſtolorum, & poſtea Aegyptiaco, admiſto melle roſaceo, vtiſis, aut vnguento rubeo, licet eo tempore parum pro

Institutionum Chirurgicarum

prodesse pharmaca arbitrandum sit. Verum si inflammatio adeo crescat, quod membrana ad modum fungi supra cranium emineat, tunc quidem solo lin-
teolo rosaceo madefactio vtendum est, donec tu-
mor decreseat. Verum si ex crescentia fungosa &
spongiosa carnis fuerit, tunc quidem alumine vtro
super sparso vtêris, quod sat erit.

Reliquorum accidentium (quæ vulneribus ene-
nare assolent) tractatio, quia non est presentis in-
stituti, consulto ableganda est ab huiusmodi tra-
ctatione.

DE VULNERIBVS IN genere INSTITVTIO. I.



VA M continui solutionem,
quæ ab intrinseca proficis-
citur causa, & inueterascit,
nequit q; per vnica labra so-
lum sanescere, sed vnâ vel
plures fortitur dispositio-
nes, quæ vnionem vel con-
solidationem remorentur, cū
saniosa & purulenta collu-
vie atq; putredine, vulgariter Chirurghi vlcus appel-
lant. Affectio quidem quæ (licet in simplici & cō-
positam diuidatur) nullibi simplex reperitur, vt vul-
nus, adeo vt per simplici cohabitū partiū vnū nō
possit, quemadmodum vulnus, sed semper secū ha-
bet adiunctum aliquid, siue sanies, siue carnis defe-
ctus, siue quid aliud, quod & simplicitate & vnionem
remoretur. Cū hoc tñ seclusa hac simplici vnione,
curari

curari desiderat ut vulnus per unionem, eam tamen quæ fieri debet per carnis productionem aut cutis, & separationem prohibentis.

His non obstantibus, diuiserunt prisci illi sapientissimi vlcus in simplex & cõpositũ. Simplex igitur erit vlcus, cui nullus alius affectus, nec symptoma aliquod coniungitur, sed id solũ quod solutio cõtinui est, cũ pure, ixorẽ aut putredine. Quæ sane vlcusis fors & conditio, licet in multo plures diuidatur, ab ipsius vlcusis natura vel rei substantia desũptas, ut quæ à figura seu magnitudine vlcusis desumuntur, quæ à tempore, à situ, seu parte vlcusata desumuntur alia plures: quas tamen quia non plurimum euariant communẽ & vniuersalem medendi viam, prætermitto, licet necesse sit aliquid euariare peculiarius & specialius, non tamen magni momenti. Quod verò in curatione maius longẽ facessit negotium, vlcus cõplexus & complicatio est, ut quæ & peculiarem requirat prouidentiam, & citra quorum ablationem, vlcus curari nulla ratione potest. Sic profectò, præmissa diuisione vlcusis magni, parui, recti, obliqui, æqualis, inæqualis, profundi aut superficialis, aut eius quod est in parte similari vel organica, in cute, carne, vena, arteria, vel in quouis alio corporis mēbro, solũ in mediũ adducere eam vlcusum diuisionẽ placuit, quæ à cõplicatione aut cõpositione vlcusũ disseminatur, ut quæ maximẽ facessant in re practica negotium.

Vlcusis igitur cõpositi differentia sumuntur à cõplexu ipsius cũ symptomate, ut crucians, dolore vacans, sordidũ, saniosum, cruentũ: vel adiugitur morbo, ut vlcus intemperatũ, phlegmonosum, erisypelatosum, gangrenosum, cancerosum, putridum, cauum, phagedenicum, supercrescens, callosum, & cũ vitio olis. Aut adest suę causæ adiunctũ, ut cacochymũ,

N

fluxio

**Differẽ
tia.**

Institutionum Chirurgicarum

fluxionibus complicatū, aut sinuosum, varicosumve. Quorum sane in multo plures subsecantur species, iuxta causæ, morbi aut symptomatis complexum: quorum omnium meminisse non est præsentis instituti, sed solum eorū, quæ maius facessunt in curatione negotium, & certius periculum accersunt.

Causæ.

Causæ omnium vlcerum in genere, duplices tantum habentur, namque ab huiusmodi curatione, procatarticeq; omnino sunt ablegandæ. Antecedentes quidem sunt humores vitiosi, erodentes, mordaces, adusti, falsi, & utcumq; aliter adeo vitiiati, quod quancūque partem adierint, vim habeant (cura quantitatis considerationem) ex maligna cōditione abraedere, & exulcerare. Cōtinētes causæ in multiplici sunt differentia: nam quædam perpetuò assisunt tuentes damnum semel factum, ut partis vlcerate intemperies: quædam augent, ut fluxiones cuiusvis humoris: in qua etiā fluentis humoris copia consideratur: quibus sane causis accedit ossis vitiiati portio, aut varicū vicinia: ex quibus profecto vel insanabilia, vel ægrè curabilia fiunt vlcera, quod ex prædictis causis illis succrescant sanies, virus, sordes, pus, callositas, cancer, corruptio, & omne virulentix & putrilaginis vitium, adeo ut insanabilia fiāt, ni prius prædictum adiunctum semoueris.

Dignotio.

Cognosces prædictorū vlcerū vnūquodq; ex propria cuiusq; diffinitione & natura. Sic virulētū vlcus id est, in quo virus, id est, tenue quoddā & liquidū excrementū, sanies nuncupatū, citra erosionē abūdat, & ob id saniosum etiā appellatur. Corrosiuū vlcus id est, quod carnem sibi subiectam erodit, & scaram, quæ ab acri humore inducitur, maiorem indies progignit, carne subiecta erosa. Quod sanē vbi ad sanas & sibi vicinas carnes se se extenderit, erodendo,

do, vlcus depafcens nuncupatur. Cui generi redacitur noma, & phagedena, licet hoc folum extrimam carnem & cutem depafcatur. Sordidum vlcus id dicitur, quod craffiore vllo ac vifcofiori fecremento, quod fordem appeillant, abundat, crufta veftitum craffa, molli carne, craffa & fuperflua fubtus latente. Putridum autem vlcus id eft, ex quo vapor aliquis graue olens, & cadauerofus expirat, vt à putridis & corruptis carnibus exhalat cum humiditate fuperflua, forde, & caliditate extranea, qua febrem fibi habet comitem, & fuperat malitia vlcus fordidum. Cauernofum vlcus id eft, cuius orificium ftrictum atque anguftum exiftit, profunditas verò latior, & fenfum effugiens, multoſque anfractus habet & cuniculos, fiue vias hinc inde difcurrentes, citra callofitatem & duritiem. At huc finitimum exiftit fiſtuloſum vlcus, ceterum differt ab eo, quòd meatus illos anfractuofos & ſinuofos habet duros & calloſos. Cancroſum vlcus id dicitur, quod viſu horrendum & foetidum exiſtit, labra habens dura, craffa, tumida atque inuerſa, colore foedatum, inter rubrū & nigrum medio, fuſco & liuido, in circuitu venas veluti expādes limidas, turgidas, nigro & craſſo ſanguine plenas.

Difféperatū vlcus dignoſces, quòd mala qualitate præternaturā polleat, vt eſt caliditas immoderata, vel frigiditas, humiditas aut ſiccitas, aut ex illis plures ſi-
mul. Doloroſum vlcus facile cognofcitur, q̃ ſemper laborantem atrociter moleſter cū cruciantibus & perpetua ſenſibilitate, & moleſtia ibidem perſenſita. Reumaticum vlcus hoc eſt, quod perpetuo humoribus aliunde fluentibus ſcetet, quibus ad ſanitatē peruenire nequit. A poſtemoſum id vlcus appellatur, in quo tumor aliquis præter naturam adiunctus eſt, ex

Dignatio.

Institutionum Chirurgicarum

perpetua fluxione, in carnem vicinam ulceratæ prolabente. Cacoëthes autem vlcus id propriè est, quod ad sanitatem peruenire nequit, etiam si omnia iuxta artis præcepta fiant, quod in carne vlceris malignitas quædã inest, cæca & nobis occulta, quæ reddit vlcus insanabile, aut rebelle, & ægrè sanabile. Vermiculosum vlcus id dicitur, in quo ob impensam putredinem vermes nascuntur. Varicosum profectò id haberi debet, in cuius partibus superioribus venæ quædam eminentes ac turgidæ, crasso sanguine, vel vitioso aliquo succo plenè apparent, quas varices Medici appellant, ipsi vlceri fluxionem & fomentum suppeditantes, consolidationem & sanationem impedites. Atque horum facta mentio sit satis: nam reliquorum natura facilè solo aspectu innotescet.

**Præsa-
gium.**

Præfagare euentum in huiusmodi & reliquis vlceribus nõ est ita facile, & ob id solũ explicabo quod in hac re difficilius videtur. Sic annua vlcera rarò citra ossis vitium reperiuntur, & pluries, nisi os excidat, recrudescunt, ac cicatricem elidunt. Quod nõ minus accidit acrium & erodentium humorũ fluxibus: quo fit, vt vel dura vel sinuosa, vel prauit coloris fiant, & caro circumstans deterioris: quæ sane recur malè affectum indicant. Pari ratione insanabilia sunt, aut difficulter, quæ alijs morbis succedunt, item & vlcerum circumglabra, quæ radículas pilorum omnium exedunt: item quæ in extremitatibus musculorum dorssi, tibiæ & brachiorum adnascuntur vlcera, difficilia sunt, maxime quæ ad internam membranam pertingunt. Præterea vlcera rotunda difficilem habent curationem: pari ratione, quæ extremis partibus accidunt, & articulis. Item quæ auxilia non admittunt, quæ reuertuntur, & tandè ea omnia graua, periculosa, plena,

plena, aut saltem sanatu difficilia sunt, quorum diffinitiones nuper adduximus.

Vlcus etenim omne, vt solum simplexq; vlcus est, *Curatio*
vnam tantum habet communissimam curandi rationem, nimirum exsiccationem, in qua profectio conuenit cum vulnere: sed hoc discrimen habent, quod hoc minori, illud vero maiori desiccatione indiget, præterquam quod velut vulnus cauum curari desiderat vlcus, quantumuis simplicissimum sit, quia sequitur pustulas, & abscessus. Quo fit, vt prius sordem abstergere, & humiditatem tenuem absumere oporteat, deinceps carnem generare, & ea in hoc munere exsiccatione vti, qua caro quæ gignitur, simillima fiat, aut genita efficiatur ei quæ præest in parte sana: postea vero maiori opus est exsiccatione ad cicatricem inducendam, quantum cicatrix carne ficietior & durior futura est.

Cæterum quia huiusmodi curandi via insufficiens est compositis vlceribus curandis, quod vniuersa prius remotionem prohibentis, & complexum coniuncti morbi, symptomatis aut causæ expostulât, ob id seorsum cuiusque meminisse oportet, siquidem quodlibet pro ratione sibi adiuncti mali, aut causæ curari desiderat. Verum quia omnium specialiter scribere esset operosum, & præter institutionum rationem, ea causa morus studui, solum quatuor vlcum complicatorum sortes per capita scribere: quibus exactè intellectis & eorum vniuersalibus præceptis, ac specialibus auxilijs diligenter perspectis, facile erit reliquorum medellam adinuenire.

Institutionum Chirurgicarum

DE VLCERE DISTEMPERATO, cacoëthe, diffepulotico & inueterato

INSTITVTIO II.



DE O coniunctum est inueteratis vlceribus, malignis & ægrè curabilibus intemperamentum, ut mirum videri non debeat, hoc vno capite, eius simul cum alijs causis horum vlcerum meminisse: quamuis sciam, aliud esse, vlcus præcandidum, humidum, frigidum aut

siccum, esse, & aliud sibi adiunctam habere malā qualitatem, quæ vitiosum, mali moris & difficulter sanabile reddat. Nam illud facile contrarijs adhibitis cedit, & vlcus sine magno negotio sanescit: hoc verò non nisi difficulter, adhuc præstitis iuxta artis præcepta

et Meth.

c. 40.

et Meth.

l. 7.

remedijs, ut ex Gal. euidenter constat. Sunt igitur cacoëthe & ægrè curabilia, atque reuerfiva vlcera ex malignorum genere, quia licet corrosiva non sint, neque inflammationem aut vehementem dolorem, aut copiosam saniem sortiuntur, cum hoc tamen oras habet calidas & saniem tenuē, atque partes adeo præcandidas, & rotunda figura insignitas aliquando, quod nullis videantur cedere remedijs, quantumvis plana sint: ac si quando cedat, mox consumpta subito cicatrige reuertitur. Sed cum hoc vlcus genus in tres species diuiderit Gal. necessum est cuiusque naturā & causas diligenter considerare. Est autem in hoc genere vlcus adeo vehemens & malignum, quod nullis cedere aut alijs videatur, neque ad bonæ carnis generationem

et per. 30.

vel

vel cicatricē inducendā, quod chironiū vlcus; aut thelephicum nuncuparunt antiqui. Aliud quidem adeo leue, vt præstito auxilio, boni reddatur coloris, cicatricem acquirat, cæterum (vt dictum est) paulo post recrudescit, & cicatricem dirūpit, ac iterū ad antiquum statum regreditur: reliquum verò mediū est inter hæc duo: nam difficilius cicatrice obducitur & longiori tempore, & quantumvis boni coloris sit, non omnino clauditur vniuersum vlcus. Quam varietatem censeo proficisci ex natura & diuersitate causæ, vt mox referam.

Multa sunt quæ hoc vlcusis genus remorantur, quominus carne impleatur: alia cicatricem fieri impediunt: nonnulla, quæ genitam depopulantur. Primò valida intemperies, quæ imbecillitatem parit, vel carnis impedit generationem, aut genitam depopulatur: insuper humoris confluxus, præsertim vitiosus, vt qui commutationi in carnem ineptus sit, quod non minus plenitudo, quam superare nequit natura, nata est facere. Cæteram cicatricem omnino prohibent fieri horum vlcusum labra callosa, dura, & in tumorem eleuata: reuerti verò cicatrice obductam vlcus cogit, & cicatricem delet varicum vicina, aut prædicti humoris vitiosi nouus confluxus, & vltimò subiecti ossis vitium: quod mirū in modum vlcusū, quæ nullū videntur habere vitium, consolidationem & cicatricem remorantur. Hinc profectò constabit differentia inter cacoethic vlcus & dissepulonicū: quippe illud habet in propria & vicinā partium carne adeo prauum temperamentum, & deterrimā conditionē, quod præter id quod hac ratione occultam multi appellant, vt morbo Gallico affectus cōtingit, quod vniuersum alimentū, quantū-

Causæ.

nis laudabile & probum sit protinus vitiet, & alitioni ineptum efficiat: vlcus insuper eo suscepto fædet, & carnē ac cutē circūstantē prauo colore subnigro inficiat. Hoc verò ad cicatricem ægrè peruenit, quod alimentum sibi præstitum vitiosum sit, copiosum, aut praua conditione à iecore vel à toto corpore affectum, quo vlcus quantumuis cicatrice videretur obductum, iterum recrudescat.

Neq; solū arbitrandum est, Gal. locis citatis temere & inutiliter hoc vlcis genē in has tres sortes dissecasse, sed vt simul doceret naturam topici auxiliij, cuique propriij & peculiaris, iuxta maiorem aut minorem resistentiam vlcis: nam sic primę fortis vlcibus vehementiora consulit adhibere medicamentā, & infimę fortis debiliora, ac mediocria reliquis, quę in secunda classi constituit.

Curatio

Erit igitur curadi ratio & via triplex: vna, quę vniuerso corpori aut iecori provideat: secūda causam eā ex his, quas diximus, malum efficientem illidat: tertia, quę topica auxilia iuxta differentiam assignatam adhibere, qualitate, quantitate & occasione. debitis, doceat.

Vniuersalis igitur prouidentia sita est in debita vitę & victus institutione, & in enacuatione eius, quod constitit in corpore redundare, vel indies generari. Victum institues omnino contrarium ei succo, quem cognoueris superabundare: quippe vel pituitosus saususve, aut biliosus, vel melancholicus existit, ob id cuique pro indigentia, cibaria, quę minus generent abundantes succos porriges: quantitatem mediocrem institues, & exercitium, ni quid verneris, imperabis, si pituitosorum adsit copia.

Ad superflui igitur enacuationem accedentes, considerabimus, quę ex tribus causis superfluum gignat humo-

humorem: namque id fit, quia non expurgantur, vt par est, vel quòd generentur vitiosi vitio alicuius of-
ficinarum: aut quòd totius corporis praua qualitate
& temperie inficiantur. Vt cūque sit, semper huic ma-
lo subuenies medijs vacuationibus, nisi malum suc-
crescat prauorum alimentorum esu: què tamen non
vtcunque exequeris, sed iuxta humorum vitiosorū
generationis modum. Nam si vitio consueta & ne-
cessaria euacuationis fiat prauī succi prouentus, fre-
quentius purgabis, præsfito medicamento iuxta hu-
moris ideam: si verò alicuius membri vitio, ei prou-
debis, reducens eum ad antiquam temperiem, & pau-
latim euacuationibus, quòd paulatim gignitur immi-
nues, aut facta fontanella iuxta membrum mandans,
aut suscipiens. Verū si vitio totius corporis geni-
ti humores conspurcetur, sudorificis auxilijs cura-
bis, & intemperiem corrigere, & congestum humo-
rem minuere.

Ad ulceratam igitur partem accedendo, sciendum
est, quòd si ex partis ulceratę intemperamento, vel
absumatur alimentum à calore & siccitate, vel cru-
dius frigiditate & humiditate, permaneat, aut præ im-
becillitate, nec probè conficiatur, nec vt par est, ex-
crementa pellantur, tunc quidē statutū est ab omni-
bus Medicis, per contrarias qualitates ei, quæ præest,
rem agere oportere. In quare sciendum est, quòd li-
cèt intemperantia nata sit prædicta vitia inferre,
nihilominus tamen plerumque accidit, quòd adeo
fit intensa & immoderata, vt proprię virtutis coſtri-
cis & carnem generantis ministerium & actum dei-
ciat, ita vt non sufficiat refrigerare calidam intem-
periem, aut frigidam calfacere (licèt præcisè neces-
sarium sit) sed opus etiam sit caloris innari vim &
substantiā adaugere, aut supplere. Sic profectò eueru-



frequenti comperimus, nullum hæc vlcera, aut quàm parauissimum susceperare beneficium ex calidis, aut frigidis, sed solum à temperatis, & his quæ partis calori natiuo simillima sint, aut alimentorum probitate caloris substantiam adaugeant. Quo factum esse arbitror, vt medicamenta, quæ temperata sint conditionis & medicæ naturæ, frigidis & calidis vlceribus proficua existant, vt videre est in ceroto ex lithargyrio composito, quæ propter in omni vlcere intemperato his omnibus providendum erit, & postea ipsum curare, vt nuper diximus.

Verùm si causa difficilis curationis & reuersionis vlcerum fuerit labiorum & carnis circumstantis callosa durities, cum euidentissimum sit, eam fieri ex affluxu malignorum & terrestrium humorum, ante omnem manus adhibitionem, curandum est, corpus vniuersum expurgare, quo minus ad affectam partem deinceps confluat, alioqui vel crescent callosa labra, vel iterum callus renascetur, vt dixerat Gal. Quo facto, nulla citius & tutius curationis via vlcus ad veram cicatricem duces, quàm præcis labris forcipe, aut nouacula, quo caro noua & laudabilioris nutrimenti aduentu, præstantius nutriatur, & duratura cicatrix inducatur. Quod si laborans reuerit, vel fore fistulosum vlcus prædices, vel longissimo indigere temporis intervallo ad callosam duritiem medicamentis extirpandam: quæ omnia ex genere excedentium esse tenetur: cui vsus scarificare ad minus labra vlceris teneris, quo facilius via medicamenti omnino callosum corpus permeare possit.

AEgrè etiâ aut nunquam ad veram cicatricem patitur peruenire vlcus varicosa vena nutritum: & ob id

id sciendum est, quid agere oporteat, nam si permit-
tas ex varicibus ad vlcus diseminari alimentum, in-
curabile efficies ac forsan cancrum : si verò cu-
res ac diu opere persoueres, nil proficies, quantum-
uis corpus purges & repurges: prodegit quidem vt
laborans melius se habeat, non tamen vt sanitati re-
stituatur. Superest igitur triplex curandi via: prima,
prehabita corporis maxima providentia, bis ter ve
in anno sanguine misso, expurganti etiam medica-
mento melancholicum ducente pluries ex habito, item
prouocatis hamorrhoidibus. Secunda, scissa ferro
candenti varice, aut duobus locis ligata filo, per me-
dium dissecta, cauens ne deinceps humorum illuc
fluentium ad aliam partem fiat decubitus, frequen-
tius sanguine misso, aut expurganti medicamento
exhibito: tertia verò, fontanella iuxta varicem a-
perta, qua expurgerur, quod varicosa vena in vlcus
transmittere assuenerat. Vltimò tamen, curato re-
centi vulnere varicis, vetustum vlcus curabis ad ci-
catricem ducere.

Quod si subitas in vlceris imo vitiatum os latitaue-
rit, quod nosces ex carne spongiosa ab osse separa-
ta, & molli, ita vt specillum permeet vsque ad os, &
quod vlcus sit anuum aut antiquum, vt dixerat Hipp. 6.aph.45.
præterquam, quod tenue pus abundat plus iusto,
tunc quidem sperandum erit, nunquam posse ad
firmam peruenire cicatricem, osse non extracto,
aut eius parte cariota separata. In qua re sciendum est
primò, os posse vel in superficie vitari exasperariq;
vel intimus carie corrodi, idq; à tenui & corrosiuo
excremento, quale ossium futurum est, si quidem mi-
nus còcoquere potest ac incrassare, & poris sit stri-
ctioribus. Sic etenim siue caries à carne incipiat, ossi-
que comunicetur, siue ab osse, credibile est, nunquam

Vitiatum

Institutionum Chirurgicalium

vitiatum ossi carnem posse adherere: & ob id quantumvis in vlceribus caro à lateribus supercrescat, quia ossi non adheret, mollisq; ob id existat, cicatrice nō obducitur firma & stabili, sed crusta vi medicamentorum facta, quæ protinus delitescit, & subitus caro mollissima apparet ab osse separata. Quamobrem, qui huiusmodi vlcera voluerit perfectè ad sanitatem perducere, facta sufficienti vlceris dilatatione, ut quod ossis vitiatum est, vndique pateat, vel maior eius pars, si solum asperitatem conspexerit, sat erit leuiter abraderè, & siccis medicamentis vltèrius procedere, donec aliquid ossis abscedat, & vlcus coalescat. Sunt autem hæc medicamenta, vt vnguentum isis, vel Aegyptiacum, vel vinum in quo ferbuerint myrrha & centaurea, aut vnguētum ex bufone. Quod si profundius permeauerit caries; abraderè quidem oportebit, donec vel os melioris sit coloris, durioris substantiæ, aut sanguinis aliquid pululèr. Cum hoc tamen non sufficiat, nisi os ferro candenti vratur, aut caustico medicamento, velut est argentarii aqua: postea vlcus curabis, studens ne carne impleatur, antequam ossicula ex toto decidant, quæ violenter extrahenda non sunt: nā aut iterū recrudescet vlcus, aut sinuosum efficietur. Osse itaque abrado, vlcus impleatur elichinis, rosaceo, & albumine oui imbutis, maxime si prius madesceris & expresseris in aceto: postea oleo & vitellis ouorū vtèris: deinceps butyro & melle, tandē aliquo exmundificatiuis, donec (vt dictū est) ramenta ossis ex toto decidant. Verū si vnuerſa ossium substantia ex toto cariōsa sit, membrum aut scindere oportet, aut leuiter exurare, si pars affecta fuerit, vel os pectoris, aut costæ, aut caput ossis sciæ: quo tempore satius erit vnuerſum negotium naturæ & siccis medicamentis

mentis committere, vt Aegyptiaco vnguento, pulueribus radice peucedani, aristolochiæ, lilij, aluminis vsti, euphorbij, vitrioli, aut Vigonis rubris pulueribus, vel mundificatiuo ossium Auicennæ.

Vltimò non solum vlcus efficitur dissepuloricum, sed & simul cacoëthe, seu mali moris, & ægrè ad sanitatem ac veram cicatricem perueniens, ex vitiosa carnis qualitate, quæ præter gradum, primariam qualitatem, naturam & modum, adeò deterrimæ efficitur conditionis, quòd nobis occulta sit, & laborati rebellis ac perniciofa, adeò vt alimentum vniuersum, ad particulam veniens, quantumvis laudabile sit, vitiet & conspurcet: quo à dissepuloricis vlceribus dissidere videtur, quæ solum humorum defluxu ad partem, ægrè ad cicatricem veniunt. Cum hoc tamen non raro cõtingit, vlcera vtroq; modo fieri mali moris, alimenti nimirum vitio, & partis vitiosa & habituali qualitate. Quapropter, antequam vel neruæ parres coafficiantur, vel ossa carie periclitentur, oportet diligenter vtrumq; præcauere.

Sic primo accessu studebis intelligere, an maligni alicuius succi affluxus parrem vitiet, quem demere, diuertere, corrigere atq; réperare curabis. Primò alimentis boni succi, & réperatæ naturæ, quæ substantia & qualitate corruptioni obfistant, & corruptos succos attemperent. Postea sanguine misso, si cõstiterit aliquid eius abundare, aut succos esse corrosiuos, & mordaces ac præcalidos: tãdè purgabis, si corpus vniuersum eis scateat, copiose, finaliter, vitio iecoris, aut alicuius mēbris quotidie gignantur, lentè, paulatim, per vices & intervalla. In qua curatione præter distractionem non erit abre sudatorijs vti auxilijs ex Guayaco, sparta parella aut China. Quibus factis, ad vlcus prouidè accedes: in quo opere cõsiderabis

malam

Institutionum Chirurgicalium.

malā qualitātē in ipso ortam ex illuuiē prædictorū succorū conditionē prauā cōtractā fuisse, aut ex carnis innato vitio. Quā cōsiderationē phabita, sciendū est, vtriusq; vlcēis eandē esse prorsus curationē, & ob id placuit auxilia vtriusq; proficua simul recēdere, ne eiusdē rei sepius efficere mentionē cogamur. Pro sunt igitur his vlcēibus auxilia, quę citra mordicationē valenter siccēt, cū resolutionē & corroborationē partis, quō facilius, nisi quid denuo influxerit, vel repercutiatur, vel rēsolui possit, quib; exinanescatur humor quem labra imbiberunt, aut non purgarunt. Fluētē igitur humore, primo repellentibus vtēris, vt folijs solani, plātaginis, hyoscyami. Adhibebis etiā emplastrum diacalcitheos, vino austero temperatū, cum galla, malicorio, cortice aristolochiæ, & alijs, huius naturæ: quibus deinde admiscere oportet oleum vetus, laurinum, aut farinā erui & lupinorū, & tandem digerente cataplasmate vtēris, quō fluxiones quiescant, & quod fluxum est digeratur.

Verū si carnis vlcēratæ vitia, restita fluxione, ex inueterata & immersa vitiosa humoris substantia habitualiter fixa, prodeant, adeo vt prædictis nequeant cedere auxilijs, & vlcus magis ea ratione sordescat, tunc quidē potentioribus vtēdum est. In quo opere sciat peritus Chirurgus, pharmacis cōposita virtute ex repellentibus & resicantibus prædictis huiusmodi vlcēra sanari: quę sane futura sunt magis aut minus efficaciora, prout vlcus vetustū aut minus inueteratū sit. Nam inter ipsa quædam sunt valida, quædam leuia, & quædā mediocria, quæ pro vlcēis resistentia, & corporis duritiē, aut mollitiē adhibenda sunt: leuius vtrūque ministerium exsiccationis & repulsionis præstant, malicorium, aristolochia, cortex capparidis: maioris sunt efficacię lemmia
terra

terra, cadmia ex aceto diu sub sole trita, calcithis combusta & lota, ærugo, calcanthum, misli, fori & his similia, vltatamen & lota. Valentius hæc omnia cruda, nō lota, neq; præparata, & omne aluminis genus: pari ratione methallicis omnibus cōmune est hoc beneficium præstare combustis & lotis in pueris & fœminis: sed horum medicamentorum maiorem tractationem reperies parte secunda. Cui muneri profunt ex compositis pharmacis plurima, quæ vsui securiora sunt & vtiliora, quod minus mordacia sūt, & minus irritent: quippe hæc plerumq; solent sordidius reddere vlcus, & iterum fluxionem concitare: quapropter prædicta medicamenta lanare, resiccare, & iterum in puluerem reducere, ac vino, ceræ, oleis, & gummi admiscere, necessum erit.

Quod si prædicta vlcera, quæ à fluxione inceperunt, diu perstent, & plurimum resistent cicatricem inducentibus, coniectare oportet veluti cacoëthe, & quæ ex contracto habituali carnis intemperamento præfunt, tractanda fore: quamobrem utriusque medebis per eadem medicamenta mineralia, nimirum vehementer desiccantia & resoluentia circa morsum. Verum ne hæc quidē prodesse quidquam possunt, nisi prius Hip. præcepto utaris, quo monuit, ut ab inveteratis vlcibus mittatur sanguis, ac si opus sit, iteretur missio, & cum vlcerata pars scalpello tectis labijs satis exhausta videatur (quod consilium ex vsu quoque erit in rotundis vlcibus, quæ nisi oblonga sūt, agrè etiam ad cicatricem veniunt.) tunc Gale.

Li. de vlc.

3. Mc. c. 8

& vbi

Institutionum Chirurgicalium

& vbi carne vlcus plenum fuerit, inducenda cicatrix erit, inspersa galla, acatia, hipocistide, malicorio, squama eris viti & loti, vel aliquo ex medicamentis cōpositis, huic vsui apud Chirurgos passim cōscrip- tis: cauētes tamen, ne, vel plus siccēt quā par sit, & callum inducant, aut minus, & vlcus prē humidū fiat, vel magis attrahant mordicatione, quā exsiccent moderato calore.

DE VLCERE VIRULENTO & corrosiuo, ac de sordido & putrido

INSTITVTIO. III.



IRVM Fortassis omnibus vi-
debitur, hæc vlcera inter se
adeo diuersa, & per diuersa capi-
ta distributa à plerisq; Medico-
rū, me vno hoc capite cōplexū
fuisse. Sed arbitretur studiosi
id nō sine cōsilio factū: quippe
virulentum & corrosiuum vl-
cus, propriū iuxorū nuncu-

parunt peritiores Medici: putridum etiam longē ele-
gantius sordidum appellabis. Et cū hæc duo excre-
menta, sanies nimirum, qua corrosiuum efficitur vl-
cus, & sordes, qua putridum redditur, eodemq; mo-
do in vlceribus fiant & comperiamus, & carnis, qua-
renus vlcerata est, sint propria & peculiaris excre-
menta: ob id simul vno hoc capite studui scribere
naturā & curationem, explicaturus etiā alias causas
vtriusque vitij in his vlceribus.

Ad veram integramque horum vlcerum cognitio-
nem & curationem, nosse oportet quod sæpius dictū
est

est à Gal. & reliquis Medicis, duo nimirū in omni vl-
cere succrescere excrementorū genera: alterū tenue, &
reliquū crassum: hoc quidē sordī secūdū naturā geni-
tē in carnis nutritione simillimū, illud verò excreme-
to, qđ prae tenuitate insensibiliter natura discutit in
eadē carnis generatione, assimilatur. Verū, quia pars
vulcerata caloris innati defectu, nequit in carnis pro-
ductione per insensibile halitū digerere, in tenuē hāc
vertit saniem, & quod in crassum assueuerat mutare
excrementū, in sordē vertit. Signū profectō summæ
vulcerū cruditatis: nā interim dū hęc excrementa nō
mutantur in pus, euidentissimū est summē esse crudū.
Quod si quis dixerit, in vulceris coctione, & carnis
generatione cū pure cōmisceri, & non apparere seor-
sum, nō mirabor. Sciendū tamen est, hęc duo excre-
menta signū esse cruditatis, quę si in malitiā & cōdi-
tionē corrosioni aut putredini inducendæ aprā cō-
migrauerint, nō solū crudū, sed & sordidū & putri-
laginosum vlcus generat. Quibus premisiss, vt cōstet
virulēti seu corrosiui vulceris, necnō & putridi, natura
& cōditio, statuēdū est, quod cū huiusmodi duo ex-
crementa, solū abundāt ea copia, quę vulceris magnitu-
dini respōdeat, & qualitate, quæ carni genitæ parum
dissimilis sit, vlcus citra virus & corrosionē, aut putri-
laginē & sorditiē præest. Verū si tenuis sanies acri,
mordaci, & virulēta cōditione fœdetur, vlcus corro-
siuū efficitur & virulētrū, hoc est virore plenū. Sic dū
sordes adeo putrescit, qđ fœtore & arnis putrilagine
& malitia abundet, vlcus sordidū & putrefactū dicitur.

Sed vt cuiusq; seorsum naturā & curationē meliūs
adipiscamur, statuēdū erit, virulentū & corrosiuū vl-
cus idē ferē esse, solū maiori aut minori malitia dif-
ferre: sic virulentum vlcus efficitur ab herpete, ero-
dentibus pustulis, & alijs vlceribus, violentioribus
pharmacis curatis, semper tū à succis biliosis, mordaci-
bus

Institutionum Chirurgicarum

cibus & vitiosis, qui aduersionē passi cacoethiam contraxerunt: ex quibus ad vlcera cōfluentibus, ixores, & sanies, quæ in vlcus instillant, virulentum ipsum efficiunt: corrosiuū verò fit, cū nō solū his succis ad carnem cōfluentibus pars nō alitur, sed & absumitur, abraditur, & depascendo sanā carnē denū exulcerant, quod ambulatiuū vlcus appellāt nōnulli, à Græcis nomades nūcupatū, quod vlcus cū putredine, corrosione & febre est, aut phagedena, qd sine febre & putredine, licet partes corrodat. In quo vlcere genere & carnem & vlcereis succos fluentes malignitate prædicta hæc mala perpeti est arbitrandum.

Quamobrem duplex erit curandi ratio: altera quæ fluxuro humori prouideat: reliqua verò quæ fluxo & carni ad quā fuit. Ad primū igitur accedēdo, diligenter curandū est, si forsan vacuatio aliqua antiqua suppressa sit, ipsam reuocare: sin aliter, & vitio vel recoris, vel totius corporis cacoehymī nāt humores, sanguinē quidem mittes, nō tamē copiosē, sed quātum par sit, vt & artēperamētū præstes, & viā purgātibus pharmacis pares: quibus per vices & intervalla vitæris, prout maiorem aut minorem senseris vitiosorum copia, aut indies magis generari. Quo facto, & visa ac victu alimētōrū boni succi infirmo, ad vlcereis prouidentia accedes: quippe si solū virulentū fuerit, ea adhibebis medicamēta mox à principio, quæ siccandi, refrigerandi & roborandi ac influxū repellendi & reprimendi vires habeant. Huius autē naturæ varia reperies scripta apud authores: nam prius vlcus ablacere oportet aquā plantaginis, rosacea, aluminosa aut chalybeata. Quo facto, supra vlcus defensiuum ex bolo appones, & in vlcere vnguentū de tutia, de minio, ex plumbo vsto & loto: nē emplastrū drapalma, liquatū oleo myrtino aut cytoniorū, superpositis linteis madidis vino nigro, decoctionis rosarum & coriicū

gra-

granatorū cum alumine, aut si ingens calor fuerit, ex posca. Quod si hec nō profuerint, ad efūcaciōra cō fugies, vt vnguentū ex stybio & lapide hematite, ex lithargyrio, are cōbustō & loto & spodio: ex quibus cum oleo myrtino, cyroniorū aut ophancino, varia poteris efformare vnguēta, aut linimenta, quę iāpius agitata in mortario plumbeo proficua erunt.

Quod si cum virulētia, carnis quoq; erosio adsit, maiora ex postulat auxilia: quāobré protinus vnguēto rubro vrēris, & mox puluere rubro Vigonis, superposito vnguēto ex tutia, aut plūbo, vel de minio. cū linteis desuper positis madidis oxicato. Prodest & vnguentū populeō cū puluere Vigonis aut arsenici. Verū si plurimum serpat, ferro candenti facilius cōpescēs, & necessario ad id veniendū erit, si primis diebus medicamenta non profuerint.

Sordidū verō & putrilaginosum vlcus id esse diximus in quo crassū illud excrementū adeō est copiosum, sordidū & putrilaginosum, vt mēbri etiā carnē mollē, viscidā & putridam reddat, cū crusta foetida, quę cadauerosum & foetidū vaporē spirat, vt aliquādo proximē accedat ad eithiomeni naturā & cōditionē, ob succi ad ipsum confluentis prauitatē, crassitiem & corrupti sanguinis naturā, quo generatur sordidissimum excrementū, nō ex cōctione residuum, sed summam arguens putredinem & malitiam, quod vlcēris genus appellarunt Græci Riparon.

In huius vlcēris curatione, præter vniuersalē prouidentia (quę exequenda venit, vt dictum est, & copiosius sanguine missō, & purgato nō semel corpore, ac per viētus eā institutionē, quę laudabilē sanguinē & reliquos succos nata sit generare) duplex erit curandi ratio: altera quę sorditiē auferat, quominus in vltioriē putredinē cōmigrēt: reliqua verō quę putredinē carnis & humoris inhibeat: & si quid puri-

Institutionum Chirurgicarum

dum est, omnino auferat. Primā exequeris per ea medicamenta, quæ plusquā mediocriter abstergant, vlcusq; abluant, principio habito ab hydromellite, aut aqua falsa, vel si distēperies calida intēsa sit, aqua hordei saccharata, vel fero lactis. Quo facto, vtēris vnguento Apostolorū, aut mūdificatio ex apio, vel medicamēto ex succo absynthij, melle rosaceo, myrrha & farina hordei, ad modum vnguēti facto. Quod si non profuerint, adicies modicum Aegyptiaci, vel pulueris Vigonis, aut vnguēti rubri, donec puris vestigium apparere incipiat: quo tēpore abstinēdū erit ab his medicamentis, & sensim ac paulatim adijcere oportet plus mellis rosacei aut sacchari: itē pānis desuper appositis posca madidis vtēris, vel defensusuo ex bolo. Quod si putrilaginem ex sorditie contrahere iā vlcus cōperias, & minimē sat esse, quæ vim habent abstergēdi, ad maiora & efficaciora auxilia deuenies. Primò tñ, quia semper huiusmodi vlcus calorē putredinosum sibi habet adiunctum, oxicato vlcus ablues, atq; aqua cineris: quo facto, vnguēto vtēris Aegyptiaco lixiuo diluto, vel aqua falsa, superpositis prædictis linteis, oxicato, aut vnguēto ex bolo iminctis: quod si non profuerit, ad puluerē Vigonis deuenies (maximē vbi putredo cānis grandior fuerit) adiecto modico alumine, maioris enim efficitur efficacię. Similiter præstat linimentum quod recipit Vitrioli partes sex, calcithidis partes quinque, tragacanthi partes quatuor, coquantur in aceto, & ex eis fiat linimentū. Præstat, si hæc nō profuerint, arsenicū sublimatum, vel cū modico sanguinis draconis admistum: quippe causticum medicamētū adstringētibz admistum lōge maioris efficitur efficacitæ: quāobrem id cautē facito. Quod si hæc nō sufficiāt, emplastrum ex farinis & oxumellite adhibere oportet, & carnem prius aqua argentariorum vres; aut igne, donec

donec putredinem cessasse comperias: quo tempore modicè siccis vti sufficiet, donec pus appareat, & iterum ad abstergentia & carnem generantia deuenies.

DE FISTVLIS ET VLCE-
ribus cauernosis
INSTITVTIO. IIII.



On sine magna cōsideratione fistulosum & cauernosum vlcus hoc vno capite completi institui: siquidem nulla alia interstat differentia, quā quòd fistulosum vlcus nil aliud sit, quā cauernosum cum callositate & duritie aliqua: quippe in vtraq; vlcus sorte orificia adsunt stricta, profunditas verò in latum se diffundit, & sensui occulta est, cū multis anfractibus rectis aut obliquis. Quo fit, vt Latini optima ratione si nū appellauerint huiusmodi cauernosū aut fistulosū vlcus. Et quāuis fistule seu sinus breues sint, recti, flexuosi, simplices, aut plures, nil ad curationē interesse videtur, nisi cū huiusmodi sinus vel deorsum altè penetrant, aut ad ossa vel cartilaginem subeunt, aut ad cavitatem alicuius membri, vbi aliquid secundum naturam & vsui vitæ cōtinetur. Quare nisi facto ex aduerso emissario antequā pus ad nuper dictas partes perueniat, nihil omnino profeceris, cum non cōtingit, saniem vel ex orificij commoditate, vel ex membri situ, facile effluere posse.

Sunt autem causæ sinuosi vlcus, vulnera perperā curata, vel abscessus tardius quā par sit diruptus: denique cū pus vel non probè aut citò expurgatur,

Cause.

Institutionum Chirurgicalium.

tur, sed alrè procedit, aut diu in carne immoratur, & cretam & malignam acquirit naturam, qua faciliè carnè hinc inde exedit, & cuniculos ac sinus seu fistulas excavat, quæ deinceps difficulter ob prauam conditionem carnî impressam coalescent, aut carne impleri potest, tum ob id, tum verò quia succrescit protinus maior vitiosorum humorum fluxus, qui prædicta vlcera difficulter sanabilia efficit.

Signa

et præ-

sagium.

ad Gla.

Quòd si cereis candelis aut plûbeo argenteo ve in strumento, vel quouis alio specillo, vel ex reticò pure, & postea exeunte, facta in partibz vicinis cõprelsione cõiicias sinuosum esse factû, necnò ex colore puris, quod simile sit loturæ carnis, cõsiderabis Gal. sententiã, quæ in hũc modũ se habet. An verò alrè sinus partes coaluerint, ex manãre sanie deprehendes, si ea multa, vel pauca, cocta vel cruda sit. Præterea si neque in ipso sinu dolor sentiat, nec tumor appareat, sed totus locus æquabilis sit, siccus ac doloris expers. Quòd si puris pbe cocti portio exigua in ore cõspiciatur, multò magis de glutinãdo sinu sperãdu est.

Curatio

Cũ antea dictũ sit à Gal. fieri minimè posse, ut in vlcere vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, aut cicatricis inductio rectè vnquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat, ob id profectò in horum vlcerũ curatione quinque necessariò peritus Chirurgus considerare diligenter, & efficere tenetur. Primum quidem subiectam carnem pro naturali modo reddere: quod faciet duobus modis: vno, si remouerit inpediẽs, quæ præfuit, ut intèperie, tumore, gãgrenã, vel quid aliud extraneum vel præter naturã, ex his, quæ sanitarẽ & carnis generationem remorari affolèt: altero verò semotis ipsius vlceris excrementis. Nã cũ in ipsa nouæ carnis generatione duplex prouenire excrementum necessum sit, alterũ quidẽ crassius, quod sordes proprie

prie appellatur, & alterū tenuius, quod sanica dicitur: & cū ex hoc tenui vlcus humidum efficiatur, & ex crasso sordidū, duplicibus ob id sinuosum vlcus egebit medicamentis, antequā carne impleatur, siccantibus nimirū & extergentibus: his quidē vt forde careat vlceris caro, illis verō vt superflua humiditate quoque orbetur, quo proximius sanę carni accedit affeeta particula, licet neutrum horū verē sarcoticū dici mereatur, vt li. 2. c. de carnē generantibus, latius leges. Quo fit, vt sanationis ordo in horū vlcerū curatione, a forde expurganda, & exsiccanda humiditate initiūumat: si quidē neque glutinari quidquā, neque carne impleri potest antequā ab his excrementis immune reddatur. Quibus factis, verē sarcotica pharmaca adhibenda sunt, quæ nō has humiditates, quibus vlcus abundat, exsiccet, sed ipsam carnē, quę mollior, quā par sit, gignitur, sicciorē, & sanę carni similiore reddat. Post quę agglutinantibus auxilijs vtēris, quę austera & adstringentia vocatur. Itaque hæc dicta sunt, si nihil carnis generationē impediāt: verū si figura aut situs ipsius sinus eius cōditionis aut positura sit, quod deorsum vergat, aut ad lat⁹ declinet, vel intro feratur, quo libere sanies effluere nō possit, minime poteris ad cicatricem vlcus ducere, nisi prius collectioni purulētæ effluxū molliaris. Quod sanē opus duobus modis efficere poteris: nimirū vel factio in imo vulnere foramine (cū in parte est vlcus magnis venis aut arterijs & nervis intertexta, vel cutis crassa) vel cavitare dissecta, cū vel partis ignobilitas patitur, vel cutis adeo est tenuis, quod sperandum sit nō posse coalescere. Denique nisi vlcus magnū sit, & locus periculosus, præstabit potius totam ipsius sinus cavitare disseccare, quam ex aduerso plagam efficere: nā sic facilius & citius, ad sanitatē vlcus perducitur. Quod si feceris, elichinis vniuersā cavitare replebis,

Institutionum Chirurgicarum

& medicamentis repurgabis ac desiccabis, donec carne genita vlcus impleatur, & ad perfectam cicatricem perueniat. Cæterum si in parte contraria solum apertio facta sit, flamulam lineâ aut ex filamentis canabinis poteris per virumque foramen ad setonis modum immittere, & eis medicamentis illinis, quæ siccandi & abstergendi vires habeant, donec constiterit difficilius flamulam permeare, & sic elichino altero & infimo foramine appposito, supremum coalescere fines.

Verum si neque in imo ipsius sinuosi vlcus plaça commodè fieri possit, neque cavitās vniuersa diffecari, eluere cavitatem oportebit, deterforijs primo, ad inhærentes sanies abluendas, deinde sarco-
ad Glā. ticiis, ac mox agglutinâibus vteris. Primo vsui Gal. mellicrarum adhibuit, postea vinū, ac nonnunquam mulsum: quæ omnia tantū sunt adhibenda maioris efficaciz, quantum sordes viscosiores maligniorque fuerit & putredinosa. Sic lixiuis aut aqua aluminosa vel salina vtendū erit, admisto Aegyptiaco vnguento, vel ipso solo cum oximellite. His factis, considerandum est, an sinuosum vlcus, præcalidum sit, aut frigidum: nam si primum, facile in virulentum commigrat, & abluī desiderat mellicrato decoctionis lenium, rosarum, hordei & balaustiorum: si verò secundum, multa ex decoctione absynthij, marrubij, pimpinellæ & myrrhæ. Quo facto, ligatura expulsiua, & medicamentis exsiccantibus generantibusq; carnem vteris, appposito puluinari vel spongia vino stiptico madida, comprimens ligaturam à parte contraria & infima ad foramen ipsum, quo facilius expiret sanies, & minus in parte caua colligi possit.

Quod si iam sinus in callosam intrinsecamq; superficiem commigrauerit, fistulosam naturam adeptum fuisse erit coniectandum, quæ nil aliud est, quàm ob-

oblongus artusque & callosus finus, qui ex abscessu indexterè curato & alijs vlceribus, ferè indolens suboritur: item vt Hippoc. refert, ex contusionibus, & ex frequenti æquitatione. Cuius morbi multiplices sunt differentiæ, quæ (veluti in finu diximus) ex sitû, figura, numero, & magnitudine defumitur. Quarum perfecti aliæ sub cute extenduntur, nonnullæ altius penetrant, & ex his quædam intra carnem desinunt, nonnullæ ad ossa & cartilaginem permeant, vel ad nervos, venas, arterias aut ad cavitatem aliquâ perueniunt: atque vel tortuosè, vel rectè procedunt. Nec mirandum est Gal. dixisse, posse fistulosum vlcus citra callositatem esse, cum sat fuerit, ad constituendam differentiam inter ipsam & cauernosum, fistulam carne esse obductam alba, compressa, atque continua, citra humiditatem & dolorem, & Paulus etiam statuit.

Li. de fistulis.

2. ad Gla.
Li. de turg.
mo. præ.
natu.
Li. 6. c. 77

Præmissa hac distinctione, nosces fistulosum esse vlcus à callosa cavitare, quæ huius mali natura est: item ab accidentibus, vt virulentia horribili ab ipsis cavitatibus emanante: sint verò plures finus, an vna simplex cavititas, venaberis cerea candela, aut plumbeo instrumento: item quòd varijs corporis posituris, aut manus compressionibus, supra vlcus exit pus: quod si ex carne exierit, leue, albū & copiosius erit: ex nervo tenuius, cui accedit dolor, stupor, & punctiōis sensus motu membri imminuto. Pari ratione ex vena erosa sanguinolentus humor fuit: si verò arteria, flauior tenuisque sanguis cum frigore: exhibet: os verò detectum facile specillo deprehendes.

Signa.

Fistulosi vlceris curatio facilior perfectò erit, si ipsum sit simplex, recens & solū intra carnem, & in corpore iuuenili: difficilior verò, vt Hippocreat. docuerat, si os vel cartilaginem vel neruū, musculos,

Curatio.

Libr. de coactis.

Institutionum Chirurgicarum

aut articulos occupauerit, vel ad vesicam aut pulmo-
 nes, uterum, thoracem, guttur, ventriculum aut inte-
 stina permeauerit. Quibus maior accedit difficultas,
 si vetus sit, & per ipsum natura se se expurgare assue-
 ra fuerit: maximè in corpore senili, valetudinario,
 aut alios morbos per eam partem purgare assue-
 rit, quas curare omnino periculosum erit, sicut hamor-
 rhoides: quare vel aliquā relinques, vel cura lenien-
 te precauabis, ne in maius malum degeneret: sic enim
 2. progn. consuloit Hippoc. Verū si curare non potueris, sin-
 64. gulis annis corpus purgabis, ter quaterve in anno, &
 65. popu. parti appones diachylonē cum puluere ireos, aut dia-
 2. 3. palma, vel puluerem corij bufonis combusti, & partē
 abluēs vinō decoctionis ligni sancti, & potui dabis
 decoctum agrimonīæ, plātaginis & foliorum oliuæ
 cum ligno Guayaco. Idem facies decocto lentis-
 ci, quod mirum in modum huic vsui præstat. Quod si
 curare studueris, constat communi Chirurgorum
 consensu, quatuor esse peragenda. Primum, ora, seu
 foramen. (quod de natura huius vlceris sit, strictis-
 simum esse) dilatare: secundum, callosam duritiem
 euellere aut stirpare: tertium, abstergere & exsicca-
 re sordes & sanies, sicut in reliquis vlceribus: & quar-
 tum, his quæ carnem generant: vii, donec cicatri-
 cem inducentibus vtaris.

Circa primum, multis modis peritiores Chirurgo-
 rum assuescunt patentius reddere foramen: tum
 scissione dilando, tum igne, tum verò medica-
 mentis, si reliqua non tulerit patienter laborans:
 huius naturæ est spongiæ penicillus filo liga-
 tus, & in foramen immisus: quod si satis non
 sit, & velis simul callosam substantiam abrade-
 re, intinges prædictum penicillum vnguento quod
 fit

fit ex ceræ & resinæ, ana vncia vna, arsenici drachma vna, quibus liquefactis & admixtis, inringitur elichinum, & apponitur duodecim horarum spatio. Præstat eundem vsum gentianæ radix, aut aristolochiæ, vel brioniæ, aut drachoncij. Quo facto, vt facilius quò tendat, & quam partem attingat fistula, cognoscere possis, si nec venas grandiores, nec arterias, aut nervos scindendo læsurus sis, vno è tribus modis fistulam curare, & extirpare aggredieris, quod secundo loco esse agendum proposuimus: primo medicamentis acrioribus & callum erodere potentibus: secundo incisisione totius sinus cum calli auulsione: tertio per visionem sinu sufficienter aperto. Callos etenim extirpant multa, velut radix asphodeli circumrarsa & fistulis imposita: item trochisci asphodelorum. Ea etiam medicamenta, quæ sunt ex calce & sapone: sed vtiliores sunt quæ arsenico conficiuntur: item trochisci ex minio. Prodest infusio, quæ recipit vnguenti Aegyptiaci. ℞. s. sublimati. 3. s. lixiij. ℞. iij. aquæ rosarum. ℞j. aquæ plantaginis. ℞. i i i j. bulliant vique ad consumptionem tertiæ partis: quod si efficacius efficere velis, arsenici scrupulum vnum addere poteris. Quo medicamento iniecto, mox vlceris os claudes, ne protinus effluat, aut penicillis eo madidis replebis. Prodest & aqua argentariorum: item ex aridis medicamentis aliquid intus per fistulam exussando immittes, superposito vnguento ex bolo, aut alio ex defenuis pharmacis. Aufertur secundo modo callosa substantia, discisso vniuerso sinu (si aliquid ex his quæ diximus non venerit) & ferro candenti, aqua argentariorum, aut alio exnumeratis causticis exussio & abrafo callos interna

interim tamen mitigatorium aliquod medicamentū admiscebis, & mox quæ crustas emolliant & illidant. Tertiò verò callus auferitur, post totius sinus apertionem, vnguibus aut scalpello euulso ac separato radicitus callo, ita vt sinus ex toto carneus appareat, callo omnino extirpato.

Quod autem tertio loco post calli abscissionē, aut abrasionem, diximus efficiendum fore, est proculdubio abitergere & exsiccare sordem & tenuem sanie, quæ mox callo extracto necessariò succrescent. Quod facies melle aut vino, aut aqua ebulli & melle rosaceo: vel eo. q. r. terebintina in aqua vitæ abluta. 3. ij. succi api, succi cynoglossi singulorū. 3. vj. farinæ lupinorum. 3. f. melis rosati. 3. f. aristolochiæ rotundæ. 3. ij. coquantur succi & terebintina cum melle rosaceo vsque ad consumptionem medietatis succi, & mox reliqua cōmisceto. Cui medicamento deinceps addes, myrrhæ, sarcocollæ, radicis pencedanaridæ & iridis singulorum momentum, quo vitæ vsque ad integrū carnis cōplementū, si quid præter naturam supercrescens non vetuerit: & reliqua veluti in omnibus alijs vlceribus facito.

DE VLCERE CANCROSO INSTITVTIO. V.



Cogni-
tio.

VM de cancro, prout solum dicitur quantum genus tumorum præter naturam, abunde prima huius tractatus parte actum sit; nunc in animo est, tantum de vlcere cancroso, seu de cancro vlcerato differere. Hoc sane maium vt cognoscatur,

tur, præ se fert dolorem, & duritiẽ cū vlcere eroso, inæquali & sordidissimo, atque labris prætumidis, inæqualiter duris, cum aspectu graui & horrẽdo, ex concreta humorum colluue, fæculenta, liuida, & interdum subrubra & cruenta, cū sanie aquosa, nigra aut fulua & grauiter olente: insuper habet in circui tu venas luefcentes, tumidas & aliquando varicosas. Cuius vlceris natura adeò est difficilis & perniciofa, vt si curare tentes, aut secus, rarò aut nunquam sanitati integræ restitues. Multis etiam nominibus à Chirurgis insignitur, iuxta naturam partis affecte: quippe in facie & labijs appellatur noli me tangere, in dorso ac ventre cingulus, sicut in cia aut iuxta nares lupus.

Fit propriè vlcus cancriforme ex nõ vlcerato cæcro, *Cause.* confluyente succo tenui, acri & erodenti ac præcalido, qui exulcerationem mollitur, item ex vlcere prauè curato, & exacerbato validioribus pharmacis.

Cognita huius vlceris deterrima & fraudulenta, atque edaci & exedeti natura (cuius latius meminimus cap. de cancro, & lib. de mulierum affectionibus) siue cures radicitus, siue leniter & blandè, eam victus & vitæ formam institues, quæ humori melancholico, vel adusto gignendo idonea non sit, sed ad frigidũ & humidum vergens, constansque ex cibarijs boni succi: curabis enim animi passiones prorsus vitare, aut compescere, exercitium interdicere, & habitationem temperatam eligere.

Quibus sic institutis, duplex erit curandi via: vna *Curati* quæ malum radicitus euellere docet: altera verò quæ leniter agens, solùm ei studet augmentum interdicere. Quæ verò harum ytendum sit, docet etas & con

con

Institutionum Chirurgicalium

conditio malis: nam si inueteratum vlcus non sit, neque nimis adhærens internis partibus & ossibus, aut iuxta magnas venas & arterias ac nervos, neque laborans timidus & imbecillus, verendum non est, radicalitus ipsum extirpare. Quod si contrarias prorsus sortiatur conditiones, curati longè citius pereunt. Verùm si curare aggrediaris, id quidem cautè facito, multa enim sunt quæ consulere possunt in his vlceribus manus continere, vt libr. de mulierum affectionibus longiùs scripsimus. Fieri tamen potest vno è duobus modis: primo per caustica & erodentia medicamenta, qualis naturæ est arsenicum: cuius administratio, licet Guidoni & reliquis placeat, adeò est vlceris prava & maligna conditio, quod longè faciliùs excitetur, earque indeterius his medicamentis, quàm quod possit aliquod suscipere beneficium. Et ob id consulo, ne hac curandi via utaris, nisi in mammis, vbi carnis vberitas perferre poterit, appositis tamen desuper defensivis, & alijs auxilijs, quæ nouum prauorum succorum affluxum prohibeant. Quod si oportuerit, ob rationes superiùs adductas, radicalitus euellere, comprehensa vndique totius vlceris duritie, & nouacula excissa, expressoque sanguine melancholico & faculento ibidem immoràte efficies, vt consulerat Galen. maximè si corpus vniuersum priùs sufficienter purgaueris. Auulsa itaque cancrofa carne, & vndique duritie excissa, ferro candenti partem (si quid non venierit) inures, quo nihil supersit iterum reuersurum: cum hoc tamen Cellus parum fudit his curationibus, cum adhuc inducta cicatrice, iterum morbum reuerti sæpius contingat, aut superesse vlcus non minus cancrosum, quàm quod præfuerit. Quamobrem peritiores & sapientiores Medici, lemen-

Li. i. 4. me.

re solūm vtuntur curatione: cui vsui tria exequ-
ris, quæ maioris solent esse momenti: primum in for-
minis, quæ nondum ad vetustatem venerint: quippe
bis terve in anno mittes sanguinem, præsertim ex
talo, etiam si menstruationis tempus præterierit:
vel aliquando hæmorrhoides propocabis. Purga-
re igitur frequentius oportet, maximè autumnō &
hyeme vsque ad veris principium. Secundū sit, fon-
tanellam aperire ea parte, quæ directius vlcerata
correspondeat, quæ facilius expiret virus illuc itu-
ram. Tertium sit, ea omnia adhibere medicamenta,
quæ vim habeant leniendi dolorem & partem fir-
mandi, quo minus recipiat: item refrigerandi atque
siccandi, minimè verò mordendi efficaciam sor-
tiantur. Huius naturæ sunt quæ ex mineralibus
vstis & lotis fiunt, maximè ex plumbo, & vt con-
sulit Galen. lamina plumbea supra partem posita. 9. Simp.
Item solani succus atque aqua ex vsu est, sicut
vnguentum ex tutia & lithargyrio, ex plumbo vsto
& loro. Sic solani succus panno lineo imbutus, su-
pra vlcus appositus, mirum in modum prodest, ma-
ximè si in mortario plumbeo agitaueris & postea
refrigeraueris. Item vnguentum quod sit ex ar-
genti spuma, cerusa & oleo rosaceo in mortario
plumbeo agitat, donec colorem plumbi acqui-
rat. Prodest & aliud quod recipit plumbi vsti &
loti, pompholigis & thuris, ana. ℥.ij. f. absynthij. ℥.f.
olei rosacei lib. f. succi solani & ceræ quod satis
vt fiat vnguentum. Idem beneficium præstat, &
lenit dolorem cataplasma ex somno, papauere, co-
riandro, polygono & cichorio. Ferunt etiam pro-
desse appositionem carnum gallinarum supra vl-
cus ipsum: verum quia hac in parte solū mens
est, instituere Chirugos in his quæ vniuersalia
sunt,

InstitutionumChirurgicarum

sunt, particularium solummodò appositis exemplis, curationes specialiores non scripsi, relegans lectorem ad scriptores Chirurgoſ, in quibus copioſè ſcripta ſunt peculiaria cuique parti affectu proficua: & hac ratione huius primę partis hîc eſto ſinis.

(?)

Finis primę partis.

INSTITVTIONVM

partim ad Chirurgos, partim ad
Medicos attinen-
tium

LIBER SECVNDVS.



VLLVM esse in Medicina
auxilium quod vtile futu-
rum sit, nisi recta admini-
stratione & vsu adhibea-
tur, probat ratio, & confir-
mat experimentum, in de-
terius mutatis affectioni-
bus, ex indextero praesidio-
rum vsu, cum alijs praesti-

terint salutem. Quod noscens Hippoc. dixit: Quæ
enim profuerunt, ob rectum usum profuerunt: quæ
verò nocuerunt, ob id quòd non rectè vsurpata
sunt nocuerunt. Quapropter (inquit eadem parte)
scire quidem oportet de singulis optima in omni
arte, vti verò ijs, quæ singulis vicibus idonea visa
fuerint. Ob id profecto in quouis praesidio hac &
plura alia vnicuique peculiariter sunt diligenter confi-
deranda. Namque non sat est Medico docto, nosse
vni repellentibus, supparantibus, discutientibus, aut
quibus suis alijs peculiaribus praesidijs, nō exactè no-
uerit ea mutare, materiamque aptam inuenire, prout
partis conditio & morbi status tulerint. Quamobrem
primò ~~vniversaliū~~ omnium topicorum rationē

Li. de ar-
te.

Institutionum Chirurgicarum

vno capite docebo: deinde per singula capita distribuam topica ipsa auxilia, & cuiusque propriam vtendi rationem.

DE TOPICORVM AVXILIORVM administratione in genere

INSTITVTIO I.



VO potissimum curaturus sibi (cum ad particularium auxiliorum administrationem conscendit) ante omnia proponat necessum est. Primum quod memorie Hippoc. prodidisse profertur, nimirum vniuersalia medicamenta omnino per-

Li. de op.
sect. ad
Tra.

discere, eorumque facultates, tam simplices quam compositas, & speciatim prout singulis naturis & cuiusque corporis discrimini conueniant, prius quam ad artis doctrinam exercendam Medicus admitti debeat. Quod etiam Galen. alijs verbis protulerat dicens: Ad sanitatem retinendam & morbos tollendos, nocentium vsus fugiendus est, quod ad materiam adhibendam notitiam experientia potens atque utilis est. Secundum quod prae manibus habere debet, est notitia partium corporis, vt in vnaquaque diligenter disquirat quae sit eius natura, quae constitutio, quale temperamentum: rimari item actionem, posituram, formationem, potentiam, humorum discrimina oportet: morborum etiam quae plurima genera, differetias, causas, accidentia, quae
liter.

literque singula in singulis adiuvant, & mox quantum ab statu naturali fortè recedat. Quippe non fat est, ea quæ nuper diximus nosse, ni exactè vti valuerimus præfidijs adinuentis, iuxta ea quæ de partibus cognitu esse necessaria diximus. Nam idè auxiliij genus, resoluventium exempli gratia, aut repellentium, & similitum, diuersam sæpe exposcit materiam, diuersasque methodos & rationes, à partis diuersitate sumpta indicatione. Quod elegantissima oratione dixerat Hippocrat. his verbis. Morborum autem omnium vnus & idem modus est, locus verò ipse eorum differentiam facit. Sunt autem omnium topicorum simplicia genera: (præter ea quæ simpliciter calfacere, humectare & exsiccare singulas particulas valent: quorum vtilissimam & longissimam tractationem denuo additâ reperiēs tom. 21. de recto præsid. vsu) quæ adstringunt, quæ laxant, quæ emolliunt, quæ aperiunt, quæ obturant, quæ attrahunt, quæ repellunt, quæ pus mouent, quæ resoluunt, quæ abstergunt, & quæ abluunt: scarotica itè, glutinâtia, epulotica, caustica, anodyna, & vltimò roborantia, præter alia quæ minoris sunt momenti.

Li. de fla.

Præterea in gratiam omnium topicorum scire oportet, hæc omnia auxiliorum genera ab affectus natura & tēpore, veluti iure indicari iuxta causæ & affectus dispositionē. Sic humores qui in parte aliqua recōduntur, aut repulsionē, aut suppurationē, aut discutionē desiderant, pro humorum qualitate & tēpore affectu, sicuti quæ sordida sunt, absterfionem, & quæ dissoluta vnionē, & sic pari ratione de omnibus alijs affectibus. Ceterū materia, qua quoduis auxiliij genus, & quousq; & quomodo ea liceat vti, præscribit etiā particulæ ratio, & insuper præ-

Institutionum Chirurgicarum

experimentum. Alijs namque simplicibus constant repellentia, suppurantia & resoluentia (& sic de reliquis) quæ oculis debentur, alijs quæ cerebro, alijs quæ vetriculo, & sic facta computatione aliarum partium, vt mox docebo, si prius dixero quædam omnibus communia.

In gratiam huius institutionis differere oportet, an semper expediat ante topicorum adhibitionem vniuersalem prouidentia præmittere. In qua re itatuendum est, quatuor esse in vniuersum morborum sortes. Prima est, in æperaturæ habitus parti accidens, ac alimentum vitians citra humoris aduentum: cuius curatio nullam, neque per sanguinis detractionem, nec per purgationem, requirit prouidentiam, sed solis gaudet alterantibus. Secunda non raro euenit, vt humoris fex & vapor parti impressus aduenientem humorem conspurcet ac vitiet: quamobrem requirit hoc affectionis genus, non corporis agitationem aut purgationem, sed deobstructionem & discussionem materię parti affixæ, per euaporantia sudorificaq; & deobstruentia auxilia. Tertia species fit sæpius, cum partis affectio materialis sit, pendensq; non à toto, sed à superiori aliquo membro, vt thoracis morbus, à vitio capitis. In qua affectus genere præcedat prouidentia oportet, non tamen totius sed partis primò mandans fluxionem. Quo fit, vt errent, qui vt capitis purgationem regulatūis videantur egisse, totum corpus medicamentis purgantibus, citra ullam indigentiam turbant. Superest sola quarta differētia materialis affectus, pendensq; à toto, quæ iure optimo purgatam corpūs, aut sanguine euacuatam, ante localium adhibitionē, expouulat, vt Galenus statuerat dicens: Particularem affectionem si leuis

leuis est, solis ad laborantem particulam remedijs curari, quod etiam Trallianus confirmauerat. Denique solum in quarto morborum genere vt edum prouidentia est, vt ex Hipp. constat dicente: Primū igitur ventrem purgare oportet sursum ac deorsum, deinde vteros subductio medicamento: & alibi inquit: Quapropter optimum est purgare totū corpus prius, & post ipsos vteros. At in reliquis morbis extra quartum genus, citra vllam prouidentiam particularis curatio adhibenda est.

Li. i. c. ii
Lib. i. de
mor. mul.
Li. 2. de
mor. m.

Præterea statuendum est, tantam esse particulæ dignitatem & præstantiam, vt nullum auxilia possint præstare beneficium, nisi in ordine ad ipsam dirigantur. Namque vt Galen. asserit, auxilij genus ex morbi specie exquirere oportet, cæterum speciem, materiæ modum & pleraque alia que in auxilijs considerantur, particulæ natura & differentia citra dubitationem præscribunt, alioquin Medici decepti morbi natura, imprudentes & inordinatè auxilijs uterentur. Particulæ enim natura temperies debitam præsidiorum mensuram præscribit, ipsius verò substantia alterantium moderatur quantitatem, & vacuandi modum, & locum ostendit finis partium & connexio. Sic partium acutus sensus aut obtusus modum suo modo ponit: dignitas item & officiū multa in executione præsidiorum docent, citra que, præsidia aut nocēt, aut irrita sunt & nullius momenti. Partis itaque situs & connexio multa docent in affectuum curatione, vt mille in locis Gale. docuerat, nam inquit. Quod si particula affecta in penitioribus sit locis, machinari oportet insuper tale inuenire remedium salubre, cuius vis nequaquam antea in itinere soluitur: si itaque calidius esse oportuit, eo quod est

2. ad Gla.
7. etho.
3. thea

Institutionum Chirurgicalium

moderatum, non solum tantam habeat caliditatem, quantum exigit morbus, sed ultra eam mensuram tantum adijciatur, quantum ex situ, ut perungere possit ad locum patientem, necessarium sit, si vero frigidius, non simpliciter tantum frigiditatem oportet augere, sed & materia quoque prius est aduertenda: si enim crassa sit, non admodum poterit ad profunda penetrare, sed potius contrarium præstabit affectum, spissando superficiem. At si tenuioribus constet partibus, poterit sane plurimum subire profundum, id enim etiam in humectantibus & exsiccantibus accidit. Considerare itaque oportet, quot numero partes permeat medicamentum, antequam ad partem affectam deducatur, ut pro ratione itineris eius vim augeamus. Exemplum quidem est id quod de pulmone fertur, quod è ventriculo in iecur, venam caavam & cor, tandem ad pulmones debetur: cui certum est in hisce partibus humoribus admisceri, & mutationem ac alterationem quandam perpeti: quapropter quod virtutis eius superest, minus omnino ac hebetius est, quam ut læsam particulam sanare possit: quo fit, ut intendi necessarium oporteat, quare medicamenti, siue id foris adhiberi, siue deuorari debeat, vires non præfentes, sed quales dum ad affectum locum peruenerint, futurę sunt, considerandę.

Præterea confert situs partium mirum in modum, ad vacationem, reuulsionem seu deruasionem moliendam, ut prima harum institutionum parte abunde probatum est. Sic partium figura mille modis ex usu est, & figuris instrumentorum efficiendis, & effingendis præsidiorum etiam figuris:

guris: cuius rei testis est Hippocrat. qui in hunc modum refert. Multæ verò etiam aliæ & extra & intra corpus figuratæ species sunt, quæ magnopere inter se differunt, quod ad affectiones pertinet, tum ægro, tum sano: namque alijs vimur instrumentis ad vterum dum afficitur, alijs ad vesicam, alijs ad intestina crassa: quippe in hæc per clysteres, in vterum per metranchitam idoneorum aliquid injicimus: sic in vesicam per indirectè foratas fistulas, quas syphones rectos appellant. Denique tanti est momenti situs, figura & connexio partium, ut hæc Hippocrat. protulerit verba. Verùm hoc studio habere oportet, ut proximum exitum facias, siue infernè, siue supernè, aut etiam alia aliqua corporis parte ubi exitus sunt: & subdit dicens: Cæterum morbi ea parte qua proximi sunt, & qua parte singulis exitus quàm proximus est, extrahendi.

Li. de vër.
medic.

Li. de loc.
in hom.

His suppositis, dignitas & præstantia partis non minorem sibi abrogat partem in moderandis merendisq; auxiliorum viribus, licet in simplici alteratione parum aberrat à convenienti refrigeratione, calfactione, humectatione & exsiccatione: nihilominus tamen in alijs medicamentorum generibus, præsertim his quibus aliquid notari dignum à particula expellitur, aut naturam & facultatem membri vim & iacturam pati posse speramus, conducit quidem plurimum, ut ex Gal. multis in locis colligitur. Niam quo particula præstantius & magis commune obrinuerit officium, eo prudentius & cautius vacuari aut laxari desiderat, cum nō sibi soli vires obtinere teneatur, sed & reliquis. In qua re diligenter considerare

Li. 3. arti.
med.

Li. 3. metho.

Institutionum Chirurgicarum

oportet, an pars quæ afficitur, de earum numero sit, quæ totius corporis communes vires habent, an etiam alteri parti communem actionem, an commune quidem, sed cuius actio ad vitam necessaria non est, licet ministerium præstet ad vitam necessarium: vltimò verò, an priuatam ac propriam, an aduentitiam & subseruientem. Vires quidẽ communes habent cerebrum, iecur & testes, in quibus non leuis habenda est de robore virium sollicitudo: ventriculus quidem ad portionem iecoris se habet, yterus non item. Virtutes etenim habent communes, & actiones ad vitam necessarias, cæterum per ministerium alteri membro ad vitam necessario, vt lien, vtraque vesica, venter inferior, thorax, pulmo, aspera arteria & fauces: ex quibus quam primum vacuare redundantiam licet, dum modò ne quid nimis dissoluatur. Priuatam item particulam ac sibi seruientem non offendes, si aut euacues, aut laxes, aut quomodolibet alteres. Cæterum in alijs primi aut secundi generis partibus, nusquam quæ vehementer laxent ac disculant, sunt adhibenda, quin tantum eius medicamenti, quod roborandi & adstringendi vires obtineat adijciamus, quantum membri vires periclitari, ac proprię substantiæ & spirituum dissolui contecerimus: siquidem virtus & robur sibi & alijs obtinere tenentur. Et ob id laudauit Galen. vsum adstringentium in his membris, vbi eorum, quæ tenui sunt partium, aliquid admisceamus penetrationis gratia, quam adstringentia remorantur. Particula etiam exactior sensus suam in adhibendis auxilijs præstat considerationem nam quæ acuti sunt sensus partes, miriora expostulant medicamenta, quam affectus desideret: at vbi tardus hebesque sit sensus, in his proculdubio

Lib. artis
med.

bio aliter, quia quod iustum est porrigi potest. Itaque partes docent, & sui temperiem, & reliqua quæ diximus: ad quorum integram notitiam, maximam præstat utilitatem totius corporis scientia. Namque puerorum corpora, foeminarum, iuuenū, senum, item & eunuchorum, non nihil etiam euar-
 riant à communi auxiliorum materia: sicut & anni tempus, & regio. Cum hoc tamen dum morbus gra-
 uis est, non statim à principio consideranda est ex toto particulæ natura, sed modicum, tantū ipsam respicientes, est adascendum, augendum tamen quod particulam tueatur, quo magis remedia pro-
 sunt, & morbus decrescit: nam eo tempore plus præ-
 ualet particulæ indicatio. Secus tamen res se habet in vacuantibus auxilijs, in quibus partis tantū quod
 ficiū à principio magnificare oportet: nam sæpe ex euacuationibus circa affectus principia inconsi-
 deratis, aut facultas in medio itineris subsidet &
 & labitur, aut mēbro principaliori imbecillo facto, denuo alter affectus grauior succrescit.

Ex qua doctrina non leue suboritur dubium vtra harum indicationum, membri ne, an morbi præstantior sit: quod hac lege dirimere studui. Quod si è duobus alterum agnoscat, ignorato reliquo, multo præstat agnosci affectus speciem, ex quo summum genus curantis præsidij præspici-
 tur, licet ad indiuiduas differentias (quod conan-
 dum est) non descendatur. Nouit aliquis laborare calore hominis viscera, num verò is calor hepar, an renes, an ventriculum occupet, perperuum non
 habet, verū cum hoc frigorifica adhibebit præsi-
 dia. Qui verò intelligens morbum ex capite pen-
 dere, secum non decernit mali naturam & morbi
 originem, is ne genus quidem auxiliij decernit, &

Institutionum Chirurgicarum

Li. art. me
di. 94.

inops consilij pendet animi, summa & maxima affectus cognitione destitutus. Verum cum species pauca & in genere doceat, si ambo illa Medico perspecta sint, & in dubiū reuocatur vtra sit præstantior, locus multo plura & magis indiuidua præstat. Quo fit, vt Galen. asserat, quod vtraque cognita impari vsum curanti præbeat, maiorem locus, affectus minorem. Cum hoc tamen minor illa potior est ea quæ plures præstat: nam quanto grauius est genus ignorare, quia totum ignoratur, quàm species, quæ ignorata ignoratur solum pars, tanto præstantior est indicatio à morbo, indicatione quæ à parte sumitur.

DE EVACVATIONE QUÆ fit à parte

INSTITVTIO II.



Ractaturo mihi de topicis auxilijs, primum se se offert particularis vacuandi ratio, circa quam, nullum auxiliū tutò parri adhiberi potest. Quæ sanè tot habet differentias, quot sunt partes in corpore ceteris communes & proficue, veluti cerebrū, ventriculus, thorax, iecur, splen, vterus, renes, vesica ac testes, & partes quæ habent peculiare vias, quibus citra totius corporis turbationē, expurgari possunt, aut sanguine misso vacuari. Et vt ab ea vacuatione quæ per sanguinis missionē fit, iuriū sumam,

nam, statuendum est, quod cum sanguis alicui parti inhaeret, plenitudinemque partialem efficit, & sanguine misso ex comuni vena minimè separatur deriueturque, duplex insurgit particularis ratio eua-
cuandi: altera per scissionem venæ illi parti propriæ & peculiaris, a qua pars ipsa fouetur, aut quæ ab eadem oritur: nam huiusmodi sectiones ocysimè particularē plenitudinē deponūt. Sic venulas nasi & linguæ in capitis affectionibus vtiliter scindimus, aut eā quæ prope humerū sita est: in præcautione verò eos ramos qui inter pollicē & indicem sunt. Sic capitis dolores, vertigines, & alios ex calido defluxu affectus sanat incisio earū venarū quæ ponē aures sunt: pari lege & cucurbitæ in scapulis scarificatur. Oculorū verò affectibus medemur post communem venā scissam, scarificatis partibus humerorū & ceruicis, & scissione venarū quæ sunt in angulis oculorum. Auribus verò inflammatis & parotidibus vena scissa sub aure prodest. Gingivarum, maxillarū & dentiū doloribus ea scissa auxiliatur quæ sub labijs extat. Cordis verò ac pulmonis, interior sinistri potius quàm dextri cubiti vena prodest. Nec erit ab re dextri venam tundere si vniuersum corpus malo consentiat, quoniam pulmonum venæ è dextro cordis sinu prodeunt, sed quia in sinistram parietem venæ caue inferitur, qui per alam sinistram in sinistram cubitum excurrit, non displicet prima sententia & communis. Iecore item oppresso, inflammato ve, dextra creditur, sicut heni succurrit interior sinistra: vtrisque tamen medetur saluare illa eiusdē manus. In his autem affectibus qui inter clauiculas & renes sunt, reuellit vena interior, tardiùs autem vena manus, aut ex vtriusque partibus vena media, siquidem illa

ex

Institutionum Chirurgicarum

ex communibus ramis humeraria interioris coag-
mentata est. Subter renes in quacunque parte insit
affectus, secta poplitis vena præsidium fit: renes
verò ancipites (vt institutione de sanguinis mis-
sione latius probauimus) existunt. Musculos ab
dominis ab inflammatione vindicat aperta infe-
rior vena: coli intestini vitia, quamuis subter re-
nes sint, interior cubiti vena secta aufert. Vteri ve-
ro affectus, licet membrum vnum sit, varias tamen
venarum sectiones desiderant: nā immodicē fluen-
tibus mensuris, interna brachij medetur: suppres-
sis, malleoli, nisi ex immodica totius corporis co-
pia & oppressione supprimantur: inflammationi
quidem per initia, etiam interna brachij, mox ab
impetu fluxionis aut procedente malo, ex tali ve-
nis: nam prima sectio plenitudinem euacuat, & im-
petum reuellit, secunda directiūs partem affectam
respicit. Præterea quemadmodum in mensibus,
ita & in hæmorrhoidibus suppressis aut fluentibus
res fieri debet. Verū si quæ inflammatio vel po-
dicem, vel partes obscenas, vel vesicam, vel aliter
inguen infestauerit, modò veneni particeps non
sit, ex superioribus cubiti venis multitudo summe-
uenda, inhibendaq; fluxio est: cæterum deriuatio
particulariūs directiūsque ab inferioribus fieri: cui si-
milis est in mittendo sanguine crurum inflamma-
tio. Secundus autem vacuandi à parte modus per
ea fit auxilia, quæ ab ipsa parte per eandem mes san-
guinem demit: quod fieri est necessum in his quæ
non obsident à cute & carne distantem locum, qui-
bus cucurbitas affigere cum scarificatione, aut hi-
rudines, promptè quod in parte est ab eadem eua-
cuat. Quæ omnia nouisse oportet: nam aut mutare,
aut alio modo efficere, præterquam quod nihil
pro-

prodesse omnibus est compertum, aut lādere, aut nouum affectum excitare, & facultatem frustra infirmare certissimum est. Quas sanē particulares vacuationes necessum est moliri, premisis vniversalibus, si profuturae sunt: quod si aliquando citra vniuersalem prouidentiam fieri contingat, vt in conualescentibus, imbecilibus, & his quibus abundantia tantū parti affecte inest, necessum antea est frictionibus & ligaturis longē à parte affecta factis totius corporis humores ad distantes partes quodammodo euocare, ne impetu sanguinis fluentis ad affectam partem fluant.

Pari prorsus ratione dum in aliqua particula vitiosus aliquis humor colligitur, particularibus etiā purgationibus, materia demenda est. Considerare tamē antea oportet, an humor in eādē particula generetur, an aliunde trāsmittatur, vel à toto corpore ibidem decidat: si primum, nulli dubium est quin per ea medicamenta quae partem affectam respiciant, euacuare partem oporteat: & pari ratione si secundum: ceterum commodius erit purgare particulam mandātem: nam in his duobus casibus, corpus medicamentis purgantibus turbare, vanum est: vniuersalis enim purgatio turbatos humores ad affectam partē facile defert. Verū si à toto corpore fluant, ante particularem euacuationem praemittenda est vniuersalis prouidentia per expurgans medicamentum, à quo deinceps facile est vitiosos in parte receptos per diuersa pharmaca euacuare.

Sine ne aliqua purgantia medicamenta particulam aliquā respicientia non citra facile dārimere: sed dubitationē hanc si dissolues, si prius didiceris esse medicamenta, vt Galen. probat, quo parti

Libr. de
theriaca
ad pif.

tes

Institutionum Chirurgicalium

res, sympathia & similitudine quadam respiciant, ut fertur de sthocade, & de scolopendrio & alijs. At ut id purganti alicui insit, necessum est scire, medicamentum purgans tribus è partibus posse signatim purgare: primò à toto corpore, ex similitudine humorum vniuersum corpus obsidètur: secundo è partibus vicinis ei in quo medicamentum purgans inest. Quamobrem obseruantissimum est præceptum, in purgationibus quæ per vicina sūt, non licere valida adhibere medicamenta, ne à distantioribus ad affectam vi medicamēti plus iusto trahatur. Tertio autē modo medicamenta dicuntur purgare, cū in vnica parte existentia, à distātissima & signata quadam particula, citra aliarum turbationem humores trahunt & expurgant. Quod multi arbitrantur esse, quia aliquod purgans medicamentum non habet similitudinem nisi cum humoribus qui in ea parte præsunt: quātum valeat hæc ratio, iudicēt alij. Ego quidem arbitror, id fieri ob aliud notius & manifestius, nimirum quia medicamenta quæ purgandi vim habent, simplicibus admiscetur medicamentis, quæ è directo partem aliquam dicuntur respicere, qualia sunt à Medicis appellata iecoraria, splenetica, capitalia & huius ceteris: quæ sane cū admiscetur medicamentis purgantibus, & suapte natura habeant in illas partes deferri, secum deferunt in partem illam vim medicamenti purgantis, ex cuius attractu partes illæ promptius purgantur, quàm reliquæ quæ non ita humoribus abundant: præterquam quòd partes quæ afficiuntur, naturam habent adminiculantem, quia grauata aut laceffita humoribus, id facilius exequitur quàm partes quæ humoribus sunt exortes: qua lege censeo prædictas purgationes

tiones fieri potius quàm alio modo.

Purgamus itaque caput aut quoduis aliud peculiare membrum, dum humorum vitio laborat, duobus modis: aut per proprias & peculiare vias, per oculos nimirum, nares, aures & palatum, aut per communes: eo tamen medicamento admissio quod est directo caput respiciat, & sic utriusque vacuandi generis seorsum in quavis particula meminero. Sunt autem capitis emunctoria, oculi, aures, nares, palatum: raro tamen natura per oculos cerebri purgamenta pellit, nisi errans, aut præcauens gravior malum: quam purgationem nobis non licet tentare. Nec dissimili gradu aures æstimantur, licet sæpius maiores purgationes moliatur natura, quas leuiter abstergentibus iuuare, non erit abs re. At per nares & palatum errithnis, gargarismatis, dentifricijs & masticatorijs purgamus caput, sed non pari efficacia & securitate: nam masticatoria, & quæ palato indita caput purgant, securius quam errithna purgant, quia ex vehementi cerebri agitatione ignoratur quò se vertat humor: cum hoc tamen omnia proficua sunt & necessaria.

Errithna itaque purgantia solum naribus indita duplicem præstare usum: quippe aut pituitam & omne cerebri excrementum præparant, ut deinceps facile dilabatur, aut eadem vim habet expellendi. Quam profecto expulsionem duobus modis fieri comperimus: vno, peculiari vi & efficacia trahentis medicamenti: altero verò, irritata cerebri expellente facultate, ut ipsa deinceps sua sponte cerebrum quatiens sternutamentum facto, impetu quosvis humores pellat à cerebro non postica parte, sed à reliquo cerebro & circumnigens. Itè nares purgant, & non raro quæ in ventriculis continentur: quo fit, ut poterit reuellat quæ in fauces distillando disabuntur. Cui visui medicamenta

Institutionum Chirurgicalium

ars probauit duplicis differentie: nam quædã propria & peculiari vi id efficiunt, quæ verè errithna dicuntur: quædam verò id efficiunt, ceterum commoto cerebro & sternutamento facto, quæ prarmi-
ca & sternutatoria appellantur, vtraque tamen reperiuntur multis gradibus dissidentia, & vtraque etiam necessaria sunt pro affectus vehementia & sensus obtusione vel acuitate: item vtraque ferè eiusdem sunt generis, dissident tamen tenuitate substantiæ, qua promptius se se in cerebri membranas inferunt, quibus vellicatis & demorsis mouetur sternutamentum: quæ verè errithna sunt, crassioris sunt substantiæ & naribus indita & adhærentia efficacius humores alliciunt. Quod sane opus hæc medicamenta efficiunt, aut caliditate aut feruore aperiendo ac fundendo humores, deregendoue, aut ex propria virtute humores trahendo, quibus motis forsan commouetur sternutamentum. Quæ verò caliditate id efficiunt, sunt odorata omnia, vt sampsuccus, pulegium, & succus hederæ & nigella, quæ cauere oportet in coriza, ne maior fiat fluxio & humores acriores. Verum quæ tota substantia euacuant, sunt veluti cyclamen, elaterium, nitrum & alia huius naturæ. Quæ per nares commoto sternutamento humores purgant, licet multis modis prædictis similia sint, differunt tamen, quia acriora sunt & tenuiũ partiũ, velut saponaria herba, castoreũ, batrachij radix: inter quæ mitiora sunt nux muscata, acori radix & zingiber. Quæ omnia aut in tenuissimũ puluerẽ exuffata, aut aliquo liquori admixta, vtiliter adhibentur: hæc quidem quibus mens ægrotat, illa verò reliquis. Quorum omnium materia & copia & vtendi legem reperies libro de recto præsidiorum vltimo, tomo. 2. nam breue

breue hoc institutum non patitur longiorem tractationem.

Apoplegmatismum autem vocarunt id auxilium, quod vim habet pituitam è cerebro per os educere: qualis naturæ est medicamentum quod ori & palato indurum, id præstat, & etiam è ventriculo educit, ratione communionis tunicæ que ventrem & os ambit. Quæ sanè medicamenta hæc opera efficiunt, vel cùm palato adhærent, aut dentibus affricantur, vel cùm eisdem dentibus manduntur, vel cùm os eis colluitur, gargarisma appellauimus: quorum Galen. Iacè meminit. Verùm siue dentifricia, siue masticatoria sint, vel vtrunque aliter, vno è duobus modis id efficiunt: nam vel irritando & calfaciendo, vel vi propria attrahendo, id moluntur, & quæ calida & acria sunt, veluti anethi semē, capparis radix, caryophyllus, & radix etiam pithri, & alia huius census. Cæterùm quæ valenter trahunt, sunt nitrum, anemonis radix, & radix staphidis agriæ, & iridis etiam radix: ex quibus aqua maceratis fieri possunt gargarismata: cera autē, mastiche, vel ficuum carne exceptis, masticatoria: tale admisto, dentifricia faciliè fieri possunt. Quæ sanè omnia mirabiliter capitis pituitam expurgant: profunt: quæ (corporis præhabita prouidentia) inueteratis capitis & vicinarum partium affectionibus, ijs præsertim quæ per epicrasim vacuari desiderat, dummodò os aut palatum aut laringis caput non sint aliquo affectu læsa. Caput præterea purgamus per ea medicamenta quæ humores trahunt ad ventrem & communia emunctoria: in his tamen capitis affectibus quæ vel à toto vel ab aliqua particula fomentum susceperant, aut in quibus maior est humoris copia, quàm possit per capitis emunctoria

Lib. 5. fin
pli. c. 1. 0

b pur-

Institutionum Chirurgicalium

purgari, & rursus in his, quorum caput præ imbecillitate aut sensus acrimonia, purgantium vim & mordacitatem ferre nequit. Cui sanè vsui medicamentorum conficies ex his quæ humorem peccantem respiciant, admittis alijs medicamentis, quæ quauis purgantia non sint, partem quandam respicere possunt, vt antea dixeram.

Purgare ventriculum varijs modis docet ars, vt toridè ipse patitur affectuū differentias: nā aliquādo adhibemus quæ abstergunt, quæ irritant, quæ abluunt, quæ leniendo purgāt, sæpe quæ cōprimendo, ac sapissimè quæ propria vi purgādo ventrem ipsum ab humoribus & excrementis immunè reddunt. Quod magno cōsilio arbitrandū est artē nostram constituisse. Nā abstergendo purgamus viscidos & adhærētes succos, melle, terebinthina, melle rosaceo, aut si calor simul adest, hordei decoctum cum saccharo. Irritatorijs vrīmur ventriculo expulsa aut alijs excrementis obusto: sic profunt mercurialis, siela, decoctū vrticæ cum melle & aceto. Abluimus ipsam, dū humoris vitiosi aut acrioris medicamentis reliquæ à purgatione vel à morbo supersunt in ventriculo, quo tēpore ius, aqua calida, hordei decoctum aut consimilia profunt. Lenientibus vrīmur pharmacis, dum tenaciori facta facultate retentrice, plus iusto ventris excrementa retinet, quem vsū præstant pingua omnia, denia ac humida, veluti casia, manna & eius naturæ alia. Adstringunt quidem nonnulla, & si cum hoc etiam ventrem soluant, cum in animo est, post totalem humoris expulsionem, vltiorem impedire: quæ vsū præstant rhabarbari substantia, & cortices myrabolanorū. Vrīmur etiā propriè purgantibus medicamentis, dum humor altius in ipsum ventriculum

culi corpus, pancreas & meseraicas inferitur. In quo purgandi genere primò considerare oportet, non licere vehementer purgàtia adhibere, ne plus trahant in ipsam à toto corporis ambitu, quàm à ventriculo pellant: huius conditionis sunt rhabarbarù, aloès, pilule mastichinæ, & hiera Gal. Secundo sciendū est, ventriculū nō cōfertim, sed sapius esse purgādū: nā vt pars princeps nequit cōfertis ferre citra dānū euacuationes. Tertiò statuendū est, ventriculū prærequirere medicamenta purgantia in forma solida, vt sufficiēti mora detēta efficacius operētur, quantūuis leuia sint & sine vehemētia.

Dū iecur vitio humorū laborat, purgationē desiderat efficacioribus medicamētis factā, quā ventriculus, vt minori facta mora, facilius & magis purgent, nō tamē per longiora interualla: hoc insuper habet peculiare, quòd dilutiora medicamēta exostulet, ob viarum angustia & locorum interualla. Quo fit, vt ea medicamenta desideret, quæ obstrictionē aperiāt, roborent tamē nullo calore medio: qualis naturę est gramen, intybi omne genus, adiatum, eupatoriū cum rhabarbaro, agarico, & aliqua ex stillatitijs aquis. Nam expurgantia medicamēta iecori proficua hoc peculiare habent, quòd misceri semper desiderent inscindētibz & attenuantibus medicamentis, & adstringentibus etiam: illis quidē, vt purganti pharmaco vias & humores præparent: his vero vt simul partis robur seruetur. Quod vt commodius fiat, præire debent inter vnā & aliam purgationem attenuantia & inscindentia, vt qua die medicamētum purgans accipitur, suum munus facilius subire, queat, habito semper respectu ad iecoris intemperamentum, vt simul aliquid illi contrarium admisceatur.

Institutionum Chirurgicalium

Cùm lienis natura & conditio terreæ sit & crassa compagis, & maximas ob id, & ob facilitatem suscipiendi patiatur obstructions, quia quantūvis crassam habeat carnem, raram cum hoc sortitur, necesse profectò est, paulò grauioribus & efficacioribusvri medicamentis, maximè cùm humores ibidem congesti, ob natiuam conditionem sint tractu difficiles, & viæ arctiores & angustæ. Quo fit, vt leuia medicamenta nihil profint: vehementiora verò, angustias & accidentia non leuia inferant. Quamobrem censendum est, apta lieni medicamenta ea esse, quæ primò suauitate quadam terreum illum humorem, vel emolliant, vel quodammodo liquent, attenuent & detergant, sine adstrictione cōspicua: vt deinde obstructione vel leuiter soluta, faciliùs & lenioribus medicamentis humores decidant in aluum. Quorum equidem nonnulla moderatè frigida sunt & humida, quæ exuperanti bili re torrida conueniunt, vt violæ, vtrunque buglossum, & succus pomorum redolentium: plurima verò moderatè calida & tenuium partium, vt crassā fæculentamq; melancholiam attenuēt qualia sunt lupulus, casuta, scolopendrium, radix apij, cortex tamarisci & capparis, & eius naturæ pleraque. Itaq; in vniuersum duplex erit purgandi ratio: altera, quæ blandè & leniter aduersus humorum qualitatem & substantiam pugnet: qua sæpe tantū licet liquare humores, quòd citra alterius auxilij adminiculum per ventrem singulis diebus aliquid eorū prorumpat: altera verò quæ humoris electione & tractu eos pellere nata sit: quæ sanè leuib. exercenda non est medicamentis, sed validioribus, verū in parua quantitate: hoc quidem ne maior humorum copia, quàm viæ angustæ capere possint

sint trahatur: illud verò quia sic expostulat durities & renitentia humoris. Quãobré censeo Hipp. dixisse: Si verò splenicus fuerit, ne purges, neque lacte, neque suo sero, sed eo quod modicū ingestū plurimum educat.

Verū non minus purgant vterum duo medicamentorum genera: alterū quod per propria emūctoria ipsum purget: reliquum verò quod per communia, vt præcaueat à corporis vel aliorum membrorum vitijs quæ expurgantur per ipsum tanquā per sentinam. Primo modo vterum purgamus, per pesaria & per metréchitas, vterinos appellatos clysteres, per suffitus & euaporationes: ita vt cū necesse est vterum abluendo purgare, metrenchitas adhibemus: suffimus verò & euaporamus, dum in animo est aut reliquias humorum conterere, aut distemperiem auferre, vel tandem vteri humores ad euacuationem præparare. Verū pesaria quibus frequenter vtebatur Hippocrat. tribus medicamentorum sortibus constare conspiciamus, dū tantū eisdem purgare intendimus (nam varia iuxta varios affectus parari solent) nimirum ex attrahentibus & his quæ valida sunt, vt flos æris, pulpa colocynthidis, nitrum, cucumis agrestis, & eius natura. Quibus licet antiquitas & Hippocrat. vtebantur, minimè ego aunderem, nisi aut maximo urgente malo, aut coopertis lana & gossypio ipsis pesarijs, ne vel partes exedant, vel plus attrahant quàm particulæ conditio patiat. Aliud quidem eorum genus est, quæ modicè purgare possunt, vt agaricus, aloës, puluis benedictæ, succus mercurialis, aut alicuius rei acris, quæ aut vterum irritando, aut modicè trahendo expurgent. Tertia verò & vltima constant his quæ caltaciendo, incindendo & at-

Institutionum Chirurgicarum

quando humores liquant, fundunt, & attenuant, & vteri vias aperiunt. Sunt tamē pessaria hæc forma rotunda, & longiora crassioraque glandibus ipsis: sunt ex molli lana, cera, panno aut bombace, vel ex herbis: quæ filo appensa, in vterum mittuntur ad menstrua prouocanda, ad sedandas inflammationes, ad vlcera curandam. Purgamus etiā vterum per communes vias, deriuationi q; gratia, vt dictum est.

Renes verò & vesicam purgare docuimus primarum institutionum parte.

DE RECTO AUXILIORVM alterantium vsu

INSTITVTIO III.

Li. 7. metho. c. 12
Li. de ver. medic.



Ixerat Gal. temperiem dignitate maiore esse in quouis affectu, quoniam ipsa temperies, quasi virtus & robur membri haberi debeat. Quo sensu censeo dictum esse ab Hipp. caliditatem & frigiditatem in corpore minimè esse potètes, quia adeo sunt per cōuersionem attemperatæ, vt non solum alterum ab altero nō lædatur, sed vnū ab altero vicissim veluti fomentum & refectionem suscipiat. Quod in antiparistasi euidenter cōstat, sed diuerso modo in corporibus adinuicem reficiuntur. Quam sanè alternatiuam refectionem solum inter calidum & frigidum reperimus: sicquē verò

Verò & humidum semper corruptiue inter se operantur. Verum omnium aut quorundam contemperatio facultatum efficitur instrumentum, sicut læsionum causa, dum alterum, aut totum intemperatur, & à cōtemperatōne recedit. Quo fit, vt necessum sit ad vnguē calere, quantum & quid vnaquæq; prædictarum quadrum efficiat, vt iuxta cuiusque effectum & agendi potentiam, ea ratione ad pristinum statum reducere possimus.

Sic caliditatis natura est, vt ad agendum omnium sit efficacissima & potentissima: contra ad resistendum omnium maxime infirma: cū hoc tamen si conferatur frigiditati, virtus caloris in agendo longè maior est, quàm virtus frigiditatis in agendo, etiā si frigiditas in resistendo superet caliditatem: licet tanta sit caliditatis vis & efficacia, vt dum agit in frigiditatem, ipsius resistantiam superet. Est itaq; calor, si frigori compareretur, habens rationem naturæ, vitæ & habitus: frigiditas verò, priuationis & interitus. Caloris enim est componere & congregare homogenea, dum naturalis est, & coctionem molitur, ac ob id aliena separat: verum cū modicum excedit (nā loquimur de calore animantium) omnia disgregat perditque, vt de calore putredinis constat; qui hæc opera perficit, mediantibus quibusdam alterationibus, quas primò inducit. Nam præter calorem quem præstat, tenuat etiam & fundit, mollit, digerit, siccit, rarefacit, trahit, dolores sedat, dolores efficit: præter quā, quòd calor innatus coquit alimenta & humores, ob idq; homogenea cogit, & æthereogenea separat. Calor ite tam internus quàm externus per accidens refrigerat, humectat, aut exsiccit: hoc tamen habet

Institutionum Chirurgicarum

peculiaris, quod humanum corpus securius calfe
quam refrigeretur.

Actiua etiam qualitas frigiditas est, longè tamen
diuerfa à caliditatis actiuitate: nam præter refrige
rationem insuper congregatam homogenea, quã
æthereogenea, cõstipatque omnia, & vnumquod
que reddit sua natura immobile & veluti mortuũ:
& sicut motus indicium est vitæ, ita immobilitas
mortis & interitus. Per accidens tamen frigoris
actiua vis facit ad operationem naturæ: nam cùm
actiones naturales a moderato proficiantur calo
re, frigiditas huiusmodi moderationẽ illi præstat:
sepe enim vi frigoris circumstantis calor cogitur
in vnum, & per antiparitasim multa generat, & cõ
ficit. Item vi frigoris compescitur sæpe extraneus
calor, à quo solet proficisci corruptio & putrefa
ctio mistorum: agit quidem vicem instrumenti na
turæ, per accidens tamen. Præterea frigiditas prop
ter propriam quam infert sibi similem frigiditatẽ,
crassat, gelat, glaciatur, ac durum concretionem facit
veluti crySTALLUM aut succinũ. Hinc à frigido hu
ores: sic scirrhum conficit, pituita crassiori facta aut
melancholia: pigros item facit spiritus & veluti cõ
gelat: frigiditas ex retrocessione aëreæ & sangui
nis substantiæ impinguat. Sic à frigore conuulsio
nes, & cum hoc cute densata, interna calfacit, flu
xiones ea ratione concitat: item fluentes materias
sistit: coctionem vel impedit, vel coctum recrudescit:
omnia item viuientia mortificando internecat,
siccatur etiam & humectatur per accidens. Quæ ratione
dixit Hippocra. Siccatur autem & calida, vbi nimium
calfaciunt, & frigida vbi nimium frigefaciunt, ex
pulsamateria humida. Quæ quidem omnia opera
tam calidi, quàm frigidi augeat medicamentorum
tenui.

Lib. 1. de
morb.

tenuitas in calidis, & moratur crassities: sicut contra in frigiditate, etiam si tenuitas celeriorē & maiorem præstet frigiditati actionem propter morū & penetrationem.

Humiditas quidem & siccitas cū magis sint qualitates materiales, minus suas actiones padunt. Vis ergo humiditatis in agēdo non est admodum magna: in resistendo contra humiditas vim magnam habet: quæ quidem propter propriam qualitatem quam inducit, mollitiem etiam conciliat, sicut in omnibus in quibus prædominatur humiditas aperte conspicitur. Habet insuper hæc qualitas id proprium, vt in penitissima corporis se se insinuet, modo per nutritionem nostris corporibus succrescat, modo per madefactionem.

Siccitas ex propria natura partes durat, vt ostendunt ossa, cartilagine, metalla, & lutum sole induratum: quod siccum duobus modis inducit: primo alterando partium substantiam, consumpta videlicet ipsarum humiditate: secundo humore in proprijs spatijs ebibendo: ad quem referri possunt omnes illæ siccitatis species, quas Gale. lausissima oratione recenset. Cum hoc tamen siccitas minimam omnium vim habet in agendo, & maximam omnium in resistendo, & ob id difficulter quæ sicca sunt terminari possunt termino alieno: item caliditatis est calcar & dispositio, sicut humiditas frænum, etiam si calori sit pabulum.

Quibus inspectis, sciet diligens lector, quæ opera nata sit efficere quævis harum qualitarum, vt dum alterare intendit, caueat, ne ob incuriam aut ignorantiam quid aliud ex his quæ calfacientia & refrigerantia posse efficere diximus, perperam & contra institutum molatur. Cuius rei gratia statuen-

7. Meth.
4. simpli.
c. 8.

Institutionum Chirurgicarum

dum est, partes natura calidiores dum ex frigore laborant, liberalius & diutius cal fieri exoptulare: sicut etiam quę frigidioris, siccioris aut humidioris sunt naturę, pari ratione. Quippe eatens redeat ad naturā vnumquodq; necessum est, quatenus ab eādē recessit. Præterea considerandum est, non semper in calidis distemperantijs esse eodem modo refrigerandum, sed iuxta caloris actionem, aut modum, quo causa operatur. Multa enim sunt quę calorem compescunt cute rarefacta. nonnulla quę te: alia vacuatione rei calidę, aut retentione frigidę: plura verò alia ratione. Sic dum temporis alteratione egens: siquidem parvus est in præter naturam lapsus, & rursus in id quod secundum naturā est, reditus: quod de coniugatis intemperantijs pari ratione est sentiendum. At cum diuersa particulę affectę temperatura, diuersam ab ea, quę ex ægri sumitur natura, indicationem præbeat, illius quoque edificere providentiam conuenit. Quippe si quanto ægri temperamentum iusto est humidius, tanto particula sit siccior iusto, neque addendum neque detrahendum, quidquam pharmaco est, sed tale adhibendum, quale particula medicij temperamenti exposceret: si siccior debito plus particula fuerit, quanto corporis temperamentum iusto est humidius, vique tantam intendi siccitatem medicamenti, conuenit, quantum particulę temperamentum: iustius temperamentum excedit. Veluti si quatuor numeris pars ulcerata sit medio temperamento siccior, ægri natura gradibus tribus humidior, manifestum est, particulam quę nunc exulcerata est, siccius vno gradu desideraturam medicamentum, quàm quę pars sit temperata. Præterea siccam partem re-

sicca

ficere vno ē duobus modis oportet: nam aliquando sicca affecta est noua quādam inducta siccitate, quæ per alterationem ab humido tactam corrigitur: fit autem vel per ablationem partium humidarum, quæ latebant compressæ & contentæ inter terrestribus partibus: aut cum exolant resolutæ in vaporem: illam positiuam: hanc priuatiuam nonnulli nominarunt. Prima corrigitur per calfacientia, quæ quod coagulatione siccum factum est, liquefactione humectant: altera vero per renutritionem humiditatem antiquam recuperat.

Præterea vt de calida distemperie dictum est, ita prorsus de frigida est intelligendum: nimirum non semper esse in frigidis calfaciendum. Nam corpus calfacere possunt motus, rei calidæ vicinia, constrictio corporis, & medicamenti aut alimenti calidi assumptio. Sic motus calorem concitat, exercitio, frictione, compressione & cunctis, gaudio etiam ac moderata ira, & reliqua quæ diximus, & ex accidenti frigiditas. Quæ omnia maturo quodam consilio veteres illi sapientissimi distinxerunt, vt iuxta rationem causæ & modi excitandi calorem, ars quoque alterationem & correctionem molitur, quam si euerso modo aut incognita causa perfrigerando aut calfaciendo, aut aliter alterando tentaueris euincere, in longè grauiora mala laborantes deduces.

Etiā considerare oportet, eodem ferè tempore calidam distemperiem discuti ac frigidam, quamuis caloris maior quàm frigoris sit efficacia. Vnde sit, vt æquali tempore vires suas exercent effectusque obtineant, dum distemperies simplices

Institutionum Chirurgicarum

simplicis sunt, alioqui ob materiæ vitium difficilius frigida quam calida euanescent. Quorum etiā auxiliorum ea quæ calida sunt, tutissima esse videntur: nam frigida dum calorem naturæ contrarium extinguere incipiunt, natiuo pariter negotium faciunt: calida verò dum frigus pellunt, innatum similiter calorem excitant fouentque. Quin etiam genuinus corporis calor, ascititio tanquam auxiliator opitulatur, vt facilius mitiusque externum frigus pellat: eoque frigida intemperies, præsertim leuis & recens, securius ac lenius quam calida auferatur: inueterata autē cōsummataque, difficilius multo quam calida remedijs cedit: sicut extrema senectus infuso calore destituta mori que iam proxima, minus sanari quam febris hectica potest: eodē modo sicca intemperies tardius omnino ac difficilius quam humida tollitur.

Lib. de veter. med.

Consideratione etiam dignum est, nosse has omnes qualitates non semper humanum corpus lædere ob insitam sui naturam & conditionem, sed ob alias qualitates sibi comites: quod pulchra quadam sententia his verbis dixerat Hippocrates. Si autem est calidum quoddam acerbum existens, aliud verò calidum fluidum tenue, sunt etiam & alia calida, alias etiam vires sub contrarias sibi ipsis habentia: & subdit: Non enim calidum est, quod magnā vim habet, sed ipsum acerbum & fluidū, & alia quæ à me relata sunt, tum in homine, tum extra hominem, siue edantur, siue bibantur, siue forinsecus illinantur, aut quomodocunque formata adhibeantur. Et paulo inferius addit: Atque ego hoc maximum signum esse puto, quod non propter calidum simpliciter homines febricitent, neque hoc sit simpliciter

placiter affectionis causa, sed est & amarum & calidum: item & calidum & acidum, & falsum & calidū & alia infinita: & rursus frigidum cum alijs facultatibus coniunctum. Quæ sanè omnia diligenter ediscere oportet, ut iuxta cuiusvis qualitatis coniugium auxilia parare Medicus discat: nam eadem parte Hippocrat. diuersam in his constituit curandi legem dicens: Omnibus autem liberatio hæc est, ut ex frigiditate quidem affecti calfiant, ex ardore vero refrigerentur: reliquæ autem omnes fluxiones quas propter humorum acrimonias & intemperantias ego fieri sentio, restituntur & curantur, ubi temperatæ fuerint & concoctæ. Sedatur autem aliquo modo ardor in naribus, non cum fluxus prodit, & inflammatio consistit, sed postquam fluxus crassior, & minus acris, concoctusq; & magis permixtus priore fuerit, tunc sanè iam ardor cessat. Quibus manifestè constat primas qualitates cessare, secundis qualitatibus sibi adiunctis attemperatis, commixtis, & concoctis. Quamobrem qui temperantia auxilia præstaturus est, caueat ne indiscriminatim aut indistinctè adhibeat, ne aliquam accersat ex secundis qualitatibus, quibus certum est longe magis ledere præexistentem quàm antea, ut ex Hippocr. præfata doctrina euidenter colligimus. Nam ut Galen. inquit, ex vno in alterum affectum inopinatò fit còmeatus: quapropter mensuram & modum in omnibus seruare oportet, & sæpe paulò inferiùs subsistere, & iteratò auxilio defectum adimplere, aut aliud eiusdem generis interponere, aut intendere, vel remittere: tum ne natura vni assuescat: tū ut quod vno fieri nequit, alio consequamur. Qui verò voluerit scire quibus medicamentis, tam simplicibus, quàm còpositis, teneatur réperare partes nostri

Li. 7. Metho. c. 7.
Li. 9. Metho. c. 23.

Institutionum Chirurgicarum

nostri corporis, tum principes, tū priuatas, legat
tom. 2. lib. de recto praesidiorum usu, vbi vtilissi-
mum & copiosum reperiēt de hac re tractatum.

DE ADSTRINGENTIVM praesidiorum administratione.

INSTITVTIO IIII.



E nobis varietas confusio-
nē pariat, & erroris sit cau-
sa, distinctione prius expli-
care oportet, adstrictionis
nomen quid importet. Ap-
pellant quidem Græci ad-
stringēs omne medicamen-
tum ityphō, quod velut ge-
nus quoddā est ad omnia,

quæ comprimendi, contrahendi, adstringendi &
vtcunque cogendi ac densandi partium meatus &
partes ipsas vires obtinent, atque etiam ad omnia
quæ humores cogūt, incraſſant, ſiccāt, reprimunt,
ac denique vincunt & cōtinent partium ſibi cohæ-
rentiū ſubſtantiā. Eſt tamen adſtringens præcipuē,
genus acerbi & auſteri: continet hoc proprium,
quod terreum ſit, & maiori ex parte frigidum.

Acerbum verò corpus eſt vehementer adſtrin-
gens, facultate frigidum atque terreum, vt gal-
la immatura, & eius naturæ: frigidum quidem,
quoniam tale guſtantiſus lingua contrahitur, den-
ſatur, ſiccatur, exaſperaturque, quæ non niſi à fri-
gido fieri poſſunt: terreum ſiccumque eſſe quod
tarde in corpus permeet, humiditas facile pe-
netrat.

netrat, & frigiditati adiuncta, non acerbum, sed acidum potius efficit. Acerbi quidem sunt fructus omnes prope sui orius principium, qui postea quā humore impleri cœperint, decedit quidem acerbitas & accedit aciditas. Acerbitas etenim tribus modis exoluitur, incalescentia, aut humiditate, aut utroque modo: incalescentia quidem in dulcedinem migrat, humiditate austeritas acquiritur, si aqueus fuerit humor: nam si aëreus, aciditas succrescit: quod si utrūque, dulcedo ex aqueo, & pinguedo ex aëreo comparabitur.

Præterea adstringens, alterum est summum, ut alume, melantheria, galla & rhus: alterum modicè adstringens, ut pyrum & rosa: quorum omnium maior pars, frigida naturæ est, minor vero manifesta caliditate pollet: utraque tamē tertio ordine sicca apparent, ac terrea sunt, & crassa corporis consistencia.

In cuius auxiliij consideratione statuendum est, aliud esse adstringens in genere, aliud verò adstringens, ut aduerit Galen. nam quod astringit, non adstringit modo, sed præter adstrictionem acre est, pingue, dulce, amarum, salsum, aut acidum: at adstrictio vnum tantum est, ut dulcor aut saltedo. Et ob id constat adstringentia medicamenta duorum esse generum: primum eorum est, quæ citra manifestam qualitatem, ex his quas nuper retulimus, adstringunt, quorum munus est constringere, densare, repellere, increassare, refrigerare & exsiccare: cuius generis sunt balaustrum, galla, cirinus, hypocistis & eius naturæ alia: quæ licet ex toto non sint alterius qualitaris expertia, quia id euidenter plurimum non est, sincera iudicatur. Secundū verò his cōstat,

Li. de cibis bo. & ma. succi. Li. 3. sim. pl. c. 14.

quæ

Institutionum Chirurgicarum

que cum adstrictione aliquid etiā habent acre, dulce aut amarum, salsum aut acidum, vt egregiē docuit Galen.

Neque est parui momenti hæc in re practica no- uisse: nam acida & adstringentia, veluti immatura pruna, cerasa, mala, mora, & immatura vua, penerationem maiorem moluntur, tum intus, tum extra adhibita, præterquam quod calidis affectionibus magni sunt momenti.

Acre medicamentum adstringens reperitur, & calidū est natura, veluti æs vstum, atramentū sutoriū, flos squāmāq; æris & calcithis: quæ omnia præter adstrictionem, quam præstāt, extenuant etiam, purgant, digerant, rumpunt, attrahunt: & scaram efficiunt. Quo fit, vt hæc prosint quibus subitam & profundam adstrictionem moliri conamur, veluti in sanguinis profusionibus, quas sauciata pars excitat, vt humores & partes adstrictione cogantur, crustaque succrescat: quorū in viscerum affectibus raro vti datur.

Amarum etiam medicamentum, veluti rhabarbarum, aloës, absinthium, habet præter id manifestiorem purgandi potentiam: nam hæc omnia abstergunt & attenuant humores manifesta caliditate: cum hoc tamen diapedesi & alijs sanguinis fluxibus profunt, maximē si ob serosam substantiam admistam fluant, etiam si ob venarum laxitatem prorumpant: licet aloës excitandi hæmorrhoides vires habeat.

Amaris propinqua esse salsa ex Galen. aperte constat, quod terrea ambo sint & calida: sic salsa contrahunt, constringunt, & condiendo seruant, & ob innatam acrimoniam aluum solvunt: quo fit, vt prosint partibus humidis constringendo, & fir-
mius

Li. 4. sim-
pli. c. 20.
Li. 5. sim-
pli. c. 25.

mius contrahendo resoluta humiditate, & earatione nervis & articulis laxis mirum in modum profunt.

Dulcia simul & adstringentia sunt myrti fructus & pyri agrestis, & roboris & castaneæ ac palmule, quibus profectò opus est, ubi adstringere est necessum citra medicamentosam qualitatem, quam laborantes frequenter pertimescunt.

Præter hæc adstringentia medicamenta, alia insuper minus propria reperiuntur, velut sunt omnia frigida & glutinantia, quæ materiam incrassando ac partes comprimendo adstringere dicuntur: arida etiam & viscida: item crassa, tum alimenta, tum medicamenta: postremò quæ resoluendi materiam vires habent. Oportuit profectò hanc adstringentium varietatem recensere, quia variam expostulat materiam particula patiens & affectus conditio, ad adstrictionis formam & conditionem. In quo opere considerare diligenter oportet partes quæ propter fluxum aut laxitatem adstringentia expostulâr, nimirum, quòd tantum partem ipsam cogant, citra alterius qualitatis administrationem, quales sunt partes laxæ, aut casu aliquo adaperthæ, aut diruptæ, adeò ut humores sibi commissos continere nequeant. Quippe in alijs fluxiones supprimuntur emplastricis medicamentis, quia & partem orbant, & humoris acrimoniam retundunt. Præterea alijs profunt quæ humores densant & incrassant: item aliæ expostulant utrumque, quod oportet diligenter considerare, si profutura sunt quæ præstamus auxilia.

In administratione verò horum auxiliorum arbitratum Medicorum vulgus adstringentia pharmacayum habere & efficaciam roborandi, ex quo

Institutionum Chirurgicarum

bitant expultricem ne roborent, an retentricem. Sunt qui credant siccitate minori iuuari expultricem, maiori verò retentricem. In qua re ita sentiendum est, quòd si membro inanito accedant adstringentia, retentrix augeatur roboraturq; & cessant hac ratione fluxiones: si verò pleno, propter vasorum aut cauitarum contractum, expultrix operatur, & robustior efficitur: qua lege adstringentia vltimò ingesta aluum citant, non quidem quòd re vera vires adaugeantur, sed quia actiones earum videantur perfectius fieri. Nā cōstricta, densa taq; ac cōpressa superiori alui parte, sit vt ad pellē dū deorsum natura promptior reddatur. Quippe Galen. non admittit vires firmari & augeri adstringentibus: fieri tamen euacuationem, vt dictum est, credit, dummodò lubrica & leuiter purgantia prēmittantur, vt olera cum oleo & garo: nam cōstrictio à superiori parte ventriculi deorsum pellit quod in ipso & vijs ductuum fuerit, vt Galen. adstruit.

Li. 4. de
nit. tu.
Li. de op-
ti. sec. ad
Tra.

Lib. 2. de
alimen-
ta. c. 22.

Verum ne quis imprudenter & incautè adstringentibus utatur, in memoriam reuocet, adstringentia esse, vel vehementer talia, vel leuia: illa quidem si alijs admisceas, quantumuis humida sint, ingredi vbi par est, prohibent, quòd superficiem densent: quæ verò leuiter adstringunt, iuuant reliqua medicamenta altius penetrare, vt de rosaceo Galen. apertè probat. Præterea, quantumuis in aliquo affectu adstringendum sit, non proutinus à vehementibus auspicandum est, neque credendum est, vt Galen. docet, verisimile esse, id quod amplius adstringit, amplius prodesse, quàm quod moderatè id præstat. A vehementer quidem adstringentibus partes simile quid confusio per-

Li. 3. sim-
plic. c. 16.

Li. 9. sim-
plic. c. 1.

petua-

pētuntur, quia substantia ipsarum vehemēter condensatur. Secus quidem res se habet in dentium affectionibus, citra gingibarum inflammationem, quibus vehementia Galenus eādem parte iuber ministrare. Item licet iecur corroborationis gratia adstringentia desideret, cum hoc tamen adhibenda non sunt, ubi infartam habet flauam aut retorridam bilem: quippe hac ratione citius inflammatur, quare cōtemperare ea oportet: quantum sat sit ne alia medicamenta vim iecoris resoluant.

Sic caput ea desiderat, quæ cum exsiccatione adstringant, cum fluxum concitant, quia promptius resoluuntur humores quieti quàm moti. Duplici enim ratione cephalicis medicamentis adstringentia admisceri solent, ut etiam apertè docuerat Galen. primo, ut id quod affectis partibus influit repellatur: secundò, ut in profundum cætera medicamenta ducant, dum tenuissimè trita adhibeantur quæ adstringunt, alioqui vel nihil prosunt, aut potius obsunt. Verùm si calida fuerit fluxio, sat est solis adstringentibus uti, ut quæ frigiditate humores crassent, attemperent, adstrictione comprimant, & hac ratione facilius coquantur, aut digeri queant: oculi quidem adstringentibus gaudent mineralibus, læuigatis tamen, ut ex Asclepiadis libris Galen. refert. Oris etiam faucium & gurgulionis vitia ex adstringentibus ea renuunt, quæ medicamento-
sa plurimum, & gustui ingrata sunt. Rationem quidem subdit apertissimis verbis Galen. nimirum ob tunicæ mollitudinem & ingratum saporem, & ne quid in ventrē aut pulmonem virosæ substantiæ defluat. Itē ventriculus omne amplexatur

Li. 2. phar
ma. 10. c. 2
c. 9.

Li. 4. phar
ma. 10. c. 2
3. 4. 5. & 6

Li. 2. phar
ma. 10. c. 1

Institutionum Chirurgicalium

adstringētium genus, exceptis mineralibus, & quæ acria & mordacia sunt, licet Hippocr. squamā æris præbuerit suppuratis. Intestina verò vlcerata, vt ex Gal. constar, ex adstringentibus medicamentis ea tantum desiderant, quæ amarorem aut acorem non habeant, nam ijs plurimum offenduntur. Prætereà licet pluribus affectibus ex his qui à fluxione prodeant, adstringentia medicamenta ex usu sint, cum hoc tamen, neque omnibus, neque semper, neque quibusvis particulis. Quippe sanguinē ex pulmone exuentibus nulla ratione conuenire possunt: nam inquit Galen. Maxime igitur lædere eos noui, qui sanguinem ex pulmone ex tussientibus adstringentia per totum thoracē medicamentis, in orbem circumponunt: nam præter id quod eorum facultas in pulmonem non penetrat, sanguinē etiam, qui in thorace est, ad viscus compellit: quo etiam affectu intus sumpta, dum ijs quæ tenues partes habeant, medicamentis commisceantur, plurimum prodesse eodem loco fatetur, dummodo vas à quo sanguis profiliit, ruptum dilatarumve sit. Itē in vteri fluoribus & intestinorum ex sanguine, adstringentia quæ soporem inducūt plurimum sunt proficua, vt etiam consuluerat Galen. Sic tumores vteri interdicit adstringere Hippocra. Etiam dysentericos in deterius labi adstringentium usu, cui dentissimum est, nisi ex his sint quæ leniendi & attemperandi vires habeant. Prætereà si quando oportuerit purgantibus adstringentia admiscere, mitissima sint, ne purgantium vi superata, maius malum succrescat. Insuper, licet in principio vlceris, ne inflammatione teneatur, & in fine, vt citius ad cicatricem perueniat, adstringentibus posse vtī consulat Galen. quia tamen carnis generationem nara sunt

Libr. 2.
& 3. de
morb.
Li. de sub
figura em
purit.

Li. de cō-
stit. artis
mod.

Libr. 7.
pharma.
loc. c. 4.
Lib. 1. de
morb.

Lib. phar.
gen c. 12.

sunt impedire, quātum possibile sit ea vitare oportet, vt etiam idem Galen. aduertit, maximē post habitū inflammationis timore aut tempore. Præterea cautē est eisdem vtendum in maximis inflammationibus: nam vereri oportet, ne prohibita ventilatione in corruptionem commigrēt affectio. Sic neque in magno echymosi: nam idem periculum instat, vel saltem ne quidquam sanguinis discutiat, sed fixius ibidem inhæreat. Pueris item læuia sunt adhibenda, quia facilē quibusuis cedit eorū substantia. Sunt etiam quædam partes, quæ nulla ratione adstringentia admittunt, & reliquæ quæ ipsis plurimum gaudent, quas subitico, quia diffusa oratione Galen. annumerat.

Li. 3. Metho. c. 4.

Libr. II. cap. 16. phar. gen.

DE RECTA LAXANTIVM
auxiliorum administratione

INSTITVTIO V.



Vanumuis laxum & molle quodāmodo assimilari videantur, sicut durum & tensum, cum hoc tamen inter se videntur longissimis intervallis dissidere. Nam tensum & laxum solum pertinent ad partes, durum verò & molle potius ad partes simplices & ad humores (non loquor de his quæ naturaliter talia sunt, vt ossa) tunc sic licet conijcere tensionem fieri, quoties materia quævis, seu vapor, seu flatus vacuitates partium replent, extendique

Institutionum Chirurgicalium

Lib. I. de
diff. resp.
cap. 3.

tendiq; cogunt: nam quæ à frigore rigent, seu spasmo tenentur, cōtrahi potius quā rēdi iure optimo dixeris. Sic laxū facile constat esse, cuius partes remissæ inter se cōcidūr, nō vi, vt in cōgelatione contingere diximus, sed laxitatis ipsius interuentu. Quibus consideratis, constat euidenter differentia duri & tensi, & mollis ac laxi: nam durum, Sole, æstu, labore, & his quæ diaphoretica sunt, potius fit, sicut molle è contra, vt cap. de emolliētibus euidenter constabit. Meminit quidē Gal. triplicis laxitatis differentia: nam scribit differre longè collapſionem à demissione & laxitate: collapſio quippe est subita demissio (nam demissiones paulatinæ ex facultate fiunt) citra vllum facultatis interuentum: laxitas verò absque facultatis virio, sed partis substantia tantū molliori facta: quo fit, vt laxitas partibus viuētibus familiaris sit, secus tensio. Rursus hæc laxitas, quæ nobis hoc capite se se offert, duplex est: altera morboſa, quæ ex præternaturali causa, partis temperiem vitiantē proficiſcitur: altera verò, quæ in partibus præter naturā tensis, medicamentis laxantibus perficitur. Quæ ratione tot necessariò tenētur esse medicamentorū differentia, quot sunt laxitatis species: sed rursus est auxiliorū differentiam rimari, penes causæ quæ tensionem efficit, varietatem.

Tensionem esse dupliciter considerandam euidenter constat ex Galen. decretis: vno modo, cū circa articulos accidit, ligamentiſ pariter & tendinibus affectis, quibus tensio contingit ipsis exsiccatis aut refrigeratis: nam id quoque inter tensiones numerare licet, spurias tamen, maximè cū phlegmone aut scirrho afficiūtur. Alio verò modo in cute, non hac tantū ratione, sed musculis qui

eis subiecti sunt quoquo modo in tumorem subla-
tis, aut ipsa ex receptione alicuius prædictarum sub-
stantiarum, plus iusto extensa. Quamobrem ex la-
xantibus medicamentis, quædam partē humectare,
alia emollire, plura item vacuare, plurima discutere
necessum est, licet quæ emolliūt ex accidenti laxet,
præter ea quæ frigore desaras partes simul cū siccita-
te, humiditate emolliēdo simul cū calore laxant.
Quo fit, vt meritō ea Gal. inter laxantia enumeret,
ob idq; docet, induratis tantū ex his causis proficua
esse: nā reliquis tensionis causis nil profunt. Sed cla-
rius adhuc laxantiū differētiā & vsum ostēdit lo-
quēs de aqua calida, quā omni tensionis speciei con-
uenire docuit. Quæcunq; enim (inquit) ex reple-
tione erant intentæ, sicuti omnia quæ inflammationē
patiūtur, ea dū euacuātur, laxari consueuerūt: quæ
ex concretionē, ob refrigerationē intentionē
habent dum calfiunt: quæ ex siccitate, dum hume-
stantur: quæ ex humiditate, dum superfluo humo-
re innaniuntur: quoniam calida aqua hæc omnia
præstare potest, cū amplius ac diutius corpori
tuerit infusa.

Sed qualiter cuiq; tensionis forti oporteat sub-
tenne, explicare iam aggredior, induratorum tra-
ctationem differens vīq; ad propriū caput: si prius
dixero, chalaistica seu laxantia medicamenta varia
almodum esse, pro causæ tensionis differētia. Quæ
enim ex refrigeratione intentæ sunt, vt. laxa fiant,
sensim & paulatim calfacere oportet, ne subita al-
tiratione partes dolore tenatæ nouam fluxionem
concitent. Sic aqua modera ē calida, & oleū amy-
gdalarum dulcium calidum, aut sesaminum prodest
est comperrum, cauētes ignis accessum, quia subita
caloris actione dolores concitat.

Li. 7. phar-
ma. gen.
c. 7.

Li. de his
quæ in me-
dic. text.
15.

Institutionum Chirurgicarum

Pari etiā ratione, quæ ex siccitate tenduntur partes, humectatione egēt, vt laxiores fiant. Partes etenim sicce duobus modis tēdi possunt: vno depauperata parte substantifica ac natina humiditate, quæ nulla ratione humectari ac laxari deinceps potest; nisi alimentis per nouam refectionem: alio quidem dum partes sua natura mucidæ ac macore & madore exuberantes, à calore externo, exercitio, solis æstu, & huius generis alijs priuantur madore ipso naturali: quo fit, vt partes tendi cogantur: quibus opitulatur potius madefactio quàm humectatio: madefactio quidem quæ aqua & alijs liquoribus ac inunctionibus fit: quæ sanè longè distat ab humectationis natura: nam hæc primò desiderat refici alimentis, iuuatur tamen balneis & extrinsecus madefactione, qua partes melius disponantur: illa verò primò requirit madefactionem: cum hoc tamen proficua est alimentorum quæ mucida sunt, & aquosa refectio, cuiusmodi non rarò cōtingit in articulis & lassitudinibus, quibus balnea mirū in modum profuisse constat.

Laxant eodem modo, ac vehementissimos sedant dolores, quæ tumores præter naturam expugnant: aperto namque tumore protinus concidunt partes. Sic vniuersum corpus, cum tensiua lassitudine tumet ac riger, sanguine confertim extracto, protinus subsidet: laxatur quæ. Quibus affectionibus nulla ratione paulatinis auxilijs agendum est, vt balneis, frictionibus, inedia aut exercitio, sed his quæ subito plenitudinem demant: alijs verò tensionibus quæ ex particulari aliquo humore coactantur non sic, sed lenrè & paulatim vacuare & laxare oportet.

Quartus verò laxandi modus sic profectò lenrè & pau-

& paulatim exercendus venit, quo securius insensibiliter pars ab humore replente liberetur: veluti in partibus inflammatis contingit, quæ necessario requirunt quæ meatus aperiant: quo fit, ut calidis indigeamus auxilijs, discutientibus nimirum, & quæ per insensibilem halitum humores dissipent. Rarefacit quidem moderata caliditas, quæ aperit sibi vias, & quod obstat ingressui, mediocriter per halitum discutit, sine aliqua exsiccatione substantiæ membri, ut patet de aëre balnei, & de aqua tepida: talia igitur, moderatæ nimirum caliditatis sint oportere medicamenta, quæ rarefaciunt, ne adurant: tenuis substantiæ, ut penetrent: humida, vel temperate humidis commista, ne exsiccent, & partes costringant, ut Galen. aperte docere viderur. Differunt tamen rarefacientia medicamenta ab aperientibus, utpote quæ crassarum sint partiū, & substantia mordaci & acri, quibus non indigemus ad diffusionem & rarefactionem. Nam quæ rarefaciunt, moderatioris sunt caloris: siquidem calor non ratione sui, sed ex accidenti est opportunus, nimirum quatenus meatus aperit: cuius census sunt lilium, lini semen, camemalum, scœnugræcum, sampfucus, pulegium, calamintha, & id genus. Pari modo rarefaciunt buryrū recēs, oleum dulce, ceclypus, adeps, & reliqua quæ intra secundum gradum calfaciunt: quæ omnia efficiunt, quo minus cutis resolutioni impedimento sit: humores ipsos præter id attenuat & discutiunt, quibus resolutis, faciliè tensa pars subfider & laxatur.

Li. 5. sim-
c. 13.

Superest adhuc quintus laxandi modus, qui per eadem fit medicamenta, quæ eis quidem partibus quæ cutaneæ & membranatæ sunt, flatibus tamen tenduntur, proficua existant, ut sepe sub cute, in

Institutionum Chirurgicarum

testinis, vesica, vtero, ventriculo, ac thoracis tegumentis contingit: excitatis vehementibus cruciatibus, quibus medicamenta prædicta sunt proficua, admittis tamē quæ molliā & lenia sunt, quæ partē tensam quodammodo obliniant, & cedere tendēti substantiæ faciant, quo minus doleat. Quo fit, vt in coli dolore & reliquorum intestinorum exsistat, clysteria quæ emolliant & discutiant miro modo profint. Cæterum hæc medicamenta, tensis ex frigore mediocriter calida sunt adhibenda, neque inflammatis partibus, nisi transacto principio. Hæc itaque sunt chalastica medicamenta, quæ cū tensio multis modis contingat, videntur plures obtinere laxantium species. Nam quædam humectando laxant: alia molliendo: nonnulla vacuando: rursus quædam aliud quiddam efficiendo, vt nuper dictum est.

DE RECTO EMOLLIENTIVM *presidiorum usu*

INSTITVTIO VI.

Lib. 3. de
sanit. tr.
c. 5.



TATVIT Galen. durum & molle, similaribus tantum partibus accidere, rarum verò ac densum ob meatuum structuram, instrumentalibus, quibus pari lege conueniunt tensum & durum ob plenitudinē solum oboritur, quod potius tentum aut renuens appella-

appellare docuit Gal. Nam durum hac in parte fit
 tribus modis fieri, repletionem videlicet, siccitate,
 aut concretionem. Cæterum cum ex concretionem
 aut siccitate (nam de tensione præcedenti institu-
 tione actum est) humores in particulis induruerunt
 (quibus propriè emollientia medicamenta profi-
 cua sunt) id sæpe duabus de causis contingit. Alte-
 ra est caliditas, quæ partem exsiccando, humores
 ibidem impactos, digesto per halitum, quod eorū
 tenue est ac subtile, densos solidosq; ac duros effi-
 cit: reliqua verò est frigiditas, quæ concretionem
 eosdem duros efficit, ut in glacie & grandine sæpe
 conspiciamus falsam quandam sicci imaginem re-
 præsentantia, potius quàm quòd re vera talia sint:
 nam verè dura calore medio fiunt, sicut & sicca, ut
 Gal. placuit. In cuius rei consideratione scire oportet,
 siccitatem posse duobus modis fieri, videlicet
 alteratione quadam noua inducta siccitate, per
 ablationem partium humidarum, aut per compressi-
 onem humiditatis contentæ à terrestribus par-
 tibus siccioribus, ut dictum est de glacie & con-
 gelatione. Sic prorsus humiditas duobus modis
 comparabitur: aut enim alteratione fit, qua ea res
 exuat siccitatem priorem & induat humiditatem nouam:
 aut resolutione quadam partium aquearum, quæ
 compressæ constipatæq; prius erant, vel coactione
 vaporis in aqueam naturam, vel per subingressum
 in poros partium aquearum dissolutionemq; terre-
 strum, prius in vnū coactarū. His suppositis, dicen-
 dū est, coagulationem genericè sumptā, prout cōti-
 net omnē duritiæ sortem, interdum fieri à calido
 per se, si calidum illud fuerit etiā siccum, quæ vera
 durities est: tum inducendo nouam siccitatem,
 quatenus est siccum: tum componendo partes
 aqueas

Li. 5. sim
 piii. c. 4.

Libr. I. de
 tempera-
 mentis
 prope f.

Institutionum Chirurgicarum

aqueas, æreasve, & humidas cum terrestribus ficcis, necnon resoluendo partes aqueas in vaporem qui euolet & euanescat: quam quidem coagulationem, seu ficcitatem fieri à calido per se dicimus. Interdum etiam per accidens calidum efficit coagulationem, cum per antiparistatim cogit in vñ frigidum, quemadmodum in grandinis generatione contingit. Frigidum autem coagulationem per se facit exsiccando, si fuerit coniunctum ficcitati: item condensando partes aqueas in vnumque cogendo cum partibus terrestribus, à quibus fortius condensatæ etiam continentur, maioremque soliditatem accipiunt. Per accidens etiam frigidum coagulat, exprimendo partes calidas subtiliores immistas humido, cum quibus humidum quoque implicitum euanescit. Item per accidens coagulationem facit frigidum, si vi caloris humidum resoluitur, qui in vnum cogitur circumstante & cōstipante frigido: dimitto etiam hac in parte aliam permissionem factam, quæ huic instituto minimè conducit.

Hæc profectò sunt, quæ breuiter de duritie & coagulatione colligere potui: incumbit nunc docere, quam ratione quæ dura sunt & coagulata, liquari & emolliri possint. Liquefiunt itaque coagulata per se à calido, quoniam calidum partes in vnum coactas à frigido rarefacit, & disgregat, simulque disiungit partes terrestres, quæ vi frigoris arctius continebant partes aqueas. Pari etiam ratione calidum, vt per accidens congelat, ita per accidens liquefacit, quando scilicet resoluit partes aqueas in vaporem, simulque in vnum cogit partes frigidas per antiparistatim, quarum vi vapor ille disgregatus in aquam cogitur, vi frigiditatis in
vnum

vnum coactæ, à frigido verò per se liquefieri dici possunt, improprie tamen: vapor enim in aquam cogitur à frigore, sicque cōdensando & coagulando frigidum liquefacit. Item à frigido humido liquefcunt sal, nitrum eiusque generis alia. Per accidens etiam à frigido quedam liquefcunt, quoniam à frigido expellitur calidum, cuius vi fit crassitudo & impingatio. Quæ verò vi caloris dura per se fiūt, solum euolatis humidis partibus, & intro coërcitis terrestrioribus, dura fiunt, agente semper calore, rarefacienteque adeò vsque ad tenuitatem quæ faciliè euolet & deserat proprium subiectū.

Quibus sic suppositis, docere nunc incūbit, quæ via quævis duritiæ species à suis causis proficiatur, vt eādē emollientia medicamenta propria & magis proficua facile sit cuius adhibere. Causæ tamen quæ mediante calore siccitatem inducunt & duritiē, quales sunt validū exercitiū, solis æstus, inedia, febris ardens, ac medicamenta quæ subito & vehemēter calfaciūt id quidem efficiunt, extracta ab humoribus subtili substantia, ac dum crassa terrestrior remanet, cogitur duriorque efficitur, quia aërea aquosaq; substantia orbat: quibus humida pharmaca prodesse est compertum, quia humudum viscidum separat à parte cui adhæret, & crassum missione attenuat.

Causæ verò quæ concretione duritiem molliunt, qualis vehemens est frigiditas, faciliè calore superantur & mollescunt. Sed condensationis à frigido triplex reperitur causa: vna à foris incidentibus, putà aëre, aqua, aut medicamento indexterè adhibito: altera ex propria partis intemperie, quæ humores in eam profuentes duritiem faciliè perpetiuntur scirrhusam: tertia quidem ab influente in ipsam

Institutionum Chirurgicalium

Li. 5. sim-
pli. cap. 6.

Ipsam partem humore, qui resoluta parte tenuiori
facile duritiem contrahit. Qua ratione dictum
est à Galen. humectantia medicamenta ijs quę ex
siccitate indurantur, tantum esse proficua: alijs ve-
rò quę ex concrezione dura fiunt, quę verè emol-
lientia appellantur: non quidem vt multi falso au-
tument, calida & humida (qualia debentur duritiei
per congelationem mediante concrezione) sed po-
tius calida & sicca. Quod eleganti oratione docue-
rat Galen. dicens: Oritur autem induratorum affe-
ctio ex fluxione viscosa & crassa paruis particulæ
poris siue meatibus impacta, digesto verò eius quod
tenue est & subtile per halitum, ac deinde quod re-
liquum est, refrigerato ac veluti congelato, scirrhus
sequitur dispositio, ac proinde frigidum pathos
aiunt. Porro quoniam cum frigiditate humor re-
dundat superfluous, id circo compositam eius esse
medellam oportet, ob refrigerationem scilicet, ex-
calfaciencia poscente affectu, ob alienam verò hu-
miditatem quę mediocriter siccatur. Quibus eviden-
ter constat, emollientia pharmaca, quę talia de-
bent esse, sicca & calide naturę necessario fore.
In quorū electione, ea fore proficua sunt arbitran-
da, quę nec nimis intensa, nec remissa caliditatis
sint: cuius naturę sunt quę in secundo gradu vi-
gent, nec ultra nec citra: quę sanè humectiorem
reddunt partem, quamvis ipsa sicca sint, liquata ca-
lore materia, quam exsiccare tenetur eorum me-
dicamentorum siccitas. Quo sensu intelligendus
est Galen. qui de emollientibus hæc refert verba.
Illa verò ceu maiorem calorem, quam pro natura
accendenda sunt, ac nonnihil quoque humidita-
tis contrahenda, qua ratione oportuit esse sic-
cę naturę, qua contererent humiditatem. Ve-
rū

Li. 5. sim-
pli. c. 2.

rūm quia periclitaretur partis substantia, si cum hoc, quod calida & sicca essent, etiam tenuium fuissent partium, necessum fuit quodammodo terrestria esse, ut mineralium pleraque, quæ huiusmodi distillationi maiori quàm par foret, quodammodo obsisteret: & ob id emollientibus mineralia admiscemus gratia attemperandi calorem induratorum, qui sæpe contrahitur, tū etiam ut laxantia quibus admiscuntur, non subsint ita mollia, quia aliena sunt ab huiusmodi induratione. Cum hoc tamen consulit Galen. alia quæ tenuium sint partium admiscere, sic scribens. Emollientium medicamentorū misturam laudavi, nimirum ut præparantē indurata corpora, & prædictis pharmacis idonea facientem: & cum hoc eadem parte monet, id cautè esse agendum, nisi malum sit in membris interioribus, ut in iecore, tū penetrationis gratia, tū quia membrū cōpagis est humidæ. Proinde quamvis innumera sint calfacientia simul & deficcantia medicamenta, sola tamen ea quæ convenientem ac finetrum calorem possident, vnamque illi correspondentem siccitatem sunt sortita molliiri possūt, quæ scirrhi instar indurata sunt: quod etiam consuluerat Gal. dicens: Non igitur curandæ sunt partes induratae medicamento immodicè ficcāte, sed cum eo quod calorem habeat tepidum, humiditatem verò neque multam neque minimam: quod enim superfluum humorem habet, nihil omnino dissolvit: quod verò minimū, plus quàm oportet exsiccat. Quo fit, ut malactica, hoc est emollientia medicamenta, eodem tempore utrūque simul sint agentia: nepe quod cōgelatū est, fundentia, & sensim per halitum digerentia: peculiariter enim medicamentum emolliens, non omnibus induratis

Li. 8. phar
ma. cap. 8

Lib. 2. ad
Glauc. de
scirrho.

Institutionum Chirurgicalium

ex quavis causa ex usu erit, sed his, quæ congelatione indurauerunt, magis, si in eis sit concretus humor præter naturam. Tale enim est, bdellium, styrax, galbanum, tyimiana, amoniacum, medulla ceruina, adeps caprillus, & alia, quorum inferius meminero.

Libr. 8.
phar. loc.
c. 8.

His suppositis, necessum est docere, ea quæ indurantur, posse vna ex quatuor dispositionibus manere: prima qua dura manent, citra alterius qualitatis commercium, quibus quæ verè emollientia dicuntur, proficua esse constar. Secunda, cum duritiei associatur lentor & visciditas, cui iure optimo debentur emollientia ea, quæ aut tenuium sunt partium, aut eisdem commiscuntur, vt docuerat Gale. dicens: Quæ verò ob frigidos ac viscidos humores in solidis corporibus imbutos indurantur, ex necessitate frigidam habent affectionem, quare & calfacientibus, simulque tenuium partium phar-
macis opus habent: hæc enim efficacia sunt, & ad visciditatem humorum induratis partibus infar-
torum extergendam, & ad secandam crassitiem, & dis-
cutiendos humores ita extenuatos. Sunt autem hæc acerum mulsam, vel in quo hyssopum, thymū, pulegium, anethum & similia præcoxis, aut oleū prædictis herbis decoctum. Tertia autem forma dura manent, quæ in callosam, tephaceam & lapideam naturam degenerant: quibus frustra adhibemus emollientia nuper dicta. Quapropter his porrigere oportet, quæ humidam & fluentem subitan-
tiam habent, tenuissimamque cum multis partibus igneis vel terreis attenuatis. Cui vsui concedun-
tur liquores, qui vel purè acidi sunt, vt succus limo-
num: vel purè acres, vt succus chelidonij: vel mixti
ex utroque, vt acetum, præsertim scyllinū. Quibus
duritiei

duritiei modis addi potest quarta, nimirum cum durities, utcumque sit, commistam secum habet renuium, acrium & erodentium succorum fluxione, cuius ratione in vlcus cancrorum degenerare solet scirrhosa durities. Cui vsui deferuntur quidem quæ emolliunt, & æterum admittis non solum mineralibus, sed additis oleo mādtagoræ, succo solani, & aliorum quæ frigidissima sunt: quorū lib. de fecmi. morb. copiam reperies.

At quia non est vnica corporum omnium, aut corporis partium conditio, sicuti neque vnus duritiei gradus, ideo scire oportet, plures esse & varios medicamentorum emollientiam ordines, iuxta maiorem, aut minorem corporis, aut partis vel tumoris excessum. Sic imbecilla molliencia paruis medicantur inflammationibus, ut etiam insinuauerat Galen. his adhuc fortiora, leuem duritiem sine phlegmone persanant: validiora itē maiores, quæ admodum & quæ duritiem in scirrhum propēdegenerantem curant. Cui vsui extant apud Galen. quatuor emollientium medicamentorum ordines, quos ad duos tantū placuit reducere, quia hi etiā adhuc differūt ratione maioris aut minoris solūm. Primi autem ordinis sunt (in quo item quedam leuiter & alia efficacius agere reperiuntur) cera alba, butyrum, axungia porcina & vitulorum, sepū, axungia anatis, anseris, gallinæ, & sipus, lana succida, oleo amygdalarum dulcium iniuccata: quibus aliquod ex mineralibus addere oportet. Quæ verò secundi sunt ordinis, validiusq; emolliunt, in validis etiam & robustis corporibus, aut inueterata duritie profunt, ea quidem sunt ut Gale. refert, gutta ammoniaci, bdellium, galbanum, ladanum, propolis, thus: pingua etiam, verū vetusta, & hircorū,

Libr. 7.
pharma.
gen. c. j.

Libr. 7.
pharma.
gen. cap. 4.

Libr. 7.
pharma.
gen. c. 3.

Institutionum Chirurgicalium

taurorum, leonum, maximè si aceto liquentur, quo tempore tophaceas durities emollire etiam possint.

Variè hæc omnia confici possunt iuxta partis affectû varietatem. Partes namque neruæ, dum scirrhosæ fuerint, nullo aut modico aceto emollientia commissa desiderant: sat est partem oleo & aceto calidis euaporare, quo disponatur ad emolitionem suscipiendam. At in partibus mollioribus & rarioribus, dum abditæ sunt, vt splen & iecur, aut quæ neruis carent, vt carnosæ musculi partes, tutior est aceti vsus penetrationis gratia. Quapropter musculis, carnosis partibus scirrhus affectis, ammoniacum aceto liquatum plurimum confert, dum interpositis diebus cataplasma ex althæa, radice lilij, axungia porcina & oleo liliorum vtamur. In tendonibus verò & ligamentis, solo vtitur Galen. aceti vapore, in quo ferrum candens aut pyritis lapis extinguntur. At dum scirrhus in mammis contrahitur, cautius aceto est vtendum: faciliter enim harum partium substantiam aceto demolliemur, nisi affectus inueteratus sit, & corpus robustum: quo tempore Gale. modico vtitur. Vteri quidem durities omnino acetum renuit, sicuti ea quæ ventris os attingit, licet hæc euaporationem sustineat, illa autem nequaquam.


Li. 4. methodi

Libr. 2. ad Glau.

Reliquas durities subriceo, quia Galen. id copiosissime docuit.

DE APERIENTIVM AVXILIORUM administratione

INSTITVTIO VII.



VI aperientibus auxilijs probè vti studuerit, primò diligenter perdiscat differentia cavitatũ, quæ in corpore occludi possũt, vt iuxta cuiusq; naturam & locũ aperientia auxilia administrare sciat. Ex cavitatibus itaq; quæ in corpore præ sunt, quædam sunt insensibiles, velut cutis meatus: quedã verò euidẽtes, vt cavitates venarũ, arteriarũ, vetriculi, intestinorũ, renũ, vesicæ, vteri, pudendorũ, ani, aurium, narium, faucium, & meatuum qui ad vrinam & semen transmittendum comparati sunt: itaque vt varij sunt meatus, ita & variæ reperiũtur obstructions. Cutis igitur meatus ab his quæ habent vim densandi, cuiusmodi est externũ frigus, vel adstringendi, vt aquæ aluminosæ, vel exsiccandi, vt Solis feruor, vel indurandi, vt duræ frictiones, potissimũ constringũtur: caloris etiã retrocessus ad interna viscera, extremã superficiẽ densiorem reddit: sordes itẽ quæ adhærent cuti: & ei admota emplastrica, vel terrena medicamenta.

Cuius rei gratiã statuendũ est, medicamẽta aperientia esse in duplici differentia: quedã enim rarefacientia appellãtur, quæ tantũ sunt proficua cutis ob-
turationibus: quædam rursus verè dicuntur deobstruentia, quæ magno dissident intervallo, vt

Institutionum Chirurgicarum

Li. 5. lib. 1. Galen. statuit: namque rarefacere, tantum est super
ficiem cutis magis solutam reddere, ut vapores per
ipsius meatus commodè diffiliari possint, aperire au-
tem, est ad profunditatem meatorum penetrare, ob-
struentiaq; corpora attenuare, abstergere & excu-
tere. Sunt itaque rarefacientia modicè calida, mi-
nimè desiccantia & tenuium partium: aperiētia ve-
rò, crassè substantiæ esse oportet, & maioris calo-
ris, cum ad profunditatem penetrare teneantur, quæ
non oportet secundum gradum caloris transcen-
dere, nec plus crassitie obtinere, quam par sit, ad
sustinendum diutius calorem.

Cutis igitur dum constringitur, rara fiet, calore,
humore, aut calore & humore simul, vel motu: dū
verò ab externo frigore cōstringitur, modicè cal-
faciētibus rarefcit, ut aëre calido, quemadmodum

Libr. 1. Galen. consuluerat, inunctionibus, tegumentis, fri-
ad Glau. ctionibus etiam, quemadmodum Hippoc. scripse-
ca. 3. rat, nec non & idem Galen. Cauendum tamen est à
Li. de his duris frictionibus, ut quæ densiorem & duriorē
quæ in reddant cutem. Quod si aquæ aluminosæ contactu
medicat. densitas prodeat, vel alterius similis medicamenti
Li. 3. Me- accessu, profunt foris ex oleo repido, amygdalarū
tho. dulcium, euaporationes ex dulci aqua, calidi etiam
aëris contactus. Verum à Solis æstu aut dura fri-
ctione balneis aquæ temperatæ & prædictis inun-
ctionibus laxa fiet: cōstrictiones à caloris retroces-
su curant: extimarum partiū frictiones & totius
corporis, donec rubescant. Quibus autem ob pul-
nerem aut sordes meatus obturantur, absterfiones
profunt ex fursure, farina fabacea, oleo & nitro, ut
egregiè docuerat Auicenna. loquēs de opilatione
non profundata.

Li. 4. fen.
3. 4. 36

Sed longè maius negotium facessit patētiorum
meatorum

meatuum obstructio, tum propter causarum varietatem, tum propter partium diuersam naturam. Sed in vniuersum cavitates ex angustiores redduntur, quando corpora quæ cavitatem constituunt, comprimuntur, concidunt, contrahuntur, obstruuntur, coalescunt, tenduntur, distorquentur, vel à suis sedibus egrediuntur. Cōpressio nāq; contingit vel ob adjacentis corporis, aut ipsius partis extrinsecū tumore, vel re grauem arctius alligatam. At cōcidunt latera meatus constringentia, dum nimio humore imbuta, suum terminum retinere nequeunt, vel cū euacuatur id quod in cavitare contentum latera inter se distare faciebat. Contractio, genim à siccantibus nascitur, corrugatione media, sicut fit ab adstringentibus medicamentis, aut à facultate retertrice vehementius cogente. Porro obstructio fit à rei, quæ in cavitare continetur, crassitie, lentore & multitudine; quorum quædam familiaria sunt ipsi parti, vt cibus, & sanguis contentus in venis: quædam excrementa sola qualitate inimica, vt crassi, tenacesque humores: quædam quantitate: alia etiam tota substantia, vt lapis in vesica, pus, sanguis concretus, callus, stercus durum, vel tuberculus aliquis, aut copiosa pinguedo. Coalescunt insuper partes, cū vulneratæ vel viceratæ fuerint, intercedente nimirum carne, vel ex coarctato coalitu. Item luxatæ partes, vel malè figuratæ, vel vtrunque à sua sede dimotæ angustiores efficiunt meatus, & malè dispositos. Ex qua causarum varietate constat, quàm difficile sit aperientibus medicamentis vri.

Institui cuiusque obstructionis differentiarum modum aperienti seorsum scribere, quo clarior euadat docendi ratio, ne quis everso ordine aperien-

Institutionum Chirurgicarum

tibus utatur. Sic cum ex tumore præter naturam, aut quouis alio meatus occluduntur, non aperiuntibus, sed his quæ aut tumorem præter naturam curent, aut rem adiacentem auferat, curari desiderat. Verum dum laterum concisione delitescunt meatus, inspicere oportet, an ex nimia humiditate id fiat: quàm sudoribus exficcare, aut alijs auxilijs facit: item an cõcisa sit vena ob immodicam vacuationem, quæ per alimenta optimi & copiosi nutrimenti aperies. Quod si ex siccitate corrugetur, balneis, inunctionibus & alimentis rem humectabis. Adstringentia medicamenta, si id fecerint, auferenda protinus sunt, & pars fouenda dulci oleo & moderata frictione. Quod si robur contentricis facultatis id fecerit, deijciendum est repidis, pinguis & mucilaginosis, & nonnunquam expultrix excitanda est, ut contra operetur: dum verò situs partium mutatur, eas ad antiquum statum reducere sat est.

Obstructio quidem quæ longè maius facessit negotium, tribus omnino capitibus continetur, iuxta tres communes vias humoribus defferendis, aut excrementis excernendis destinatas: nimirum omne venosam genus, intestina, & instrumeta urine feruientia: nam dereliquis omnibus actum est humis quæ sufficienter.

Urinæ autem feruientia instrumenta, dum obturantur, longè maius facessunt negotium: quippe obstructur ab humoribus crassis, à sanguinis grumo, à pure, à tuberculo, aut tumore quouis præter naturam, à carne succrescere aut caruncula, & vltimò à lapide. Quæ sanè causæ hoc habent in curatione commune, quod antequam medicamenta, quæ contra causam pugnent, adhibeantur, exposculant à vesica urinæ prius

prius deponi, ne nobis præter spem contingat, foramine adhuc obrurato, medicamentis quibus salutem speramus, maiorem allicere urinae copiam, grauioraq; symptomata concitare. Sic prius fomentis, infusionibus, inunctionibus, catheteribus, moribus vehementioribus urina prouocanda est, vesicaque ab onere liberanda, & mox pro ratione cuiusque causae curatio aggredienda. Si tamen ab humoribus crassis & viscidis obstructio fiat, praemissa per vomitum aut expurgantia pharmaca ventriculi & totius corporis prouidentia, omnia quae obstructionibus venarum & interiorum viscerum in eisdem causis profunt, adhibenda sunt: dummodo illis admisceamus quae urinas mouet, ea solum quae meatus urinarios abstergere possunt, non quae urinae copiam ad eas partes alliciunt. Verum si sanguis concretus meatus obstruxerit, adhibitis quae lapidem comminuere nata sunt, alia mox leges, & additis etiam calidis medicamentis curationem perficies: namque non sat est, esse tenuia, acrida & acida, nisi calidioris aliquid obtinuerint: fundit enim quod concretum est calidum medicamentum, ut oximel ex decocto artemisiae, rubiae, aut betae vel rubi cum leporis aut hedi coagulo & aceto mulso. At purulenta materia ea medicamenta exoptulat, quae abstergeri potentia obtinent, non laxantia & emollientia, ut nonnulli consulunt. Quippe affectus & causae natura solis abstergentibus gaudet, maxime si eis miscuerimus, quae tenuandi vim obtineant ac mouendi etiam urinas, ut cap. de abstergentibus repeties.

Quod si supercrescens caro aut verruca, vel caruncula aliqua pudendi meatum obstruxerit,

Institutionum Chirurgicarum

longè diuerſam rationē aperiendi deſiderat (præ-
termiſſa Galen. curatione tanquam ſuſpecta.) Nam
que in huiusmodi obſtructione, quæ carnem ex-
cendi, & carunculas perforandi vires habeant, ſunt
adhibenda, præmiſſis quæ emolliunt, laxant, ac
dilatant partes per inſeſſiones, fomenta, inunctio-
nes & emplaſtra, à quibus mox tentare conuenit,
haſtulas petroſelini, iunci aut maluarum per cana-
lem ad veſicæ uſque cavitatē immittere, quibus, ſi
fieri poteſt, caro aut caruncula perforetur. Quod ſi
ob duritiem fieri nequeat, inferēda leniter eſt can-
dela cerea (cauendum tamen ne intus frangatur, ne
aliquid eius aut aliorū intra veſicam excidat) quod
ſi ita res ſucceſſerit, quod caro rampatur (quod ex
ſaltu, & portione candelæ ingreſſa cognoſces) ma-
iorem re exiſtima feciſſe partem. Verū ſi nō per-
meauerit, conficienda eſt virgula plumbea, qua ite-
rum conari oportet carnem dirūpere: quod ſi hæc
adhuc non profuerit, argenteo carherere utēdum
eſt, donec caro paulatim & leniter perforetur, ac
ſedato ſanguinis fluore, & reſta ibidem per diē
candela cerea, aut iunci haſtula, poſtea extracta cu-
rioſè eſt inſpicienda: & qua parte ſit cōruſa & com-
preſſa, circa eam obducendum eſt medicamentum
huius aperiendi continuandę proſicuum, exſiccans
nimirum & erodens, quod carnem depopuletur &
excēdat, qualia ſunt ex mineralibus & metallicis plu-
ra. Verū quia in rebus dubijs, incertis & pericu-
loſis ſariuſ eſt expertis uti, quā intrepidè noua
experiri, placuit ſcribere mirabile illud vnguentū,
quo ſæpe & iurō utebatur Luſitanus quidam in
hac re peritiſſimus. Recipit quidem eruginis, auri
pigmenti, calcei hidos (virriolum vocant) aluminis
ſuper, ſingulorum. ℞. ij. perfula acerrimo aceto
inter

inter duos marmoreos lapides ducantur accuratissime, redactaque in leuiorem tenuissimum exponatur Soli caniculari: exsiccatu puluis rursus aceto affuso, ducendus ac laeuigandus est, Solique similiter exponendus: id quod octo aut nouem diebus facere necessum est, donec partium summa tenuitate acquisita omnem prorsus acrimoniam atque mordacitatem amiserint: namque fortia medicamenta, ex aceto diebus pluribus contrita, morsu quidem & acrimonia carent, vires tamen maiores acquirunt. Confecto itaque puluere, accipito argenti spumæ (quæ lythargireos appellatur). 3ij. olei rosacei. 3. iiii. quibus per cocturam ad emplastrum formam redactis illius. 3ij. permisceto cū pari portione predicti pulueris: aut minori, si imbecillius facere studueris. Quod quidem vnguentum mitius adhuc efficies, si olei seminis cucurbitæ. 3. ij. admiscueris, & ad formam linimenti mollioris effeceris: cuius autē aliquid in se recipiat candelæ cerea parte signata à carunculæ foramine excavata: curandumque est, vt ei parti exquisitè adhæreat: vel candelam inuolues linteo molliissimo in circuitu ad modum lineæ gyratiuæ, supra quod vnguenti aut linimenti aliquid appones: nam fixius ea arte adhæret medicamentum: & tunc perstabis in hoc opere donec carunculam extripasse cognoueris ex libero vrinæ exitu, & ex facili candelæ transitu, & nullo aut paucissimo pure excreto, mox tamen vlcus absterges & conuenienti methodo curabis.

Quod si vrinarium foramen, aut aliquod eorum quæ à renibus in vesicam deferuntur, lapide obstruantur, aperienda solum via est lapide fracto, aut à foramine femoro.

Institutionum Chirurgicarum

vesica est multi tentarunt, frustra tamen: & cum hoc ego etiam tentabo idem efficere: non tamē dū in duritiem lapideam commigravit, sed cū adhuc in glutinis formā concreuit solū: quod possibilis arbitror. Cui vsui pręstat scire, varia medicamentorum lapidem frangentiū genera à varijs authoribus scripta fuisse, diuersa quidē & sæpe cōtraria, vt faciliē apud Gal. reperire est, quod non citra maximam considerationem, & salubre medendi consiliū factum esse censeo: ex varia etenim frangēdi lapidē ratione, & ex varia lapidis dispositione seu ætate aut tēpore sumpta ad id indicatione. Quamobrem, postquam Medicus ex proprijs signis, lapidē inesse vesicę cognouerit, nō potest hoc aut illo medicamentorū genere indistinctē vti, sed à principio id adhibere teneretur, quod iuxta lapidis statū proficiū fore cognouerit. Cuius rei ratione sciēdū est, quatuor reperiri medicamentorū frangētiū lapidē genera multis doctissimorū compertū esse. Primū quidē rimari diligēter oportet, an lapis sit plurimū induratus, concretus & cōpactus: an paruo aut nullo glutine cōfectus: nā hoc esse lapidis principiu Hipp. his verbis statuit. Glutinū quidē sit pituita ad faciem admixta, & primò parua lanugo superstat, deinde quod accedit arenosum sit, glutino fiēte pituita: quod etiam eādē parte longius explicat. Quo quidē tēpore solent adhiberi calidiora, quā pro frangendo lapide forent necessaria, vt Gal. optimē aduertit, quibus exsiccatō debili, aut vt rectius loquar, dissolutio, & nondū cōcreto glutine, facilius inhibeatur lapidis concretio. Quę vsum pręstat inter alia, quę breuitatis causa prętermitto, mecoziana herba, vulgò tabaco appellata, cuius pulvis quātitate. -) j. cū tripla sacchari quantitate, & vino

Libr. 4. de
morb.

Li. 9. phar
ma. 1. c. 1

vino aut aqua saxifragæ exhibitus plurimū cōducitur: veluti stillatitia aqua ex calcitrata, & decoctū etiā florū & seminis eius. Verū si tā induratū esse lapidē cognouerimus, nō tamē omnino concretū, necessaria sunt ea medicamēta quæ tenuib9 cōstāt paribus, acida tamē & multo humore inundātia, & quæ calore sunt moderata: nam talia à tenuitate habent vt penetrent densas cōcreti lapidis partes: ab aciditate, quōd inscindāt & in minutissimas partes lapidē dissipent: à copioso verō humore, quōd madeficiant, & veluti emolliant: egēt tamē moderato calore: nam quæ acrius calfaciunt, magis indurāt, quā cōminuant lapidem. Cuius efficacix sunt succus limonū, oxalidis, radicis rubicberonica ipsa, graminis radix, adiantum, asplenium, smyrnij semen, ruuicis radix, vitis lacryma, semen maluæ siluestris, radices canarum, blitis, saxifragæ, vritica & alia huius naturæ. Tertiij generis medicamenta ea sunt, quæ improprie lapidem inscindere dicuntur: nam abstergendo tantūm atterendoque superficiem lapidis, ipsum conterunt, vt alpera omnia, sicut vitrum tritū, lapis spongiæ, lapis lincis, cinis leporis cōbusti, cinis corticū ouorum, lapis, vesicæ hominis aut porci & alia huiusmodi, quæ vt sunt parui momēti, ita voluntarie subriceo. Quarto loco ea oportet porrigere, quæ multam vrinam prouocent, vt quod ex lapide excussum est, & in arenulas aut frusta cōminutū, inūdante copiosa vrina pellatur. Qua quidē lege Medicus poterit, inspecto statu laborāus, porrigere quæ proficua fore sperauerit. Sunt præter hæc alia medicamenta, quæ à proprietate ferunt id posse: sed hæc prætermitto, nā plus fictitiū quā veri obtinere arbitror. Insuper copiosa reperiuntur nō pauca, quæ

Institutionum Chirurgicarum

quæ efficacius id possent efficere, si experimentū probasset, ut rationabiliter videtur composita. Et hæc sufficiant, quando brevis institutionum ratio plura non admittit, & lib. de inter. morb. curatio. larius scripsi.

At quod maius videtur negotium facessere in aperiendis meatibus, est venarum, tum viscerum, tum totius corporis obstructio. Quam efficere solent humores multi confertum & subito vasa obturantes, aut viscosi & crassi ibidem congesti, & vasorum tunicis adherentes, præpedientesque aliorum humorum, tum distensionem, tum distributionem sufficienter. Fert quidem natura patienter collectiones humorum, donec vel qualitate sua sint admodum molesti, vel crescendo iam incipiant eam premere: quæ si valens sit, eos aggreditur expellere vel deuincere: ac si impotens, humores ibidem permanere sinit, & obstructionem efficere: quod si multi aut calidi fuerint, febrem accendunt: si verò crassi & tenaces, minimè aut longo post tempore, ut Galen. mille rationibus probat. Eueniunt quidè sæpius ac citius huiusmodi obstructiones, in frigidis & foemineis naturis, quæ ob crudi sanguinis copiam, aut vitam ociosam & sedentariam faciliè his humoribus aut excrementis abundant, tardius verò in calidis.

Li. 8. phar
ma. lo. c. 6
Li. 8. & 11
method.
Li. de cō-
stit. art.
med.

Sed medicamentorum, quæ deobstruere possunt natura triplex reperitur, vna quidem quæ primum & per se humorum peccantium prauæ conditioni se opponit, euacuatione nimirum, si quantitate peccant, aut purgatione, si vitio aliquo: in scissione, attenuatione vel abstersione, si crassi, viscosi, & tenaces sint. Altera rursus, quæ ex accedenti obstructione demolitur, pondere videlicet, etiam si abstersione

sione id efficiant. Tertia verò continet ea medicamenta, quæ infartu liberant & obstructione, quæ à Gal. ecphrastica, & ecatarctica appellantur, quasi expurgantia & infartu liberantia dixeris: quæ omnia nitrosa & amara sunt, nonnihil adstrictionis habentia: cuius ratione, quæ circa ventrem sunt partes, quæ quæ in iecore, liene alijsq; visceribus, cum maximos in se meatus habeant, maius accipiunt commodum ex vasorum corroboracione, quam propter osculorum exiguitatem lædantur. Sunt autem ea vt scylla, iris, nitrû, aphronitrum, spuma natri & scryphon, & id genus reliqua, quibus raro utimur solis, sed ob humoris peculiarem conditionem ea quæ primi generis esse diximus, admiscere iubemus. Nam cum humores crassi, visceri & lenti plerumque obstructiones efficiant, ob id Galen. consulit ea esse adhibenda, quæ abstergerendi & attenuandi vires habent: nam abstergentia & inscindentia, visciditatis præsidia sunt, crassitie attenuantia. Inter quæ medicamenta etiam eligenda sunt, quæ cuique membro proficua experti sumus, veluti quæ iecur respiciunt, vt nardus Indica & Celtica, ex aqua frigida epota, lauri cortex, tribus obolis vino odorato sumpta, piceæ folia malsa diluta, gentiane radices succus, aut decoctû chamæpiteos, eringij, rapontici, agarici, betonica, eupatorium: quibus admiscere oportet succum, vel serapium cichorii aut absynthij, quibus etiam modicas lienis obstructiones auferre poterimus: nam quæ maiores sunt, vehementiora desiderant, vt capparis, corticem, radices ramarisci, scolopédrium, scyllam, asplenij folia, & alia id genus: cuius naturæ est. vinum in quo ferrum candens sæpius fuerit extrinsectum. Hoc tamè obseruabis, quod si iecoris cauû fuerit obstru-

Li. 8. method.
Li. 1. etiã
& 3. art. med.

Institutionum Chirurgicalium

obstructum, quæ ventrem soluūt admiscere oportet: si verò gibbum, quæ per vrinam purgēt: in lienis autem obstructionibus semper addere oportet aceti nonnihil.

Verùm hæc sufficere viderentur, necessum tamen est nosse quid primò sit agendum in deobstruendis visceribus, inscindendū ne, an abstergendum aut extenuandū, an simul totū peragendū. In qua re, nisi quid particularius obstiterit, semper attenuantibus primò est utendū, mox inscindentibus, & abstergentibus vltimò. Quòd si ex omnibus vnum cōposueris medicamentū, longè vtilius te fecisse existima: in quo tamen primis diebus attenuatio polleat, postmodum addere oportet quæ inscindendi vires obtinent, vltimò tamen abstergentia, & repurgantia vigeant necessum est. Qualia autem sint quæ attenuant & inscindunt, antea dictum est. Abstergunt quidem inscissos & attenuaros humores mel, saccharū, terebintina, addito rhabarbaro aut agarico: præsertim si his vtaris tertio vel quarto quoq; die-.ij. pondere, in aqua lupulorum facta infusione & expressione. Quorū sufficientem copiam reperies lib. de curat. morb. cap. de iecore & splene obstructis: nec non lib. de recto præsidiorum vsu.

Secundum autem apertionis obstructionum genus, maioris est efficacię & verustioribus affectionibus proficuum: quod perficiunt ea medicamēta, quæ (vt ferunt) sua gravitate deorsum ferre omne id quod in vasis antestat, vires habent: qualia sunt omnia medicamenta quæ ex chalybe conficiuntur. Quæ quidem, non solum pondere & gravitate id nata sunt efficere, sed vt Galen. aduertit, quia non-

Li. 9. sim-
pli. c. de
squāmis.

nonnihil obtinent caliditatis, & plurimum absterfionis, & vt lib. de foeminarum morbis diximus, ob vim etiam purgatiuam ex parte sulphurea, qua abundant: quo fit, vt calore sibi viam aperiat, & humores etiam attenuet, pondere quidem celeriter quosuis meatus permeet, absterfione verò humores abradat. Nec ob id credendum est, crassum partium chalybem plus prodesse, quam dum subtiliter limatur: quippe tunc potius perforat humores suo pondere, quam vi propria abstergat: quo fit, vt foemine sic curata citius reincident in maiores obstructions: quod profecto his quæ subtilius limatum chalybem acceperunt, non accidit. Exempli tamen gratia modum præparationis vnum aut alterum proponam: longius enim de hac re egimus lib. de foemin. morb. & lib. method. & de recto præ. vsu. Quod magis proficuum fidesimo experimento cognoui, est chalybem subtilissimè limare & sæpius aqua rosacea vel quantis alia abluere, & admiscere prædictis medicamentis hac forma. Excipe syrupi de quinque radicibus (in foeminis sine aceto, & in viris cū eo) syrupi cichorii & adianti ana. ℞. iij. pulueris rubiæ, & rumicis ana. 3. j. f. pulueris diamargaritonis fri. 3. j. chalybis subtiliter limati & loti. 3. vij. misce & fiat ad modū opiata. Robustioribus verò addere poteris mellis ℞. ij. chalybis vsque ad. ℞. j. f. diatrageacanthi. 3. j. diacurcumæ & dialaccæ ana. 3. ij. Cuiusque harū compositionum sumat laborans manè cocleare vnum, & mox per locum accliuem & decliuem vnius horæ spatio se exerceat. Verum in his qui aut vomunt aut aluum habent adstrictam, ex vsu est modicum aquæ calidæ antea sumere: in alijs modicum vini, & si quod accidēs succreuerit,

Institutionum Chirurgicalium

Iuxta eius naturam subuenire oportet, vt locis citatis abunde dictum reperiet diligens lector.

DE TRAHENTIVM AVXILIORUM administratione

INSTITVTIO VIII.



IERI motum localem vno é duobus modis, vnamini constat Philosophorum, & Medicorum omniũ consensu: vno à principio quodam intrinseco (cuius hac in parte non meminero) alio quidẽ à principio extrinseco, in quo res mota renitentiam potius quàm actionem præstat. Quod sanè motus genus iterum diuiserunt Philosophi in quatuor species, quales sunt pulsio, tractio, vectio, & vertigo. Inter quas hæc est differentia, quòd pulsio sumit denominationem à termino à quo pellens incipit motum: tractio à termino ad quem: vectio ex vniuerso motus spatio: vertigo vero ex pulsu & tractu componitur. Pulsu vero utimur, cum aliquid quo non oportet vergit: sic medicamentorum repellentium adminiculo à parte trahimus quod præter naturam fuit: quòd si ea prodesse non comperiamus, tractu uti cogit rei necessitas: quippe trahentia auxilia, vel propria virtute, vel per contactum ad se alliciunt quæ aliunde verunt. Verum hæc trahentia auxilia, duobus modis considerata & accepta reperio: vno, cum à virtute

tūte quadam trahente sibi indita id munus exequitur: vt magnes & rhabarbarū: alio verò cōsideratur tractio, quæ solū est humorum transmutatio, absque peculiari trahendi virtute: qua significatione, licet genere motus trahentia auxilia eadē sint specie, longē tamen diuersa sunt, & diuersa constantia materia. Quæ sanē trahētia omnia quatuor generibus tantū continentur, in vacuo videlicet, in suctu, in dolore & in calore: quorum omnium meminisse decreui, vt cuique constet quando, quomodo & quousque hoc vel illo tractionis modo vti teneatur. Nam licet soli cuti hæc adhiberi possint, consequutione tamen quadam viscera & internum corpus exonerant, foras trāsflata materia tabidas & veluti fideratas partes restituunt: venenum in cutim euocant, vitiosam sanie exhauriunt, criticos abscessus accelerant, deploratos pleuriticos & fortasse atonitos releuant, inguinum tumores amplificant, squamas ossium detrahunt, coxendice laborantes iuuant, hydropicos suctione minuunt, clauos, spinas, sagittas ē profundo reuocant, sic reuulsiones & alia pleraque eximia beneficia præstant.

Vacuum non vt vulgus arbitratur, simpliciter trahere est intelligendum, cū sua sponre nihil agere, vt quid priuatiuum possit: cum hoc tamen duobus modis vacuo trahere accidit. Primo, quia partes quæ circumstant, propter sui conseruationem, in vnione sitam, naturaliter coniūguntur: quo fit, vt grauias sæpe accendant maiori vi, quàm dum ad proprium locum conscendunt: quia ad proprium locum, vt melius se habeant, adeunt, sursum verò contra proprium motum, vt conseruetur vniuersum. Trahitur secundo alia ratione in vacuo, nepe
e quia

Institutionum Chirurgicarum

quia in corporis partibus vacuis & inanitis excitatur facultates ad validas & cōsuetas tractiones: qui modus frequentissimé vsui medico proficiuus est. Hac enim lege sūt reuulsiones, quæ cū euacuatione associantur: nā inanito distantiori à parte affecta mēbro, quod ibidē superest, faciliē ab incato trahitur: modò ipsa facultate trahente: modò successione ad id quod euacuatur, humore delapso. Quod sanè præsidium, dum vacuationi adiungitur, semper vires validas requirit; nā sanguinē mittere & eo vsq; corpus vacuū reddere, vr à distantissimis trahere cogatur, graue est, nisi vires cōstēt. Nō minores obinet trahēdi vires suctus, quinimo ē profundioribus & distantissimis partibus educere valet. Quem vsū præstant cucurbitæ, hirudines, folles, aut syringa vacua, quæ sugendo à partibus quibus adhærent, ad se faciliē alliciāt. Vtūtur tamen hoc præsidio, vbi vires periclitari veremur maioribus vacuationibus.

Dolorem de maximè trahentibus esse Gal. & ferè omnes Medici asseuerāt. Verū statuendū est, non vi & efficacia propria id posse efficere, cū qualitas solū sit intentionalis, sed potiùs arbitrandum est tractionē succedere, quia ad dolentē partem reliquæ transmittunt propter cōmunē sympathiam quam habēt: quo fit, vr omnes condolentiā persentiscant, & quod habent (siue abundet, siue secus) transmittant, facultate nimirum totius corporis transmittente ad partes affectas. Quippe Galen. ex professo docet, dolorem non trahere, sed transmissionē & fluxionem mouere. Quod duplici ratione posse fieri existimo: nimirum spūitu & calore per arterias transmissio ad partem dolentem: aut humore per venas ad eandem delapso: illud qui-

quidem necessario fit in omni dolore, eo quod facultas vitalis spiritum & calorem ad singulas partes pro ratione vias & indigentiae transmittit: & cum pars dolore affecta eo tempore ad causam molestantem propulsandam plus indigeat calore & spiritu, ob id natura ex propria lege id semper nititur: cum hoc tamen vera tractio dici non debet, quia non fit appetitu mouente facultatem ad expellendum nocuum, aut ad trahendum simile & necessarium, quorum neutrum in dolore reperitur. At in quibus aut sanguinis missione reuelli non datur, aut iam factum est, & non sufficit, praesentaneum remedium est longè à parte affecta dolorem vinculis, aut alio quouis modo excitare.

Potiori profectò ratione tractiones calore fieri omnibus est còperrù, non quòd calori insit trahendi potentia, quantũuis ab Hipp. dictũ sit, membrũ per caliditatẽ trahere ad seipsum à vicinis venis & carnibus piritam aut bilẽ. Nam si quis auctoris mentem satis callere studeat, reperiet partes potiùs medio calore trahere, quã quòd ipse per se trahat: dilatat enim partẽ calor, & fuis humoribus vicina rũ partiũ trahere dicitur. Quo fit, vt partes præter naturã calidã, prorsus humoribus repleantur: tũ quia dilatare faciliùs susceptar: tũ vero quia humores propius ad eas liquari cõsueant. Qua quidẽ ratione Gal. trahentia medicamenta, calida esse & tenuiũ partiũ assueuerat. Caloris enim est partes dilatare, & humores fundere: & tenuium partiũ est in altas permeare partes, quo facilius sunt in partibus magnæ attractiones. In qua re statuerendum est, trahentia auxilia aliquando quòd attractum est à corpore, sensibilibiter excludere, cum attractio cum euacuatione sit, vt in reumlorijs

Lib. I. de morbo.

Li. 5. sim-
p. c. 16.

Institutionum Chirurgicalium

sanguinis detractionibus: aliquando verò insensibiliter, vt digerentia efficiunt medicamenta: nonnunquam solùm attrahunt: citra discursionem, vt cùm in partem emortuam calorem & spiritum reuocant. Quod etiam probauerat Galen. dicens: Vicinæ sibi virtutes sunt eorum quæ in alto latent, attractrix & attractorum digestrix: nam quæ trahunt, etiam nonnihil discutiunt, & quæ discutiunt, pariter trahunt: differunt tamen quia in digerentibus discussoria vis est, in attrahentibus attractrix præpollet. Quæ ratione Galen. loco citato, valenter trahentibus adstringentia admiscet, ac nonnunquam emplastrica, vt vno tantùm medicamento, aut solùm quod opus est, trahatur, aut minus, vt discussioni detur locus, vt necessitas postulauerit.

Medicamenta verò trahentia, duorum sunt generum: nam quædam sua sponte nata sunt trahere, vt tapfia, sagapenum, propolis, succus cirenaicus, euphorbium, opopanax & alia huius naturæ: quædam etiam aduentitio calore trahunt, vt fermentum & stercora putrefacta: inter quæ non parua inest trahendi diuersitas, vt Galen. aduertit, quæ medicamenta à secundo ad tertium ordinem calfacientium vagantur. Sunt præter dicta, alia quæ proprietate quadam magis quàm aliter id agere videntur, vt radix arundinis cum melle, radix oxiacanthæ, coagulum, oleum etiam scorpionum, & theriaca. In quorum administratio-
ne Gal. sic scripsit. Quòd si summæ quidem partes omni noxa caruerint, id verò quod euacuari oporteat in penitioribus partibus fuerit, intendendus atque augendus est dispergentis medicamenti calor, cùm dubitatum sit, ne prius quàm profundas attigerit

gerit partes, interim vires amittat: neque tamen ex eo superiores partes aliquem dolorē sentient, cum omni vacent affectu. Quare nunc hæc duo simul inuicem ad calidorum partem atque acrium medicamentorū vsum, & summæ partes, quæ tolerant, & profundæ quæ egent. Quibus constat præcalidis esse vtendum in profundioribus malis, ita vt iam acria sint, quæ Græci methasincritica vocant, idest, transponentia, traducentiaque ab internis ad extimas sedes, quæ etiam vocant rubificantia. Quorum etiam vsum docuit Galen. his verbis. Si quidem vbi tantum corpus celeriter calfacere con-
 filium est, ea tunc exhibenda sunt, quæ & celerissime à caloris nostri contactu incalescant, & promptissime vnde quaque ferantur: verum vbi partem quampiam refrigeratam calfacere intendimus, contra agendum est, nimirum quæ tardè caleſcētia plurimo tempore perdurent. Itaque cum in calorificis mens est, vt per moram igneæ partes in profundas sedes meant, non in solas eas quibus admouentur, eligenda sunt calida, multam habentia lentamque humiditatem, quæ festinam calidi euolutionem adhibeant & remorentur, cuius generis sunt tapſura, nasturtium, sinapis, & id genus: quorum calor diutius duret & tardè succendatur, vt quæ ex profundo sunt euocatura humores. Cæterum cum mens est, partem quam primum contingunt, citra aliquam attractionem excalfacere, eligenda sunt, quæ citra incoctam humiditatem promptè incalescunt, qualem substantiam Galen. in pipere coniecit: nam ob eam tenuitatem humiditatis expertem, citissime exurit & permeat: quod etiam alibi expressius docuerat. Ex quibus omnibus aperte constat, trahentia omnia, aut sicca & tenuum
 63 partium

Li. 6. sim-
 pi. cap de
 zingibe-
 re.

Lib. 4. de
 sanit. tu.
 cap. 11.
 Li. 6. sim-
 pl. c. de cin-
 gibere,

Institutionum Chirurgicarum

partium esse, aut humida illaborata humiditate. Siccis, ut docet in extremis partibus, reliquis ubi ex profundis locis aliquid educere conamur. Præterea sensim aut confertim, leuiores aut maiora, continuò aut interpolatè huiusmodi præsidia adhibenda sunt, prout affectus diuturnus, grauis aut acutus fuerit. Nam grauib; & periculosis maiora à principio sunt adhibenda: diuturnis verò, sensim & paulatim vires eorum sunt augendæ, inspecta parte cui adhibentur, ne ultra modum operentur: parq; ut facilius vim medicamenti susceper, vino aut aqua tepida fouenda est. Lex autem & ratio vtendi, neque vna in omnibus in quibus conueniunt, neque quibusuis omnia sunt adhibenda. Nam criticis tumoribus, venenatorum moribus, & pestiferis bubonibus, non sunt adhibenda quæ vehementer trahant, sed quæ leuiter: nam præter id quòd plurimū calorem concitant, minori transpiratione grauius periculum accerfunt. Vltimò tamen ut Galeni consilio expedit, qui partem cui adhibentur medicamenta hæc, circumlinire medicamento aliquo inflammationem arcere docet: in alijs verò, in quibus ex profundo allicere conamur, his opus non habemus: præstat tamen in omnibus à leuioribus sui generis spiritum fumere.

Li. 5. phar
ma. loc.
cap. 10.

Sed de tractione expurgantis medicamenti non nihil docere institui, quantumuis sciam non magis posse meam sententiā pluribus placere, quàm reliquorum authorum. Conueniunt itaque ferè omnes Medici in hac re: nimirum medicamenta purgantia trahere peculiari quadam trahente virtute, calore quo abundant, plurimum ad id iuuan-

te. Alij tamen ex similitudine tractionem fieri contendunt: item alij qui ad veritatem proprius accedunt, tractionem in calorem, electionem vero in huius aut illius humoris similitudinem referunt: qualis autem sit hæc similitudinis ratio, non constat: nam varias proferunt de eare sententias. Nos autem per similitudinem, modum quandam mixtionis in medicamento & humore similem intelligimus: hoc est, quod æquis portionibus elementorum constet humor ac medicamentum trahens: nimirum, quod ad mixturem concurrat vnumquodque elementum æquali lance libratum, ac in medicamento, & sic de reliquis omnibus: hac lege, quod in medicamento sint vnius elementi partes duæ, alterius pars vna, reliqui rursus partes quatuor, & quarti partes tres: rursus in humore sibi familiari pars portio omnium & singulorum adseruanda erit. Quæ sympathia & similitudine coniectabile est vnum ab altero elici & trahi. Quo dogmate constat posse dilui multa argumenta difficultatem inferrentia: nimirum medicamentum trahere humores, & non è contra, ob præstantiorem medicamenti formam quàm biliosa, pituitosa, aut quæuis alia excrementa fortiantur. Secundo non inconuenit medicamentum esse calidum & humorem frigidum, quia ratio similitudinis non fiat in primis qualitatibus: nec inconuenit vnicuique medicamentum posse plures humores trahere, quia familiare trahit, reliquos natura irritata sua sponte expellit. Præterea tractio medicamenti nequit fieri nisi in paruissima distantia, & libero medio: at cum medicamentum in vetriculo residet humores habeat distantes & medijs plurimis præpeditos,

Institutionum Chirurgicarum

oportuit calorem præsto esse, qui vias aperiret, humores funderet, & iam attenuatos, per apertas vias & anfractus duceret: quo fit, vt calore hæc medicamenta ab alijs trahentibus dissideant: siquidem neque magnes nec electrum eo indigent ad tractionem.

DE REPELLENTIVM AVXILIORUM administratione

INSTITVTIO IX.



V M maiori ex parte mala quæ nostris corporibus succrescunt, ex fluxione dependant, ob id provida ars decrevit, varijs medijs & instrumentis à parte affecta aut afficienda fluxiones auertere: reuulsionibus nimirum, deriuatione, & vltimò repulsiu seu transmissione, non solum fluentis adhuc materiae, verum & fluxe iam atque in partibus recepte. Repellentia itaque auxilia, quæ mirâ hanc efficaciam sortiuntur, non eo repellunt quia virtute aliqua id efficiant, sed quemadmodum trahentia, solum partium dilatatione, & humorum fusione, ita & repellentia partium compressione, trudent humores in particulas contetos. Dimitto hac in parte deligationes & fascias quæ viarum coarctatione potius impediunt quàm repellant. Auxilia sanè repellentia, vt ex Galen. facile colligitur, naturæ esse frigida & adstringentis euidenter constat, licet

licet per se frigida citra adstrictionem, ad leuiter repellendum paucum humorem, superficiem corporis occupantem, constituta esse comperiamus, vt ex eodem Galen. his verbis constat. Genus igitur repellentium pharmacorum, in principio inflammationum in refrigerantium materia sitū est. Hæc enim medicamenta molli tantū aqueaq; materia præpollent, quæ densantia Medici vocant, velut est aqua frigida, semperuiuium, portulaca, tribulus, lenticula palustris, lactuca, inrybū, oleū rosaceum, violaceū, lac, & oxycratū, & id genus: alia insuper fortiora reperies in hoc genere, vt mandragoram, hyoscyamū & cicutā. At in grauioribus affectionibus, & quæ postulant reuulsiones maiores, neque illa, neque solūm adstringentia, sed quæ simul adstringant & refrigerent requiruntur: namque hæc sunt verè repellentia, vt expressit Galen. quia ad adstrictionem opus est crassa terrenaq; substantia. Quippe proprium adstringentium munus est, contrahere, constipare, & substantiam nostrā condensare. Huius autem naturæ duorum generum sunt medicamenta, frigidorum cum adstrictione vnū, vt arnoglossum, rubus, capreoli vitis, polygonum, myrtus, balauitium, omphantium, & sanguis draconis, oleum myrrinum & sumach. Calidiorum verò aliud, qualia sunt mastix, thus, absinthium, mentha, alumen, calcantum, casia, cinnamoinum, ciperus, spica, myrrha, polium & marrubium, ex quibus varias repellentium formas effinxerunt Medici. Nam defensiva appellata huius etiam naturæ sunt, quæ non supra partem, sed paulò distantiùs ab ea apponuntur, & strictioribus factis vijs & canalibus fluxionem ad partem inhibeant: repellentia verò supra partem appo-

Li. 6. phar
ma. loc.
cap. 1.

Li. 5. sim-
pli. c. 16.
Li. 6. sim-
pli. c. de
cætaurea.
Li. 9. sim-
pli. c. 1.
Li. 3. c. 17

Institutionum Chirurgicarum

nuntur, ut ab ea contentum & fluentem humorem pellant, ne delabi amplius in partem prohibeant.

Verum ante omnem considerationem, discat diligens lector naturam affectionum, locum & denique tempus in quo adhibenda sunt. Affectio-
nis naturam Galen. eleganter depingit dicens:
Li. ar. mc. 85. Cum vasa maiora & minima, affluenti vel sanguine, vel quouis alio humore repleantur, ita ut periculum sit ne ex vasis exfudet ad spatia vacua; tum quidem vacuatione indiget particula, ut poro plena. At vacuatio (ut alibi refert) hoc genus affectionum excogitata est duplex: aut translatio ad alias partes qui in ægra continebatur sanguine, aut foris à corpore expulso: satius profectò est (inquit) utraque vti, obseruantibus diligenter, ne quæ læsio ex accidenti sequatur. Ergo cum gemina sit dictarum vacuationum utraque, quadruplex in vniversum nascitur vacuantium genus. Quorum omnium præcipuum primumque est, translatio humoris ad alias partes: quam profectò his auxilijs repellentibus molimur, quo iterum resumit possit qui delabitur humor. Itaque si vacuatione non prohibeatur ad particulam fluxio, aut non sat fuerit, reuulsionibus ipsum retrahere oportet, & mox à parte repellentium adminiculo abigendus est humor, perstandumque, donec delapsa materia in Venas, à quibus emanauit, iterum recipiatur. Quo auxiliij genere declinamus phlegmonarum ortus atque incrementa, quia mirum in modum à parte quod deflaxerat pellunt. Retrocedit autem, inquit Galen. vel impulsæ, vel attractæ, vel transmissæ, vel horum vno aliquo modorum, vel omnibus. Quos etiam extractionis modos alibi clari-

rius

rius exprimit, intelligens per repulsionem actum facultatis expultricis: verum cum id parte existente ægra nequeat commodè fieri citra alicuius medicamenti adminiculum, ob id summopere sunt huic vsui proficua. Verum transmissio solùm intelligenda venit, prout refertur ad frigida & adstringentia medicamenta, quorum munus est constringendo expellere humorem ad vicinas partes. De quo auxilio hæc refert verba Galen.

Quanto enim per maiora vasorum conceptacula fiat euacuatio, eo promptiorem esse est arbitrandum: nam per ea expellitur à laborante loco materia ad maiores membrorum meatus: qua enim ratione delabitur materia à maioribus ad minores: eadem iterum remeat à minoribus ad maiores, compressis minoribus vi medicamentorum adstringentium: quo solo auxilio faciliter inflammationes non pauca curari assolent, ut idem author optimè alibi docuerat. Verum quod in hac re maiorem ingerit dubitationem, est an tanta sit vis & efficacia repellentium, ut quod in spacia non naturalia excisum est à venis, in easdem iterum resumere efficiant. Quod profectò euentu quotidiano probant multa: nam puerorum excrementa, morbili & variolæ crebro re-

Li. ar. me.
85.

percussa frigidi aëris repente occultantur: item inanita loca, inquit Gal. trahunt ad se ipsa, ergo humore contentum in tumore ad vasorum inanitatē remeare, & secta vena purgari manifestum est. Præterea ex pleuritide fieri comearum in phrenitide & pulmonia docet euentus (quâquâ hoc alia ratione & modo fieri possit) sic Hipp. Quibus inter vetriculum & septum pignita reposita est, & dolore affertur non habens exitum, neque ad alterum ventrem, his per

Li. de opti. sec. ad Tra.

Li. ar. me.
c. 85.

Libr. 7.
apho. 54.

Institutionum Chirurgicarum

Li. 13. me
thod. c. 9
Li. 1. phar
ma. gen.
c. 6.
Li. ar. me.

Libr. 2.
ad Glau.
& 1. me
tho.

per venas ad vesicam pituita versa soluitur. Rursus in his qui ex morbo Gallico hydrargiro inunguntur, mirabile dictu quam celeri motu ab externis ad intima fiat humorum confluxus & cōmeatus. Confirmat insuper echymosis curatio per repellentia, facta retrocessione ab spatijs illis ad vasa. Quam etiam Galen. doctrinam docuit loquens de emplastro, quod ex argenti spuma & hydrargiro conficitur dicens: Cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat impedit, & iam fluxum denuo ad partes circumstantes trudit: idem scripsit idem author dicens: A patiente verò loco adstringendo ac refrigerando repellemus, sed & loca exanania, attrahunt ad se ipsa quæcunque repercutiuntur. Quibus profectò constat, commearus humorum possibiles esse, quantumvis aliquid post repellentia remaneat in parte, discussoria auxilia desiderans. Quo fit, ut nō sit repulsorijs plurimū innitendum, sed antequam postremū fiat, cessandum, ne aut in alium muretur affectum, vel in duritiem immedicabilem, ac etiam ut detur discussioni locus. Cum hoc tamen se se extendit huius præsidij vis & efficacia ad frigidos succos repellendos, ut ex Galen. euidenter constat: nam edemata ea legere iubet per repellentia ex spongia aqua & aceto imbuta, addito in incremento modico aluminis. Prætereà iubet à capite repellendum esse humore, quisquis is sit. Verum id non debet intelligi de affectionibus quæ fiunt per paulatimam congestionem.

His suppositis, arbitrandum est, non fuisse dictum temere & inconsultò, repellentia duorū esse generum: nam frigidorū munus solum est incrasfare humores ac partes densare, ne facile pateant: fri-

frigida verò & adstringentia id quoque efficiunt, et si quid in parte receptum est pellunt. Sic partes, quæ præ nimio calore fluxione tentantur, sibi iure expostulant auxilia, quæ refrigerando repellunt, quibus & principium fluxionis auferatur, & pars compressione firmetur, maximè si fluxio ex humoribus sit tenuibus, biliosis & calidis: adstringentia verò his partibus sunt proficua, quæ ob importentiam fluxionem susceperant, maximè si dolore afficiantur simul.

Superest adhuc his exactè cognitis, quando & quousque sit his repellentibus utendum: quod docuerat Gal. statuens id fieri tutius cū corpus vacuum fuerit & reuulsionibus usus fueris: quia tunc humoribus impulsis subest via & locus liber. Quousque verò sit agendum idè author scripsit, docēs quod in parte continetur, repulso & discussione abigendum esse ab ea, & ob id transacto principio utrisque simul iunctis utimur, præterquā quòd alterum alterius ministerium præstat, resoluens penetrationē adstringentis, & adstringētia propulsione calidi ad interiora, quo adinuicem iuuantur, ut docuerat idem Galen. per hæc verba. Vna vero alia

Li. de opti. sec. ad Tra
Li. 3. Mehod.
& Li. ar. med.

Li. 6. phar. ma. lo. c. 3

mistura ex diuersi generis pharmacis, ex huiusmodi ratiocinatione cœpit: rarò quidē inuenerit quis affectionem, aut discussorijs tantū, aut repulso-rijs indigentem: paræ etenim & affectionis nominæ à Medicis dignatæ confestim sedantur: vbi verò generatus affectus maiorem habuerit causam, impossibile est ipsum per repulso-ria perfectè sanare, & maximè vbi ægri corpus humoribus multis repletum fuerit, aut particula affecta natura debilis: ob id igitur cogimur sæpe quidem in principio, sæpissimè verò paulò post admiscere quidpià

ex

Institutionum Chirurgicarum

ex diffusorijs. Quapropter non tēpus morbi, sed cōditio præsens affectus ad curationē tā operē cōmēdārūt auctores: sed maximē Gal. nā licet tēpora ad alios vsus cōsiderare oporteat, ad curationē præsens causa & præsens dispositio affectus necessarię sunt: quare nō semp expectare oportet augmenti principiū ad mixtionē resoluētiū, vt multi cōsultū: sed cōsiderare oportet, nū antea expostuler af fectus cōditio. Et ob id sola aut parū mista in prin cipijs inflammationū repellētia sunt adhibēda, quia plurimū fluit, fluxit tamē quā paucissimū, vt Gal. asseuerat, & quo magis morbus augetur, minor est fluxio, aut saltē equalis, magis ve: o quod fluxū est: qua ratione vberius oportet admiscere, vt optimē aduertit his verbis idē author. Quēadmodū enim in principio cōmoda sunt pharma, id qđ influit repellētia, sic post principiū vsq; ad finē, pharmaco opus est ex vtriusq; misto, repellēte videlicet, & dis cutiēte facultate prædito: ac primo quidē tēpore adstringēs præcellere oportet, ad finē verò discutiēs: interposito autē tēpore, æquales vtrobiq; partes esse cōuenit. Quādo verò velut induratum quiddā de inflammatione reliquitur, penitus nō cōue nit adstringēs ad diffusoriū admiscere, nisi prius totū corpus sit euacuatū: atq; neq; in principio bonum est diffusoriū adstringēti admiscere. Itaq; vt quis exactē teneat quousq; sit repellendū, fluxio nis durationē attento animo exquirat: nā hæc est quę meretur repellentiū adhibitionē & durationē. Præterea sciendū est, nō solum consuluissē Gal. re pellentibus admiscenda esse resoluentia fluxionis aut fluxuri humoris gratia, sed & penetrationis vt dictū est, & roboris cōciliandi causa: quod elegāt oratione docuerat Gal. dicēs: Cæterū adstringēdo

Li. 14. me
thod. c. 1

Li. 13. Me
hod. c. 5.
Li. 6. poar
ma. loc.
c. 3.
Li. 6. phar
ma. c. 6.

Lib. 3. me
thod. c. 15

ac defando summa corporis quod adstringitur vit
tus illorū excluditur, & in aliu ire prohibetur. Ob
quā rationē nōnulli Medicorū huiusmodi pharma
cis alia subtiliū parium & acri potestate prædita
indere consueuerūt, à quibus velati ductæ adstrin
gentiū vires in profundū corpus perueniant. Quas
vires cum in cupresso adinuenisset Gal. plurimum
laudat. Rursus admiscuntur adstringentia his quæ
maligna & incurabilia vlcera curant, vt nihil in
fluat quod sanationē impediāt, vt varijs in locis do
cuerat Gal.

Li. 1. phar
malo. c. 5

Li. 7. sim
pli.

Li. 13. me
tho. c. 18

Li. 1. phar
ma. gen.

cap. 2

Li. 1. phar
ma. gen.

cap. 12

Sunt præterea quædam affectiones, & quædam
partes, quæ prorsus huius auxilij vim & efficaciam
sustinere nequeunt: alia rursus quæ certo quodam
modo. Affectiones quæ id auxiliū renant, sunt in qui
bus materia est crassa, & repulsioni inobediens, qua
propter in statu raro eis vii licet: nam postquam
Galen. dixerat, in statu humorem esse crassiores,
& vehementer impactum, inquit. Time igitur, quæ
à phlegmone sumatur vna dumtaxat est indica
tio agendorum: hanc Græci diaphoresim vocant,
Latini digestionem: secundo nec minus admittit
locus affectus incapax fluxionis magnæ, vt pollex
& talus: fit sæpe talibus reuellis materiæ reddi
tus ad viscera: id etiam formidandum est, si ad
vile membrum fluxio decumbat, vt ad cutem &
adenes, è quibus sæpe suspecta est remigra: ad
interiora & nobiliora: item si fluxio critica sit.
Insuper quando locus affectus expurgatorium
est membri principis, aut principi vicinus. Cum
hoc tamē Gal. in emūctorijs & parotidibus, repel
lentibus viitur, nō tamē in omnibus: inquit enim:
Qui à sola destillatione seu defluxu materiæ pro
ueniunt, neque multa existente quæ sunt materia,

Li. 13. me
tho. c. 6

& 5.

Li. de pa
ra. faci.

cap. 23.

neque

Institutionum Chirurgicarum

Libr. 10.
phar. 10.
c. de ischia
dc.
Li. 3. me-
tho.

Li. 13. me-
tho.
Li. de cō-
stit. . art.
medic.

neque venenosa, neque toto denique corpore ple-
torico, sola spongia ex posca imposita sistuntur:
quibus constat, quando in his vtendum sit repel-
lentibus, quando secus. Nam dum corpus plenum
est, frustra tentatur repulsio, quoniam nil amplius
susceperit. Profundus præterea locus repellentia
quoque renuit, vt ex Galen. aperte videtur cō-
stare: qua enim de causa extrema pars inflammata,
repellentis beneficio inanitur, eadem si penitior
sit, impletur: cum hoc tamen ex commoditate par-
tis id commodè efficitur: neque inflammato cere-
bro cum vtilitate imponuntur sine ipsis cum modi-
co aceto, quoniam locus non valde secedit ab im-
posito remedio. At si spiritalis venter afficiatur,
Galen. nonnunquam dissuadet, quandoque timi-
dè concedit, inquit enim: Ita verò sic vbi adstrin-
gente opus fuerit medicamine, situs egentis loci
spectandus est: nam si quod adstringit peringere
ad ipsum sufficiat, nihil prohibet quo minus eo
vraris, si idoneum non sit, considerandum, num
humiditatem simus ex antepositis partibus acturi
in affectam, quam obrem aut adstringente medica-
mento admiscenda vis est, quæ dux veluti viæ sit,
aut eo non vtendum. Videtur quæ eo moderamine
procedendum in pulmone affecto, siue pulmonia,
siue emproisi, sæpe egregiè leserunt externa re-
pellentia, quoniam ob interualli magnitudinem,
pressus à thorace sanguis pulmonis plenitudinem
adaugere: si thorax ipse, pleura, musculive, parcius
vtendum esse ait. Cum hoc tamen satius est absti-
nere, quantumuis Mesues contrarium videatur cō-
sulere: nam in pleuritide nemo est qui non verear-
tur ob retrocessum & incrudationem materiæ atque
crassitudinem quam præstat: ita neque in ventre
sunt

sunt admodum tura. Verum in his & in spiritalibus membris aceti modus tanto magis moderandus est, quanto cedit thorax ex dimidio osseus, & venter ex toto carneus tori ossee calvariae, ita ut illic subquadruplum, hic suboctuplum admoueat. Superfunt adhuc artuum iuncturae, in quibus hoc modo repellendum esse docet Galen. Quippe inquit: Nam in particulis quae circa artus sunt, sat fuerit etiam spongiam vel ex frigida aqua cui paululum aceti sit commistum, vel aqua sola madentem imponere, sicut etiam ex vino aliquo austero. His etiam Rasijs considerans loci angustiam, concedit nonnunquam repellentia: reliqui post vacuum corpus admittunt: Auicenna non multo aliter, sed debilia concedit. Itaque aut non adstringendum, aut leuiter, in materiae copia, crassitie, vitio molli, & vegeto sensu praedito corpore, aut dolore & calore graui oppresso, vel crismi efficiente.

Libr. 13.
meth. c. 11

Taxat Galen. eos, qui si adstringere renentur, quae valide adstringant, proficua fore arbitratur: nam indistincte adstringere & quouis medicamento, periculo non vacat, sed inspecta prius natura & dignitate particularum, cuique materiam aptam adhibere oportet. Ab auribus quidem repellit Galen. his quae modice adstringunt & refrigerant, (si ceteri alterius generis medicamenta validiora sustineant) ut rosaceo cum aceto, lacte muliebri calido, candido oui, item rosaceo cum auricula muris aut polygoni vel portulacae & cucurbitae succo. Oculi vero dum fluxione tenentur, desiderant quae Galen. commendat dicens: Est aliud genus pharmacorum, quod in oculares compositiones iniicitur, eorum videlicet quae natura adstringunt: quae igitur mediocriter hanc vim habent, mediocriter repellunt

Li. 13. mg
thp. c. 11

Li. 3. phar
ma. lo.

Li. 4. phar
ma. lo. c. 1

Institutionum Chirurgicarum

pellunt influxiones, quæ verò valenter ampliorē
dolorem infligunt, potius eas exasperando, quàm
iuuent fluxionis imperiū repellendo, asperitas longè
à natura oculorum distat. Præterea idē auctor præ
cipit ea debere esse mordacitatis expertia, qualia
ex metallicis lotis aut aliter præparatis componi
refert. Consultit etiā Hipp. mediocriter adstringen
tia commoda oculis existere, inquit enim. Vbi mo
dica potabili in spongia vtaris, optimū oculis est.
Explicat etiam Gal. qualia debeāt esse his verbis.
Sunt verò huiusmodi, folia rosarū & flores & suc
cus oricæ quæ fructus & nardi spica, amplius quæ & suc
cus malabrati folium, & crocus & lilium, & quæ hypo
cistis appellatur, atque vt exēplum hæc sufficiant.
Gingibæ etiā & dentes dū dolore inflāmantur, re
pellentia sustinent vehementia, vt Galen. hac ora
tione docet. Vehementissimis igitur opus est me
dicamentis, siue quis repellere, siue discutere velit
doloris causam, siue humor sit, siue flatus vento
sus, & propterea pleraque ipsorum ex aceto acerr
mo præparantur: sic galla pinguis, teda, myrtus &
eius naturæ alia aceto feruefacta plurimū profunt.
Cæterum gingibæ mitioribus admisceri desiderāt,
vt reliquæ oris partes, vt Gale. aduertit ob tunicæ
oris tenuitatem. In his verò medicamentis, quæ in
tus ad repellendum sumuntur, suam etiam eligēdi
rationem Gal. præbet, sic scribens. Neque enim ab
solurè, si adstringere incipientem phlegmonē est
opus, quodlibet adstringens in his quæ deuoran
da sunt adhibebimus, sed ea quibus nulla corrup
trix admista vis est. Denique omnis mordacitatis
expertia oportet esse talia medicamenta, vt
loco citato longissima oratione
ostendit.

DE AVXILIORVM RESOL-
uentium administratione
INSTITVTIO X.



NECESSARIUM opus resoluendi post
repulsionem docet his ver-
bis Galen. Necesse igitur
est, vt aut superfluitas retro
cedens euacuetur, aut per
ipsam patientem particulā:
retrocedet autem, vel impul-
sa, vel attracta, vel transmissa,

liar. me.
c. 83.

vel horū vno aliquo modorū, vel omnibus. Per
locū verō patiētē euacuabimur, partim quidē mani-
festē & sensibilibiter, partim verō in vaporē soluta.
Quod sanē resolutionis ministeriū, per huius effi-
cacię medicamēta, resoluētia nimirū perficitur. Ve-
rū vt vis, natura & efficacia horū medicamentorū
eluceat magis, statuēdū est, omnē suā grāiā nobis
impertiri mediāte calore: quāobré necessū erit, qui-
bus modis ea opera calor possit efficere, ante om-
nia docere, vt cōstet, quę sint quę verē resoluētia
haberi debeāt, & quōmodo à calorificis dissideāt.

Calor igitur peculiari sui ratione, quę crassa sūt
tenuat, ac si liquida fuerint in vaporē versa, exha-
lāt: interdū intra corpus, & fiūt ē pituita aquosa fla-
tus, inflationes, & palpitationes: interdū verō fo-
ras, euacuanturq; halitu, vel insensibili vel sensibili cū
sudore: si verō sicca fuerint crassa illa quę tennā-
tur, aut etiā humida, sed minus exhalantia, re-
tioris substantiæ euadunt omnia, vt Galen. sta-
tuit, ex austeris nimirum acida, ex acidis dulcia
tenuia, ex dulcibus salsa tenuiora, & ex salsis

li. 7. fine
pii. c. 194

Institutionum Chirurgicarum

Amara adhuc tenuiora euadunt. Calidum itē fundit & liquat à frigido concreta: rursus eadem fundendo molliat: sic etiam fundendo & liquidiora ad motumque promptiora reddendo excrementa, obstructa liberat, fluxiones etiam aut excitat aut geminat: idem calidū fusa tenuataque, si diutius exerceat digerendo, aut aliter vacuando, tandem ficit. Rarefacit eādē ratione poros ac meatus omnes, & ora ipsa tam vasorum quàm aliarum cauitatum aperit: item trahit adhuc foras, si ad motum est, intro si sumptum sit: euocat materiam à se tenuatam per meatus etiam à se apertos, quapropter vehementer resoluit & digerit. Quo fit, vt etiam dolores sedet, & cum hoc materiam vbi adest euocat. Verū vt ex Galen. constat, calida sumpta nō tantum trahunt, sed etiam prorsus propellunt, licet ex accidenti, vt quæ status dissipat per rictus & crepitus: quæ etiam sudores, vrinas, menses & hæmorrhoides mouent, secundas & foetum mortuum propellunt. Calor item ex accidenti refrigerat, vel euacuat ex corpore materia calida, vt Venus & medicamentum purgans, & dura frictio. Item per accidens humectat, fusis qui à frigido concreuerunt succis: & vltimò calor, tam internus, quàm externus, dum vehementior est, mordet, rodit, rubificat, carnem dedit, vrit & scaram inducit: quæ sanè sunt opera caloris. Quibus constat, quanti momenti sit distinguere, quale sit opus resolutionis inter omnia hæc opera, vt eligere possis, quando hoc, quando illud, caloris beneficio velis efficere.

Libr. 6.

apho. 31.

Li. 11. me-

thod. 3

Li. 9. sim-

pt. e. de pa-

tonichio.

Resoluentia pharmaca, quæ omnibus affectibus proficua sunt futura, tertio ordine calida & sicca esse aperte monstrat Galen. nam inquit: Vis eius est

est tenuium partium, & exsiccatoria morſu vacatē
nam talia ſint oportet quæ paronychia ſanant, ta-
lia enim ſunt, quæ cū ex tertio ſint ordine calfa-
cientium & exſiccantium, præter hoc inſuper eſſen-
tiæ ſubtilis ſunt. Item idem author loquens de di-
gerentibus, ad differentiam coquentium inquit. Li. 5. ſim.
Qui multo etiam magis ab his quæ diximus, & ex pli. c. 9.
caſſacere & exſiccare poſſunt. Præterea alibi ſic
ſcribit. Quæ autem penitus tenuia calidaq; ſunt, ma Li. 3. ſim.
gis digerunt diſcutiuntq; humores ex corpori. pli. c. 17.
bus quibus admoventur: & clariùs adhuc alibi di- Libr. 3.
cens: Diſcutiunt autē calida & ſicca facultate præ- phar. loc.
dita: cum hoc tamen valde diſſidēt diſcuſſoria, ab cap. 3.
his quæ trahendi vires obtinent, etiam ſi vtraque
calida ſint: nam trahentia ex profundo ad cutem
externam poſſunt trahere: diſcuſſoria verò, attra-
ctum poſſunt ſua ſponte in halitum conuertere, li-
cēt nonnihil attrahere poſſint: itaque vt in vno-
quoque viſ altera ſuperat, ita genere diſtincta
ſunt.

In qua re ſtatuendum eſt, quòd licēt dictum ſit,
tertio ordine eſſe calida & ſicca diſcuſſoria phar-
maca, cum hoc tamen id ſubintelligere oportet
de his, quæ omnes tumores & humores in genere
diſcutere poſſunt. Verū quia non omnes, neque
omnia corpora aut corporum partes, eiufdem ſunt
naturæ & conditionis, ob id varia oportet eſſe diſ-
cutientium opera. Quod Galen. animaduertens Li. 5. ſim.
ſuam ſententiam moderatur, & de ſcirrhofis pli. c. 3.
tumoribus verba faciens, inquit: Quæ verò à leni-
to craſſoq; humore cōgelata ſunt, calida poſcūt
ſiccaq; medicamenta, ſed non tamen quæ valida
ſint ac violenta, ſed ſufficit interim vt ſecundi aut
tertij ordinis ſint. caſſacientium, primi exſiccantiū.

Institutionum Chirurgicarum

li. c. fm.
li. c. 4.

Porro cū non exigua sit in corporibus sic induratis maioris minorisq̃ue latitudo, necesse utique est medicamentorum illis medentium non paruan esse latitudinem: & ob id idem Galen. in duo capita dissecuit: primum namque cōinet in hoc genere leuiora omnia, quæ sarcotica nuncupantur: aliud verò fortiora, quæ Medici appellant diaphoretica: inquit enim. Quæ verò excalfaciunt, dum contentum in calescentibus humorē in vapores dissoluerit: quæ autem desiccāt, velut quæ vocātur diaphoretica, hoc est, per halitum digerentia, & ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia, cum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem. Sunt autem leuiter digerentia, vt camemalum, melilotū, fœnugræcum, semen lini, adiantū & althæa. Paulō verò valenter discutiunt, abrotonum, brastica, daucus, veteres medullæ & oleum vetus: adhuc valenti us ruſa, iris, asphodeli radix, galbanū, bdeliū, nitrum, piper & id genus. Ex quibus non pro libito quis vri poterit, sed pro indigētiæ ratione, ea eligens quæ affectus aut locus exposulauerint.

Quæ verò leuia sunt desiderat tumor in corporis superficie expositus, materia calida, humida, & locus affectus natura mollis & contextura rarus: nā talia maiori ex parte calori nostro simillima sunt, aut parum intensa, & humido tepori commista. Quo fit, vt minimē siccent, dolorem leniant, cutē laxent, spiramenta corporis rarefaciant penetrent quæ & humorem liquefaciāt. Quæ verò acrius resoluit, vt tertio ordine calida, sicut longē nostrū calorem superant, ita affectus persanant in alto corporis sitos, & ex frigido crassoque & glutinoso humore ortos: quia dum ad eam partē deuenit, quale est necessarium redditur.

In

In quo verò, quārū, & quousq; vtendū sit his præfidijs, ediscere conuenit: nā reliquias cuiusuis affectus cōterunt: sed hos diuides in affectus vniuersales, & in particulares internos aut externos. Et licet in omnibus profint in cōterēdis reliquijs post vniuersales euacuationes, cum hoc tamē in causis & affectibus calidis res tantū agenda est ijs, quæ aut nostro calori sint simillima, aut his quæ relictā distemperiem compescendo, nostrum calorem iuant, qui postea sua sponte reliquias conterit: quo fit, vt quæ intentum calorem attemperant, resoluant etiam. Cum hoc tamen in morbis calidis & acutis certius & securius reliquias conterūt, quæ per aluū & vrinam sensim & paulatim educunt, vt latius dictum est proprijs Institutionibus. In alijs verò affectionibus, quæ aut diuturniores sunt, aut ex frigidis & crassis concitātur humoribus, longē aliter fieri debet: nam præmissis plenioribus euacuationibus, intrepidē quæ sensibilibiter discutunt, adhibenda sunt, veluti in hydrope, paralyfi & epilepsia ac reliquis eius conditionis. At quia huiusmodi affectus plures expostulant euacuationes, ideò inter vnā & aliam ijs oportet vti, quæ & materiam attenuēt, & eandem discutiant, & quod reliquum fuerit ad coctionem simul præparent. Quo fit, vt simul cum diffusorijs inscindentia & attenuantia admiscere oporteat. Sic ad internarum materiarum discussionem præstant radices gentianæ, peoniæ, iridis, pimpinellæ, galangæ, & aliarum huius naturæ; quibus admisto medicamento pro humoris natura, facile erit reliquias quasuis cōterere, si vim purgantium subterfugerunt.

Sed in externorū affectuū resolutione, nosse primò oportet tempus seu occasionem resoluendū:

Institutionum Chirurgicarum

Li. 1. m. c.
cap. 85

Secundo differentiam discutientium, quam præferat humoris aut affectus differentia: tercio verò, quid loci conditio exposulet. Circa primum Galen. euidenti oratione docet resoluendi occasione, dicens: Si igitur hac via (loquebatur de repulsione) superfluum omne retrocesserit, benè se res habet, ut si aliquid fuerit in parte retenti, coniectandum erit id lentum & crassum existere, atque ea ratione coactum atque adstrictum, ut cum difficultate solui possit: in quo casu tempus suadet ad id veniendum esse, ut hoc ipsum quod reliquum est, per patientem locum euacuemus, imponendo supra iacentibus partibus ea, quæ influentem humorem vim habeant reprimendi. Maximè verò euacuabimur si in spatijs intermedijs coniectura assequaris, & scarificationum auxilio, & medicaminum quæ vim habeant digerendi. Ex qua sententia euidentes colligitur, eos affectus exposcere discutientia auxilia, quibus vniuersales vacuationes non profuerunt.

Li. 7. m. c.
p. 6. 6

Li. 3. sim.
p. 6. 17

Quo autem tempore utrum sit repellentibus, Galen. docuerat dicens: Digerendi certè tempus, adeò late patet, ut etiam si velis, in eo non aberres: & paulò inferius. Semper tamen (inquit) vtraque misceatur, & repellendi & discutiendi facultas, nisi quando fluxio prorsus constiterit, & corpus vacuum fuerit, tunc ad digerentè, sicut in primis incurribus ad repulsoriam virtutem ruta est accessio, Sed clariùs adhuc alibi sic refert. Nam per initia repellere comprimereq; influxus oportet: in vigore autem ita per halitum digerere, ut morbus absit. Etenim indicationes in inflammationum incrementis contrarias esse necesse est: nam simul vnoque impetu, ab adstringentibus contrahentibusque

sub 3

Substantiam, ad laxantia, fundentiaque transire,
planè absurdum est: sicut sanè æquum est in inter
medio principij statufque spatio, dum videlicet
morbi adhuc increfcunt, nec planè repellere, sicut
in principijs, nec itidem digerere, sicut in vigore,
sed perinde vt morbi conditio media est inter con
traria, ita medicinam quoque mediam esse oportet.
Prestat etiã maiorem huius rei notitiã, nosse
occasiones, quibus partes affectæ suscipere cœpe
runt, & naturam humorum, quos susceperant. Pri
mum egregiè aduertit Galen. dicens: Ad eundem
modum, si ex frigido dominante distemperies sit
oborta: nam nunc quoque calfaciendo, non solùm
intemperantiã, sed etiam phlegmoni vnã medebe
ris: itidem si calor vehementior intemperiem fa
cit, refrigerantibus præfidijs, siquidem intemperã
tia contraria semper requirit. Quibus verbis aper
tè monstrat adstringendi tempus eo debere esse
breuius, quo frigidior fuerit fluxionis causa, ac ex
consequenti eo magis moratur digerendi occa
sio, quo & particulę calor fuerit intensior. Secun
dum alibi his verbis explicat. Cùm enim phleg
mone duplici ratione à natura recessit, & quod
pars ipsa multo sanguine sit referta, & quod eadē
sit calidior, vtique vacuationis indicatio vincit,
cōtra scilicet, quàm in erysipelate: in illo namque
refrigerationis indicatio magis vrget, quàm va
cuationis, quãquã vtriusque affectus curandi com
mune caput est infestatis humoris euacuatio: ideo
que postquam refrigeratũ erysipelas est, ad ea que
digerunt medicamenta conuertimur. In phlegmo
ne igitur tantisper est refrigerandum, quatenus &
ad incrementum eius sistendum est commodum:
etenim cùm immoderatus calor dolorem exciter,

Li. 3. me
thod. c. 6.

Li. 3. me
thod. c. 8

Institutionum Chirurgicarum

atque etiam aliquid ad ægrā partē attrahat, utroque nomine augescere phlegmonē accidit: ergo quantum refrigerationis phlegmoni, ceu calido morbo congruit, tantum eius incrementum inhibere est aptū. Simili modo & quæ calfaciunt modicē, utraque interdum ratione profunt: quoniam & dolorem sedant, & quod contentum est in laborante particula digerunt. Quibus constat, quantum præstet ad occasionem & quantitatem repellendi nocendam humoris & tumoris conditio.

Li. ar. mc.
cap. 95

Qualis verò futura sit ad digerendū materia, expressē docet Gal. dicēs: Quod igitur mediocrē caliditatē obtinet, in his sensum doloris nō inuehit, atque eo amplius omni dolore vacat, si humidū extiterit: quippe calidiora maiore dolorē & fluxionē cōcitāt, & ob id simillima nostro calori oportet esse, quæ phlegmonis & erysipelatis resolutioni proficua sunt. Quod sanē alijs verbis mille in locis cōmendauerat idem author, semper statuens moderatum calorem similem cuique particulæ affectū, ad phlegmonarum resolutionem proficuum esse. Nec ob id credendum est suppuratoria fore hæc medicamenta, quia nec poros obstruunt, nec seruant humiditatem partis & humoris, sed lentē & sensim depascuntur & resoluunt omne superabundans. Quapropter censeo Hippoc. dixisse, pingua ad inflammationem non conducere, neque ad ea quæ non sunt purgata, neque ad putrescētia, quia his red duntur calidiora.

Li. de affe
ctionibus

Cæterū in alijs affectionibus, in quibus fluxio ex toto iā quieuit, & crassū ac sūmē impactū est quod superest, aut citra fluxionē paulatim gignūtur, maxima opus est cōsideratione, ne aut tenui parte euaporata, durior supersit residuum si efficacioribus
vitiis,

utris, aut si lenioribus nihil prodesse possis. Quod egregie aduertit Gal. dicens: At in quibus sensus quidem est (loquebatur de scirrho & duris tumoribus) sed obscurior, hæc curatur pharmacis humorum incrassatū digerentibus, non tamē validē ac vniuersim hoc agentibus, sicut digerentia medicamenta faciunt, cuiusmodi Græci vocant epispastica & exhipotica, idest, attrahentia, & excolatia. Mirari verò non oportet mutationem in duritiem ex inflāmati accidere, cū simul & humor cōfluens crassus est & viscidus, & curatio medicamētis valdē exsiccatib9 administratur: nā verendū est, vt alibi refert, ne humorū reliquæ duræ fiāt: nam ea curatio quę fortiter exsiccatibus agitur, reliquias duras operatur: Nisi enim humectaberis inquit Gal. atq; mollieris induratos tumores, sed fortibus medicamētis tantū soluere studueris, in primis quidem diebus eos insigniter decrescere facies, sed pariter id quod relinquitur indurabis. Quāobrē censeo alibi dixisse: Melius igitur sicut diximus, vt fortiter resoluentibus medicamētis admisceamus molliētia, Verētes, ne tumores in scirrhu cōuertantur. Cuius operis metrū & rationē adduxit Gal. dicēs: Indurescētia igitur, quę ex recta medēdi methodo nō curata scirrhu cōtrahūt, optimē curabūtur, si Medicus spectet, quantū ægri corporisq; substantia à medio cri humiditate ac siccitate recesserit, quemadmodū etiam si affectus constitutionē, quatenus sit aucta inspiciat. Præterea cōsideret inter ipsa pharmaca, quę magis, quę minus emolliant: huc namque spectanti primus vsus emollientis medicaminis coniecturabilis quidem erit, sed cum artificio: at post vnum aut alterum diem, num intendere an remittere medicamento virtutem conueniat, intelli-

Li. 7. phar
ma. gen.
c. 9

Libr. 2. ad
Glauc. c. 7.

Libr. 14.
meth. c. 4

Libr. 6.
pharmac.
gen. cap. 1

Institutionum Chirurgicalium

intelliget. Et subdit. Quapropter Medici emollientia & digerentia pharmaca composuerunt, tum ut partis duritiem, quæ iam in scirrhum degenerat, diffunderent: tum ut per halitum digererent: non vicissim utroque utentes. Ex quibus euidenter colligitur, necessum esse in induratorum resolutione miscere emollientibus discussoria: nam materia resolutioni apta ea sola censetur quæ aquea & vaporosa ac tenuis sit: quod si crassa existat, & talis non reddatur, longe durior fiet resoluentium adminiculo.

His præmissis, euidentissimum est ad hanc vacuationem quæ per resolutionem futura est, necessum esse humores in parte contentos prius per attenuationem præparare, more naturalis potentia, quæ dum per cutem humorem sudando nititur expellere, prius in vaporem mutat, tandem in aquosam naturam, tenuiorem longè humoribus. Quam sanè legem seruantes prisca authores varia composuerunt pharmaca discutientia, præparatorijs admixta, ab affectus & humoris natura sumpta diuersitatis indicatione. Nam duros concretionem aut siccitate humores resolvere tentabis, præmissis aut comistis quæ emolliunt medicamentis, crassos humores attenuantibus, lentos inscindentibus, viscidos abstergentibus, omnes verò humidis: nam humiditas, & quod crassum est, tenuat, & quod viscidum est, faciliè separat & fluidum reddit: quibus sat est adiungere quæ modicam habeant caliditatem: nam his frænata humorum duritie, vel solo innato calore resolutio fit, nedum cum moderato aut paulò maiori: quinimo sæpe sat est, sicca circa calorem addere medicamenta, quibus ebibatur quod fasum, tenuatumque existit. Cuius resolutionis

quemi-

aneminerat etiam Galen. his verbis. Quæ verò ex-
calfaciunt, dum contentum in caleſcentibus corpo-
ribus humorem in vapores diſſoluunt, quæ autem
deſiccant, velut quæ vocantur diaphoretica, hoc
eſt per halitum digerentia, & id ipſa duplici ratio-
ne, aut humores ebibentia, cùm poris quibuſdam
inſunt, aut totam alterantia partem. Quo genere
curationis Chirurgorum peritiores vtuntur, ve-
rentes maiora mala ex calorificis præſidijs. Quo
fit, vt adinuenerint illam mineralium miſcellâ, quæ
id tutius exequantur, vt latiùs reperiẽs lib. de præſi-
diorum recto vſu.

Li. 5. ſim-
pli. c. 4.

Superẽſt vltimò notitia partis affectæ, quæ non
paruam præſcribit reſoluentium varietatem, & ad-
monet prouidentiam. Sic Galen. conſulit cum par-
te ſtupida duriùs, cum ea verò quæ acutiùs ſentit,
clementiùs agendum eſſe, quàmquam ſtupore partis
abutendum non eſt, vt ea imperes quæ exulceret:
ſic enim corpus contabefcet & contrahetur, non
areſcet, cogetur materia, non liqueſcet, horror, do-
lor, fluxio concitabitur, dehiſcent venæ & omnia
in deterius mutabuntur, ac multo magis ſi materia
conſtant ſicciori & craſſiori. Præterea affectarum
partium nonnullæ raræ, laxæ, molles natura exi-
ſtunt, nonnullæ autem denſæ per ſe aut duræ: prio-
res igitur facilè euacuantur, reliquæ acrioribus
egent. Item ſunt inter partes, quædam in ſuperfi-
cie corporis ſitæ: alię quę ſitum habent profundio-
rem: nonnullæ raræ & molles, vt dictum eſt, & plu-
res quæ connexionem habent cum emunctorijs:
item quædam quæ cæcos habent meatus: vltimò
alię quę principales ſunt & publicum habent of-
ficiũ, & alię quæ reliquis inferuiunt. Quo fit,
vt partes in ſuperficie, molles, raræ, tenues, leuia
ſolum

Li. 14. Me-
thod. c. 5.

Institutionum Chirurgicalium

solùm resoluentia sustinere possint: contrariæ verò vehemētiora, quia vt illa à maioribus offenduntur, ita hæc à leuioribus non iuantur. Principes verò partes adstringentibus gaudēt admistis cum resoluentibus: sicut infimæ sortis particulæ nullis indigent, nisi solis resoluentibus.

DE PUS MOVENTIVM *auxiliorum recta administratione*

INSTITVTIO XI.



Li. 14. me
tho. c. 13.

Edendi quidē ratio & vsus postulat, post repellentia auxilia discutientia esse adhibenda: in quo opere persistendum est, si malum illi cedat, alioqui suppuratio tentanda erit, vt natura docet & Gal. scribit. Cuius auxilij gratia (quia graue opus est) pus mouens, scire primò oportet, qualis sit pus mouentium medicamentorum natura, qualis materia in genere. Quæ sanè res cùm opus naturæ sit, rimari oportet, an id ea sola possit, an artis adminiculo indigeat. In qua re considerare expedit, rarò solùm membri calorem id posse efficere: quia cùm maior quantitas humoris in parte succrescat, quàm ea sit quæ secundùm naturam ad alimoniam succrescere soleat, tantũ oportet caloris adaugere, quantum ipse humor copia superauerit. Sic enim quia caloris innati beneficio ea opera fiunt, substantiam innati calidi adaugere opus erit. Quo fit, vt duorum generum necessariò debeant esse hæc medica-

alimenti: primū eorum quæ calida sunt, quātum pars in qua futura est suppuratio, calida fuerit, aut æquē temperata: namque æqualitatem eius neque intendere, neque obrundere tenetur: ac etiam cū hoc humida esse oportet, ita ut neque augeat, neq; minuat humiditatem partis naturalem, quod salē sit manifestum & sentiri queat, ut ex Arist. & Galen. circa controuersiam constat. Secundum eorū genus est, quæ emplastrica dicuntur: nam si substantiam innati caloris augere & non intendere eius qualitatem oportet, poros corporis obstruere necessum est, quo videlicet halituosos transpiratus includant, quibus ipsius caloris substantia & copia manifesto augmento crescit. Itaque ea medicamenta quæ maiori sunt prædita calore, ut naturalem haud quaquam seruent moderationem, omnino nihil horam efficiunt. Nam si ficciora sint, cū detergant, obstructione liberant, referantque meatus, & vnā quoque particulæ calor euolat: quo fit, ut humores contenti non parum euacuētur, & qui reliquus est incalescat, & caloris natiui substantia diminuatur. Qua etiam lege hæc medicamenta ab emollientibus dissideant, hinc cōstabit, quia emollientia calidiora sunt, & moderatē siccant, humiditatem tamen in partibus existentem adseruant: pus enim mouentia similem nostris corporibus fortiuntur calorem: aut emplastrica sunt, & calorem prohibito effluxu adaugent: quæ ut celerissime pus fiat, proficua sunt, sicut illa, ut optimum fiat.

His suppositis, statuēda est differētia inter verā coctionem, & eā quæ suppuratio dicitur: nam verā coctio separat excrementa à verò alimento: suppuratio verò, quod per putredinē calor vitiosus separa-

Lib. 4. de
theor.
Li. 1. meth.
thod.

Institutionum Chirurgicarum

re nitebatur (cū tenetur facere cessare putredinē) coniungit & vnit, & tantum studet ad benignum reducere, nulla aut quā paucissima separata nutritura substantia. Præterea hæc eadem suppurationis ratio, diuerso modo exequenda venit in tumoribus præter naturam, ac in vniuerso genere venoso, vbi febrium putridarum humores suppurationi tumorum quid simile experiuntur. Quæ sanè diuersitatis ratio sita est in modo caloris: quia calor coctionis author halituosus esse tenetur & spiritibus plenus, qualis necessariò est qui in venis & arterijs profundioribus corporis, in quibus sit putredo, reperitur: qui verò in partibus externis moratur humor, talem nequit obtinere calorem, quoniam ille per carnis & cutis meatus faciliè exhalat cum spiritu. Quamobrem vi emplastrica & adstricti genti intus occcludendus est, ne desit coctioni aut suppurationi, quæ in partibus inflammatis prærequiritur. Nec parti quidem inflammatae idem imminet periculum, quod vniuerso corpori adstricto & obturato: nam suffocatione periclitaretur vniuersi corporis calor, si natua transpiratione emplastricis destitueretur: quod vni parti non continget, quia vicinarum perspiratione frueretur. Quo fit, vt calor natiuo similis, morbis febrilibus ex vfu ad coctionem sit: alter verò qui emplastricis conciliatur, particularibus suppurationibus, ni quid obstitit, aut immodica fuerit partis plenitudo, vt vereamur illis apposis in gangrenam migraturam.

Hæc profectò est in genere emplastrici medicamenti forma & natura: quibus vt quis rectè uti possit, sciat quæ temperatae esse naturæ diximus, tot susceperat differentias, quot partium nostri corporis

poris sunt temperamenta & calorum sortes, quæ etiam nonnulli variantur ob variam humoris suppurandi naturam. Ex emplastricis etiam quædam sunt propriè talia, & alia ex astringentium sorte id quoque efficiunt, quia poros occludunt. Quæ autem verè talia dicuntur, duorum adhuc sunt generum: nam quædam illinentia esse oportet, quod poris corporis illita tenaciter hæreant, qualia sunt glutinosa, ferrea, & nulla ratione acria, ut Gal. statuerat dicens: Breuiter ergo emplastricum medicamentum est, quod tenaciter corporis poris siue meatibus illitum hæret, & mordacitate vacare etiam tenetur, ut pinguedines omnes, butyrum, resina, guaiaci & oleum dulce. Alia rursus sunt, quæ emphrastica, idest obstruentia poros suo lentore appellantur, quæ media sunt inter calidia & frigida, quorum meministi his verbis Galen. At si talis cum sit, inter caloris frigorisque differentiam insuper consistentiam nacta sit, siccam, terrestrem sit, & citra morsum deficere necesse est: appellentur huius generis medicamenta omnia emplastrica, velut pleraque quæ exactè loca sunt, ut amyllum, pompholyx, cerusa, & eius naturæ alia. Sunt præterea alia quæ ex accidenti emplastrica fiunt, ut emollientia & laxantia ubi crassioris sunt substantiæ: hæc enim illinentia sunt, & hac ratione poros obturant. Quamobrem censet Gale. numerasse inter emplastrica hordeaceam farinam, cum frigida sit naturæ & abstergentis: ceterum illi accedit potius ob miscellam olei & aquæ quam ex propria lege. Est etiam præter dictas alia puris mouendi ratio, quæ proficua est vlcenibus, aut quibusuis alijs continui solutionibus, quæ per simplicem coactum curari nequeunt, ob sanguinis copiam quæ in extremitatibus

Li. 5. simpli. c. 10.

Li. 14. method. Lib. 2. ad Galen. Li. 5. simpli.

Li. 4. Method. Lib. 2. ad Galen.

Institutionum Chirurgicalium

tibus vasorum & partibus vicinis superest, quæ in pus mutari necessum est, sicut ea quæ contusa sunt: nam talia inquit Hipp. suppurari necessum est, si contusio grandior sit: nam levis absynthio confuso & myrrino oleo & rosæ superparsis curatur. Pus igitur mouentia exoptant vlcera, tumore aliquo præter naturam phlegmonoso, œdematoso, aut erysipelatoso coniuncta calidioribus quidem & humiditate temperatis, ut quæ ex hordeacea farina & oleo conficiuntur in phlegmone, & in erysipelate adhuc temperatioribus. Cui vsui ne vlcera sordescant, quæ secundo ordine emplastrica esse diximus, proficua sunt, cæterum apposita eo loco, quem consultat

Li. de vl-
ceribus.

Li. de de-
ceti orna.

Hippoc. dicens: In talibus quidquid cataplasmate opus habere visum fuerit, non super ipsum vlcus cataplasma ponere oportet, sed circum, super circumfiras partes, quo pus decedat, & indurata molliantur. Quod etiam alibi his verbis protulerat: Verum cataplasmate per ambitum vlceris, vtaris: nam is vsus & artificiosus est, & multum prodesse potest: obducere enim oportet vlcus medicamento ei vtili: rursus in defluxione quam partis impotentia nequit aut conficere, aut in pus vertere, huiusmodi auxilia plurimum sunt proficua: necnon vbi pars affecta frigida est, aut facultatem habet languidam. Verum si distemperies vlceris calida fuerit, quæ nostro calori aut parti affectæ sunt simillima, adhibenda sunt, ut quæ calorem maiorem nata sunt attemperare. Hinc enim factum est, quod sæpe mineralia lota & læuigata optimè pus moueant, ut in cetero ex lithargyrio quotidiano euentu compertimus. Ratio est, quia eam nanciscitur temperiem, quæ fere omnibus externis partibus, qua-

rum

rationem est magna in temperamento diuersitas, est affinis.

Subit tamen in examen, quales humorum, aut tumorum differentiæ suppurationem admittant, aut quæ difficulter aut facilius, & quale suppurantium genus quouis eorum expostulet. Constat profectò ex Galen. puris substantiam potius confici ex sanguine quàm ex quouis alio humore: sic proximè huic sunt carnes contusæ, & tandem omne id quod cum parte alenda similitudinem habet. Quo fit, vt simplicis humoris tumor, velut erysipelas, rarò in pus mutetur, & si id Galen. tentare iubeat, quòd ex tenuissima fiat sanguinis parte, qui exquisitus est, idque rarò & cum hotdeacea farina, aut similibus: nam veritum fuit etiam ab Hippoc. dicente: Ab erysipelate putredo aut suppuratione malum: magnam enim corruptionem significat adesse, vbi cum erysipelate putrescit caro, ad quam sequitur suppuratio: verùm hæc de solo erysipelate ex flaua bile factò: cum hoc tamen alijs præsidijs tentare oportet biliosorum tumorum curationem, & omnino abstinere ab his quæ pus mouent. Quod etiam obseruare oportet in omnibus à melancholia obortis & scirrholis omnibus, ne in canceram aut malignam exulcerationem degeneret. At pituitosis tumoribus & his, qui ex frigida, crassa & viscida materia constant, non est ita facile interstinguere, an suppurationem admittant. Nam Hippocrat. ædemata suppurare docet: quod perdifficile videtur, cum necessum prius sit pituita in sanguinem verti, quod vix fieri potest, aut nunquàm: ergo neq; in pus. Quæ controuersia dirimes, si intellexeris Hippocra: locum fuisse de ædemate, quod ex venoso genere

4. Aphor. 47.

Li. r. 7. apho. 20.

Li. 1. pro no. 3. & 31.

Institutionum Chirurgicarum

per iudicationem in morbis acutis progignitur
item ea pituita etiam suppurari potest, quæ in loco
aliquo calidissimo conclusa, diu incalescit: inquit
Li. de glā enī Hippocrat. Alijs autem si per palatum in gut-
dulis. tur multa fluxio contingat, vt plurimum morbi ra-
bis oriuntur: replentur enim pulmones pituita, at-
que ea ipsa pus fit, id quod pulmonem exedit. Ex
quo colligitur, aliquando pituita in pus verti, cæ-
terum à maiori calore: quare pus mouentia illis
opus est esse maioris efficacix & caloris, vt tan-
tum partis calorem adaugeant, quantum ipsa à pi-
tuita frigiditate superatur. Cauendum tamen
est ab his vehementioribus, vbi copia humoris ma-
ior est, aut particula parua, vel partes extremæ &
exangues: quapropter in his omnibus prudenter
suppuratorijs vti oportet, sicut in partibus natura
imbecillibus, & omnino ab eis fugiendum in ma-
lignis tumoribus, vt consulit Galen. his verbis. Ce-
terum nolite putare me omnia cruda nullumque
Libr. 6. po pus habentia ita curare docere: nonnulla enim ex
pu. 30. his, ab emplastricis istis medicamentis putrescunt,
aut propter humorum ipsa creantium prauitatem,
aut ob affecti membri imbecillitatem, ingentium
calorem ita pusillum ægrumque habentis, vt neq;
humorum in ipsum de lapsorum coctionem aggre-
diatur. Tantum enim veretur Gale. ad huc in his,
Libr. 2. ad in quibus opus est suppuratione, vt ea potius pro-
Gla. c. de hibere studeat, dicens: Si speres eam prohibere
auscultans. posse, panem oleo & aqua per mistum plurimum in-
coques: sanius enim est vel resoluentibus discute-
re, aut scarificata parte humorem vacuare. Quod si
natura ad suppurationem properauerit, diligenter
& breuiter procuranda est. Inquit enim Gal. loco
citato: Quos vbi digerere posse parum speraueris,
cata-

cataplasmatibus ex triticea farina vtere, nam ad celeritatem suppurationis plurimū cōferūt: quæ enim diutius immorantur, maximam carnis excavationem, plurimos sinus, ac sæpe immedicabiles fistulas pariunt.

Nec minoris momenti est nosse, quæ partes suppurationem admittāt, & quæ difficulter, aut secus. In qua re statuendum est, partes abditas & intra corpus dissitas nulla ratione suppurantia admittere, ob loci incommoditatem, & quia sufficienter calidæ sint ad id opus. Quo fit, ut nefas sit in huiusmodi partibus suppuratorijs auxilijs quidquā tentare, licet natura id aliquando efficiat: nam multa tentat ipsa, quæ Medico non licet mouere. Partes etiam quæ articulationes constituunt, omnino pus mouentia renuunt: difficulter enim vlcerā harum partium sanescunt, ob copiosas humiditates quæ ad eas confluunt: præterquā quod ligamenta & tendones facile ab his medicamentis putredinem subeunt. Rursus partes pusillæ & extremæ, ut superius diximus, ubi multo humore irrigantur, ob gangrenæ periculum defectu caloris, qui facile suffocaretur his appositis. Item vltiones quæ sunt vel ad varices, vel fluxum sanguinis sistendum, ne gustare quidem possunt suppurantia medicamenta, ne ante integrum partium coalitum decidat scara: neque in gangrena protinus ante integram exsiccationem eis vti oportet, ne amplius partes computrescant.

His habitis, statuendum est, ob id varia artem nostrā adinuenisse suppurantū auxiliorum genera, quod mira partium & humorum varietas id iure optimo exoptuler. In genere tamen ea quæ simillima sunt nostro calori, necessaria existunt & sufficiunt,

Institutioⁿum Chirurgicarū

cū^t vbi pars calore abūdat: ceterū ad suppurandū humoris incrementū caloris etiā incrementū adhibere oportet: aut vbi humor adeo tenuis est, aut curis rara, quod nō opus sit emplastricis: quibus opus habemus in frigidis particulis & humoribus. Alijs vero quæ ex accidenti pus movent, indiget natura vbi opus est aliquid ante puris confectionē efficere: preparare nimirū ad festinā suppuratiōē, præsertim vbi utrūque finem respiciamus, scilicet resolutionē, & eius quod remanserit suppuratiōē. Cæterum licet in erisypelate & alijs calidioribus, frigidis vtiatur aliquando, tutum tamen semper non est, quia & calor partis extinguitur, & tumor in duriciem immedicabilem commigrat.

DE RECTA ADMINISTRATIONE tergentium auxiliorum

INSTITUTIO XII.



Suppurato disruptoq; abscessu, nequit pars ad antiquū statū reduci, nisi à recrementis eū puris, tum sordidū quæ in carnis generatione supersūt expurgetur. Quæ sanè tractationem in quatuor potissima capita placuit diuidere, iuxta quatuor quæ in ipsa consideratione signa existunt: nimirū quibus, quando, quantum, & quousque abstergentibus vti oporteat.

Circa primum sciendum est, triū generum esse medi-

medicamenta huic ministerio proficua: quorū primum continet ea omnia, quę communi quadā acceptione abstergētia, seu rhyptica dicūtur: secūdū ea quę catarētica seu purgatoria, & fartu liberantia ab omnibus appellantur: tertiū verō reliqua omnia quę abluēdo, à fordida labe partē vindicant.

Cōstat igitur ex Gal. rhyptica speciatim, sordē à cute & vlcēribus tantū extergere, nō etiam obstruēta liberāt: inquit enim. Nā quę in superficie solū sordē auferunt, siue in cute, siue in vlcēribus, ea extergētia seu rhyptica nominarūt: quę verō poros purgant, ea subtiliorū his partiū sunt, & emplastris contraria: proinde ephracticā & ecatarētica appellantur. Nitrosa quidē sunt omnia & amara, parū inter se ratione maioris aut minoris operis dissidētia: cū hoc tamē, quę efficaciora sunt, si adstrictionē sortiātur, parū aut nihil abstergūt. ob meatuum angustia, quia ea ratione adhærent magis sordes. At in internis viscerib9, q̃ maiores habeāt meatus, maius accipiunt cōmodū ex vasorū corroboratio- ne, quā propter osculorū exiguitatē lædātur: sic ab synthiū foris adhibitū, parū aut nihil agit, intus verō sumptū, mirū in modum repurgat, sicut alia quę eiusdē sunt naturæ, vt nitrū vltū, nuri spuma, & aristolochiæ radix. At cutis vniuersæ & vlcērū sordes, nō hæc tantū sed viribus minora auferre possunt, salsa nimirū & dulcia omnia, quę tenuiū sunt partiū: licet ex amaris imbecilliora alijs admista, prodesse optimē possint, tergit enim modicē farina fabarū, hordei, cicerū, semē lini torrefactū, terebinthina magis & mel despumatū: thus, amygdalē amarę: valentiū erui farina, semen hormini, radix ireos & panacis, atque alia id genus.

Abluentia verō medicamenta, licet etiā sordes

Institutionum Chirurgicalium

Libr. 2.
tit. 2. c. 4

inferant, longè à prædictis virtute & agendi modo dissident, quod nullam habeant abstergendi vim, ut his verbis dixerat Auicenna. Inuatiua est omnis medicina, cuius proprietas est ut abstergat, non virtute agente in ipsa, sed virtute patiente, quam inquit morus: & significo per virtutem patientem, humiditatem, & per morum significo, cursum: currens enim subtile cum vadit super osticia venarum, lenis humiditate sua superfluitates, & remouet eas suo cursu, sicut aqua hordei & aqua cucurbitæ. Quibus constat qualis natura sint abluentia medicamenta, & qualiter dissident ab abstergentibus. His tamen medicamentorum abstergentium foribus alia adiungi possunt, quæ iugendo, ut spongia & suctiones, idem opus molliuntur. Et ea quidem aliquando in angustis & fistulosis vlcibus non paruo vsui adhibentur: quo etiam casu pyulcis uti licet, sicut & alij quæ idem præstant, quod ex sicca & rara materia sint confecta.

Hæc autem medicamenta, quæ verè abstergentia dicuntur, solum id vlcus quod aliquid habet in sordem aut pus conuersum, desiderant: etiam si vlcus conditio, qualia abstergentia debeant esse eligat. Evidens illud quidem est nonnunquam carnem visiosam, ac sæpe humore fluentem in pus vertentem carnem ipsius vlcus, crassum & tenue excrementum ex necessitate naturæ generare: tenue verò oportet, aut coquere, si id vlcus crudum expostulet, aut exficcare & conterere: crassum equidem aut mediocre, modò pus, modò sordes, aut quous alio modo appellare libuerit, perpetuò abstergendum.

Sed primi generis medicamenta (ut probè eligas, & cuique ut par est, præstare possis) tria consideranda

randa præbent: nimirum affectus naturam, sordis speciem & locum affectum: quippe ab his omnibus ea variare aut aliquo modo mutare, non raro contingit. Quippe vlcus quodlibet, vbi à simplici de generat aut affectibus coniungitur, qui peculiarē sibi curandi rationem prærequirunt, vt cum dolor, fluxus, carnis deperditio, sordes, sanies, pus aut cachoeria, vel quæuis alia deterrima conditio illi succrescunt, aut aliquid ab vlcere prodit; quod ipsum mutare videtur. Si primum, præmitti debent medicamenta aut saltem his cōmisceri, iuxta rationem affectus qui vlceri associatur: nam cruditas peptica, durities malactica, phlegmon lenientia, & sic de alijs permiscere docent, donec ex toto associari affectus subsideant, & solis abstergentibus vti liceat, vt consuluiffe Gale. constat. Quo fit, vt iuxta optimam rationem prisci illi sapientissimi varias composuerint his vsibus medicamentorū formas, quas Galen. refert. Si verò secundū, cachexiam, virulentiam, corrosionem, sorditiem, putredinem, profunditatem vel cauernositatem: quæ omnia symptomatis potius aut cause, quàm vlcere diuersitatem obtinet. In quorum curatione id adferuabis, quod in reliquis: nimirum accidentia vel causam primò auferes aut fluxionem, quā abstergentia adhibeas, vt his verbis optimè dixerat Gale. Prohibet quidem maximè huiusmodi vlcera sanescere fluxio, post vero, reliqua omnia putredo sanguinis, & si quid ex sanguinis transmutatione est ortam: præterea herpetibus & esthiomenis omnibus: namque ex his qui fluxerūt humoribus, aliquid facillè suboritur ex supra dictis malis: aut facta aliqua mala nutritione, corruptione ve aut duritie, aut quouis alio sanioso aut putrido vitio, quod curari antea

Li. 2. phar
ma. gen.
c. 4.
Li. 3. phar
ma. gen.

Li. 4. meth.
c. 5

'Institutionum Chirurgicarum

desideret. Quapropter his vlceribus abstergendis ea medicamenta sunt proficua, quæ vlceris vitio viribus sint æqualia, si abstergere incedimus. Quæ autem vnumquodque vlcus requirat, perdisces facile, si noueris prius ea posse duplici forma adhiberi, solida quidem & humida: illa præ humidis vlceribus, & his quæ in cute sunt, aut prope articulos: abluentia verò sinuosis, fistulosis, & his quæ in corporis profundo sita sunt. Cum hoc tamē his aliquid ex ficcis & solidis addere oportet, quo aliquid vlceri adhæreat: inquit enim Gal. Nisi medicamentum diutius cuti adhæserit, nihil efficiet, & ob id damnat sæpius medicamenta mutare. Nā licet Hipp. consulat sæpius cataplasmata esse mutanda, intelligendum est de cataplasmatibus refrigerantibus: In malignis quidem vlceribus, & his quæ ad cicatricem egrè perueniunt, tota exsiccandi ratio his medicamentis fiat necessum est, quæ circa morsum desiccant. Verū considerare oportet, an vlcus sordidum fiat ex carne ipsius excisa & colliquata, an præter exsiccantia, prærequirat etiam abstergentia, quorum defectu sordidum efficitur. Nam si ex fluxione caro exeditur, per exsiccantia & fluxum reprimentia medicamenta, sordes auferes: quod si hoc non sit, abstergens medicamentum acius est, & ea ratione euocat prauos succos & carnem exedit: aut tam est debile, quod nequeat abstergere. Quamobrem in his pensanda est corporis, & affectus partis dispositio, ac medicamenti natura & efficacia, quod his verbis dixerat Hippocrat. Qui porrò de vlceribus cognoscere velit, quomodo singula finient, eum primum omnium hominum species perscruari oportet,

Libr. 4.
pharmac.
gen. 1. &
4. cap.
Li. de affe-
ctio.

Lib 2. præ-
dic.

tet, tum eas quæ meliores sunt ad vlcera, tum quæ
deteriores: deinde ætates nosse in quibus singula
vlcera curatu difficilia existunt: locos item in cor-
poribus perspectos habere, quantum alijs ab alijs
differunt. Eadem etiam refert Galen. docens par-
tes quibus difficulter curantur vlcera: ex locis
subalares & laterum mollitudines, aut femo-
ra: nam & moræ in ipsis sunt, vt inquit Hippocrat.
& recidiuæ: & ex articulis periculo maxime ob-
noxij sunt maximi digiti: & præsertim pedum:
Nam vt Galen. consulit, maligniora vlcera &
corpora duriora ac robusta, valentiora abster-
gentia desiderant: at mediocria mollioris cor-
poris habitus aut imbecilliora. Sed horum for-
mam & rationem scripsit Galen. apertissimis ver-
bis dicens: Præterea notandum venit, pura vlce-
ra ab his medicamentis, vnde prius cum essent for-
dida, nihil mordacitatis percipiebant, nunc mor-
deri: quod est signum euidentis medicamentum ef-
ficacius. Quæ causa est, vt à valentioribus
absterforijs ad mitiora minusque mordacia digre-
diamur, vbi vlcus admodum purum inuenerimus:
quemadmodum rursus in fordidis, præsertim quæ
vim medicamenti non sentiunt, ad magis ab-
stergentia transeamus. At in corrosiuis vlceribus,
vt maior vrgentiorque est repellendi, & exsiccan-
di necessitas, ita quæ abstergant medicamenta
minorem præstant vsum, licet aliquid eorum ad-
miscere non sit ab re: abluere tamen huiusmodi
vlcera sæpe cõuenit. In cãcrosis vero viceribus ma-
iori opus est consilio: in quibus si debili vtaris me-
dicamento, nil efficies, si validiori irritabis: quapro-
pter loris aut vltis metallicis Gal. vti cõsulit, quia
mediã obtinet naturam: nã hac ratione cõtionem
inuuant

Li. 4. phar-
ma. gen.
2.

Li. 4. me-
thod.

Li. 4. phar-
ma. gen.
c. 2. & 3.

Institutionum Chirurgicarum

iunant, tepore verò vlcis calorem compescunt, innata siccitate exsiccant & extergunt. Huius generis sunt lemnium sigillum, cadmia, calcis his, calcanthum, mysi, fori, stybium, plumbum, scoria plumbi, squama ferri & alia eius naturæ, dum lotione aut igne mitescant, quibus tantum ceræ, pinguedinis aut olei addere oportet, quantum hæc simplicia fuerint fortiora. Sic quæ ablui desiderant prius molli vellere aut linteo abstergere oportet, aut ferro, si acris sit sanies: si copiosa sordes, melicrato: si multa simul & acris, sero in quo sacchari octuplū, vel mellis tantundem diffusum sit: si verò vermiculosum fuerit, succo absynthij: quod si cavitas purior sit, onomellite, post vino austero utendū est. At in foetido sinu, putrido & cruento, oxycratum adhibebis, acerum, oximel, onomelli, dilutū marrubij, absynthij decocto, aloës, myrrhæ cum pauco melle. In defluxione humoris maligni & malignis vlcibus, & atramento furoris & caricis in cinere vstis pulvisculus onomellite aspergitur. Ligni etiam sancti decoctū, mirum in modum prodesse assolet. Tandem ea medicamenta abstergentibus & exsiccantibus addes, quæ vlcis conditio, accidens aut complicatio postulauerit.

His suppositis, superest adhuc alia vlcis conditio, qua vlcus quidem simplex aut cauum appellatur: simplex verò duplex reperitur, alterum citra alicuius substantiæ deperditionem, cuius meminerit ea de agglutinantibus: alterum verò cum deperditione, quod à cauo differt, quia hoc & cute & carne subiecta caret, illud quidem sola cute: quod vlcus planum appellat Galen. Circa quas vlcis differentias nosse oportet, quod cum hæc tantum desiderant carne impleri, & cute tegi, & ea sint solū naturæ

naturę opera, quę perficere ipsa nequit, nisi quę prohibent abscindantur excrementa, quę necessaria ex quavis coctione prodeunt, hinc profectò fit, dum vlcus simplicissimum non est (quòd sola vnione coalescat) abstergentia medicamenta esse necessaria, quę naturę carnis generatrici exterius superfluitatibus ministret, vt libere carnē generare possit. Nihil enim vulgarius est, apud Chirargos, quā huiusmodi vlceribus adhibere quę abstergant & exsiccent: hoc ad ebibendas tenues humiditates, illud verò ad sordes detergendas. Quoniam tenue illud excrementum, quod secundum naturam ex coctione & nutritione partis sanę supererat, euolabat quidem vi & efficacia sani caloris: at vlcerata pars, cū calorem non habeat æquę vegetum in aqueam & tenuem humiditatem mutat, qua vlcus humidius redditur: præterea crassum excrementū quod ex eadem coctione pullulabat, nunc in vlcerata parte, in sordem & putrilaginem abit. Qua sententia diluuntur rationes Argenterij & Falopij aduersus Gal. existimantium in vlceribus non reperiri has sordes & tenues humiditates, quia non coquit pars vlcerata: quam disputationem latius explicatam reperies lib. de recto vsu præsid. Ego tamen existimo in principio & semper in vlcere prædictas sordines reperiri: cæterū dispari plurimum ratione: in principio quidem ob cruditatem & caloris præternaturalis actionem, & humoris ad vlcus confluentis maiorem copiam & vitium, partim quia non coquitur, partim quia adurit. At procedente tempore dum vlcus coquitur, prædicta sordine purius redditur, quia coquantur qui præfuerāt humores, quibus vlcus sordescibat: ea tamē excrementa, quę a partis nutritione & carnis gene-

ratione

Institutionum Chirurgicalium

ratione subornatur, vt Gale. est sententia, quo magis coquitur leuiter sordidū sit ea sordine, quæ nō efficit vlcus vitiosum, vt prima sordities: quinimo his apparētibus, boni moris esse, & ad salutem properare vlcus existimamus, & sic quo magis coquitur, comminus apparēt ixores & sordes quæ à principio apparuere, & puris maior copia, & citius sanescit vlcus, & pus secū ferre admixta illa duo excrementa coctionis. Et sic pus prout maiore aquosi & crudi humoris copiam secū defert, aut crassioris, sordidiorisquæ maiorem aut minorem, aut æqualem cum abstergentibus exsiccantium medicamentorum miscellam exposcere: quia hæc excrementa rarò sola visuntur. Quo factum est, vt vlcus in principio esse crudū iudicemus ob copiam illius primæ speciei sordis: cōcoqui verò, dū pus optimū sit: improspere verò coqui, dum tenuis crassave puris substantia plus iusto est. Ex quibus euidenter constat, duo esse genera excrementorum in vlcere: vnum ex cruditate & vitio caloris obortum: aliud excoctione. Illud verò quod crudis vlcerebus adest, nulla ratione abstergentibus curari potest: nam irritatio vlcere eorum mordicatione & absterfione, crudius ob nouam fluxionem & dolorem efficitur, sed ijs tantū auxilijs quæ coctionem iuuent, & pus moueant. Quo fit, vt adhibitis frigidis, aut alijs quæ à natura coquentium longè dissideant, vlcus temperato extraneo calore coquatur. Cui etiam vsui ea tantū sunt adhibenda, quæ partis natiuam temperiem corroborent citra emplastricam qualitatē. At ea excrementa duo, quæ diximus, & pus citra vllam dubitationem abstergentia medicamenta expostulant: siccantia tamen admiscere oportet, sed alijs præcipue vsibus

ut legēs ea de carnem generantibus. Verum dum pus improspere perficitur, & vitio caloris aut humoris aquosius fit, exsiccantia medicamenta predominari tenentur, sicut abstergentia, dum pus crassius fit eiusdem caloris aut humoris vitio. Atque his constat, qua lege quis certo vi possit tribus illis generibus abstergentium quę superius diximus.

Situs etiam & natura atque figura partis evariant prædictorum medicamentorum formæ: nam sinuosa, abluentia desiderant cum abstergentibus paulo valentioribus & frequentius exhibitis, ut Hippocrat. consuluerat. Quæ sanè ulceris figuræ indicatio adeo est necessaria, quod sæpe obumbret indicationem partis sicciora exposcentis: quod docuerat Galen. dicens, Siccioris sunt, qualia esse diximus, quæ minus sunt carnosæ, cuius generis, quæ circa digitos & articulos habentur: præterea, quæ circa aures, & nasum, & oculos, & dentes sunt, ac ut semel dicam, ubi crebræ cartilagineæ ac membranæ & ligamenta, & ossa & nervi sunt: cum hoc tamen dum sinuosa sustinent ulcera, abluentibus tutius & citius curantur. In qua re in examen revocatur sententia illa Hippocrat. in qua præcipit nulla ulcera esse madefacienda, præterquam vino, nisi in articulis fuerint: quem locum nonnulli intelligunt de ulceribus in articuli prolapsione. Quo loco Galenus aperte monstrat id fieri, ne nervi in articuli prolapsione distensio contingat: qua de causa non solum vino, sed & laxantibus & mollientibus vi docet quod expressis verbis consuluerat Hippocrates dicens: Omnibus enim circa articulos lesionibus multa aqua calida affundenda est, quod

Lib. 1. de morb.

Li. 3. metho. c. 2.

Institutionum Chirurgicarum

quod de omnibus vlceribus iuxta articulos subaudire oportet. Nam harū partium vicera varia exoptant medicamenta, ob varias causas: tum quia articulorum natura non omnino renuit abluentia medicamenta (licet sicca consent substantia, quæ ob id & ratione vlcis siccis gaudent) quia in articulis necessum est inesse quandam humiditatem motui facilius efficiendo aptam, quā humidis præcauere oportet, aut humidioribus alimentis reficere: tum quia siccis medicamentis harum partium vicera facillimè exacerbantur, & ob id abluentia siccis admixta exoptantur: tum vltimò quia frequenter in his partibus sinuosa contingunt vlcera, quæ curari vt dictum est desiderant, nimirum per mixta pharmaca: nam sola abluentia plus damni quam commodi afferre possunt. Pari etiam ratione, si vlcus in quouis viscere aut caua corporis parte fuerit, pus suctu & pyulcis extrahere oportet: post hæc abluentia admittis abstergentibus sunt adhibenda, modò per propriū foramen, modò per communia, vt aures, nares, vesicam, vterum & intestina. Ac si vlcus sordidum fuerit, abluentibus medicamenta sunt liquefenda, quæ per se sola exterius sufficerent extergere, nam quod loci ratione non datur, adhibere mutata medicamenti forma necessum est. Vlcera verò vteri peculiari quadam & grandi diligentia curare longissima oratione docet Hippoc. & ob id ad eam partem lectorem relego. At viscerum vlcera ea medicamenta exoptulant, quæ præter id quod vlceri sint proficua, roborant etiam ob partis dignitatem & officium, vt his verbis Galen. consuluerat. Hærique paucum ex adstringentibus pharmacis et admisuerunt, idq; duplicis vsus gratia, sicut diximus: nempe vt id quod

Lib. 1. de
mor. mal.

Li. 4. me-
thod.

Li. 2. phar-
ma. gen.
cap. 16.

quod affectis partibus influit, repelleretur, & abstergentium facultatem vsque in profundum deduceret.

DE RECTO VSV AVXILIORUM
carnem generantium

INSTITVTIO XIII.



VBIT quidem in examē illud auxiliij genus, quo vlcera carne impleri facilius possunt: quod quidē opus, & si solus sit naturæ, ipsa tamen in vlceribus varijs impedimētis præpedita, nequit sine artis adminiculo suum munus perficere, ve-

lut cū sana erat. Cæterū auxilia quę id efficiūtur, longē diuersa ratione ac vulgariter fertur, suū munus exequuntur: præterquam quod Gal. neq; vnā tenet sententiam, neque Chirurghi suum perficiunt opus citra maximā controuersiam. Nam aliquando Gal. scribit ea medicamenta debere esse sicca: nonnunquam primo gradu sicca, & prosequens eorum exempla, quædam secundi, quædam tertij gradus annumerat siccantia. Item modicē calida, hoc est ipsa carne calidiora debere esse: alibi digerendi vi prædita: rursus carnem densantia, repellentia, repellantia, & vltimō ea quę submouēt omnia quę natura opus interceptiunt: quam varietatem sic dirimes.

Diuiditur medicamentum carnem generans in duo potissimum genera: quorum primum continet

h ca

Institutionum Chirurgicarum

ea omnia, quæ proprius videntur id munus perficere, qualia sunt quæ modicè siccandi vires obtinent, quæ quidem non eo magis sarcotica appellantur, quòd aliquid conferant per se primò in carnis generatione, quàm cætera omnia: sed quia semper comperunt vlceri, cui nullus alius affectus inest nisi carnis priuatio, cuius medella est inundantis humiditatis exsiccatio. Secundum verò genus omnia alia complectitur, quæ vtcunq; submouent ea quæ nature opus intercipiunt. Sunt enim vlcerata non pauca, quæ eo carne non implentur, quia præter humiditatem naturalem, aliud etiam obtinent impedimentum, quod nisi semoueris, etiam si commodè fices nil efficies.

Li. 3. method. Circa primum genus nosse oportet, duo esse excrementa, quæ in sanis corporibus in carnis nutritione fiunt, quorum tenue per insensibilem halitum abit, & crassum in sordem: ceterum in vlceribus tenue vertitur in tenuem saniem, & crassum in sorditiem. Quo fit, vt cum vlcus coquitur, & caro generatur, lordidum & humidum fiat: quæ sanè excrementa postea carnis generationi retragantur: quæ propter ea abstergentibus purgare, & exsiccantibus inanire consulit rei natura & conditio. Quæ Gale. doctrina licet optimo innitatur fundamento, vt mea fere opinio, non satis probat exsiccantia solum hac ratione esse vlceribus proficua, vt vè sarcotica possint dici: nam hæc siccandi ratio longè dissidet ab ea, quam ixores qui ex coctione prodeunt, exposcunt. Quo fit, vt duplex succrescat in vlceribus siccandi necessitas, materia & sine longè diuersa: nam sanies quæ vlcus præhumidum (aut, vt rectius loquar, madidum) efficiunt, nulla ratione quæ potestate exsic-

cans

cant expofcunt, fed ea tantum quæ ebibendi feu auferendi humiditates illas efficaciam actu habent. Namque sæpe contingit plura vlcera fanefcere, lineis aut cannabinis linamentis: huius rei ratio eft, quia fi tenuis fanies à carnis generatione prodit, neceffum eft, tanquam excrementum, à carne ipfa ad vlceris cavitatem pelli. Quo fit, vt vlcus ea humiditate madefcat, cui medicamenta, quæ potentia ficcent, qualia funt quæ à Galen. recenfentur, nulla lege fint proficua, fed ea tantum quæ furgendo & ebibendo profunt, vt exterfio crebra ex fpongia aut quavis alia re, quæ extergendi vim fortiatur. Quamobrem aliud pretiofius minifteriũ medicamenta poteflate exficcatia præitare vlceribus mihi femper vifum fuit. Quippe arbitror medicamenta illa farcotica à maioribus appellata, non ad humiditatis illius confumptionem, fed ad nouæ carnis robur, firmitudinem & conftantiã ac fimilitudinem cum præexiftenti comparandam fuiſſe inuenta. Quod fanè dogma ipfa rei ratio videtur conuincere. Nam cum ex Hippoc. conftet ficcum ſano eſſe ſimile, nec meminit quidem Hippoc. ſiccitatis, quæ priuatione fanioſæ humiditatis ſolum contrahitur: nam hæc madidum reddit vlcus, non humidum: ſed eam proſectò magnificat ſiccitatẽ, quæ carni ſanæ aſſimilatur: quam quidẽ vlcus ſua ſponre citra exficcatium adminiculum efficere nequit. Ratio eſt, quia cũ calor partis vlceratę ob cutis defectum facilẽ euaneſcat, nequit veluti cum ſana erat pars, ſua munia proſpere perficere: quo fit; vt carnem generet, ſed non æquẽ ſolidam, denſam ac ſiccã, ſicut ea eſt, quæ in parte præerat, quia nequit puſillus calor ad vnguẽ diſcutere quod alimenti ſuperest: quo fit, vt mollior

Institutionum Chirurgicarum

humidiorque generetur caro, quam sit sana quæ præest: quæ quidem ratione semper eget exsiccantibus medicamentis, quæ robur, firmitudinem, soliditatem, consistentiâ generatæ carni addere possint, ut præexistenti similis fiat: qui usus exsiccantium medicamentorum potissimus est in vlceribus, & ob id dicta sunt sarcotica, id est, carnem quasi generantia, aut reddentia similem carni præexistenti. Quæ sanæ paulò calidiora ipsa carne oportet esse, quo san guinem attrahant, nec vllò modo adstringere, ne ipsum repellant. Quæ potissimum ratione factum est, tot artem nostram adinuenisse exsiccantium medicamentorum gradus, indicatione sumpta à partis vlceratæ natura, non tenui sanie, quia cui-

Li. 3. Me
thod. c. 3. que parti similem teneretur reddere carnem: sic Ga-
len. docuit corporis naturam contemplari: nam
plura in pueris esse sarcotica constat, quæ in adul-
tis & robustis corporibus pus mouent. Pari ra-
tione Aetius hæc refert verba. Carnem enim quæ
ad vlceris nutritionem distribuitur, reliquo cor-
pori similem esse oportet: vbi igitur pristina caro
siccior est, ibi noua quoque superueniens siccior
fieri debet: denique tantum oportet siccum medi-
camentum vlceribus præstare, quantum caro quæ
præexistit, sicca fuerit, nec plus nec minus. Nam
exsiccantia medicamenta, potius carnis conficien-
de gratia, quam ut saniosas conterant humiditates,
adhibenda sunt. Cui rei vltimam rationem adiun-
git Hippoc. dicens: Vbiunque in vlceribus, quæ
neque rectè, neque ut res postulat, assidue purga-
ta prius fuerint, produci caro cœperit, solet plu-
rimam supercrefcere: in his verò quæ rectè, atque
ut res postulat, assidue purgètur, & nisi collisum
aliquid accesserit, siccis præsidijs nutriuntur, ple-
rumque

Li. de vlc
rib.

rumque caro non excrescit. Quibus omnibus constare arbitror, sicca medicamenta, huic solum vltui, & vt verbum Hippocrat. sonat, veluti nutriatur vlcus, adhibenda esse, & ob id sarcotica iure optimo dici. Quo etiam fit, vt si siccioribus quam præexistens caro postulet, viamur, caro siccior fiat, & in cicatricem protinus degeneret, præterquam quod hæc exsiccantia consolidationi vlc^{erum} summopere conferunt.

Cum dictum sit plures esse exsiccantium medicamentorum gradus, iuxta diuersitatem partium corporis, necessum subinde erit ea numerare, ne quis plus, minusve quam par sit, vlc^{eris} carnem inscienter exsiccet. Quæ sanè medicamenta Galen. in tres ordines paritur: nam primo ordine locatur thus, farina fabacea & hordei: secundo resina, terebinthina larifina, abietina, mel coctum & despumatum, mel rosaceum & pompholix: tertio verò erui farina, multo magis aristolochia, mel crudum, myrrha, opopanax, & similia, quæ secundum exsiccantium gradum non excedant.

Li. 3. & 4.
Method.

Quantum verò persistendum sit in exsiccatione, docuerat Galen. statuens, id monstrari à carne quæ generatur: nam si supercrescat, & id plurimum fuerit, siccioribus vti oportet: si verò modicè creuerit, eisdem quibus ad id deuentum est: at si tabescat, minoribus, donec velut reuiuiscens iterum crescat. Cui vsui sciendum est ex Galen. doctrina, carnem esse in triplici differentia, propriè quidem & absolute vnâ: & duabus impropriè: illa quidem dicetur pars corporis nostri, simplex, mollis, rubicunda, fibras musculorum completens: gignitur ex sanguine mediocriter siccaio.

Li. 3. Method. c. 3

Li. 10. Methodo.

h. 3. Alie-

Institutionum Chirurgicarum

Alterum carnis genus nomine carens, huic est finitum, sed ramè diuersum, fibras omnes cordis, ventriculi, æsophagi, intestinorum, vesicæ vtriusq; & vteri ambiens & circû eas nascens, & muniens contra causas calorem iunatum dissipâtes. Membranis etiâ suam carnis compagem, negare nō possumus: nam cū sanæ sunt, corpulētiore apparēt: attenuantur verò dum non ita valent: quod in re practica distinxisse, magnum præstat vsum. Tertium autem & vltimum carnis genus est, propria cuiusq; visceris substantia, quâ parenchyma Medici antiqui appellarunt: talis quidem est, cerebri, pulmonum, hepatis, lienis, renûve, caro, seu id totum, quod venis ac neruis adheret. Atque hæ sunt omnes carnis differentiæ, quarû facile regigni, dum deperditur, potest prima: secunda difficulter: tertia verò partim possibiliter, partim difficilius. Sic enim Hippocr. inquit. Nerus discussus non coalescit, neque vesica, neque aliquod ex tenuibus intestinis, neque vena sanguiflua, neque tenuis genæ pars, neque pendendi pellicula: qualiter verò in senibus caro regnerari possit, & quibus medicamētis, latius poteris legere lib. de recto præsid. vsu.


Lib. I. de
morb.

Sciendum vltimò in hac institutione est, vlceribus plura accidere, quæ citra nouum affectum carnis generationem impediunt: veluti sanguinis paucitas: cui vsui medicamenta quæ parum siccent, & manifestè calfaciant sunt adhibenda: nam quæ talia sunt, plus attrahût quàm siccent. Confluit item sæpe sanguis tanta copia, quòd eam natura regulare nequeat: quapropter quæ repellendi vim obtinent sunt admiscenda, dum non sint ex adstringentium genere. Item distemperies sæpe facultatem prostermit, ita vt carnem generare nequeat: qua.

quapropter non contrarijs (vt nōnulli cēsent) sed moderatis in omni qualitatū excessu distemperiem corrigere, & facultati ministrari oportet. Verū si vlceris distemperies plurimum fuerit à medio labens, medicamenta parum à medio recedere tenentur, versus contrariam qualitatē ei, qua vicus distemperatur. Idem etiam de his quę emolliunt intelligere oportet, si prę partis duritie caro gigni non possit, & pari ratione de omnibus alijs, quę naturę sunt impedimento.

DE HIS QVÆ CICATRICEM
inducunt medicamentis

INSTITVTIO XIII.



QVAMVIS vlceratę partes tunc sanitati proximę habeantur, cū cicatrice solū obduci desiderant, non tamen ob id ita certū est, quādo, qualis, quoue modo futura sit. Nam vlcerum plura ita sunt malignitate affecta, vt nullis pręsidijs cicatrice obduci queant: alia etiā ob carnem excreſcētem, potiūs quę exedant, quā quę cicatrice obducunt desiderant, ob partis affectę pręstantiā. Alia rursus ob partis sitū & naturā diuersis medicamentis exposculant cicatrice obduci, qualia sunt inter narum partium, oculorum, aurium, narium & oris. Quapropter quatuor se se nobis offerunt

h

dispu-

Institutionum Chirurgicarum

disputanda in hac Institutione. Primum, quod simplicem & optimam cicatricem efficere doceat: secundum, quid possit modum ponere supercrescēti carni: tertium, quæ via malignis vlceribus cicatrix conciliari possit: quartum verò, quid iuxta diuersitatem partium cicatricem inducat.

Ante omnia tamen necessum est mōstrare, qualis sint naturæ & fortis medicamēta epulorica nuncupata. Cuius rei reminiscitur Galen. monstrans duplicem obtinere naturam: primam eorum quæ ex accidenti epulorica dicuntur, quæ carnem detrahēre, & colliquare propria natura sunt apta, quorum si minimū quid super vlcus in ieceris, ipsum ad cicatricem perducet: cuius generis sunt calcithis, es vstum & lorum, æris squamma, mysi ac vitriolum: hæc enim calli instar carnē indurando, & contrahendo, cicatricem dicuntur inducere: quibus si paulò largius vtaris, vlcus cauum efficies. Longè tamen diuersa ab his est natura eorum quæ verè epulorica dicuntur: nam præter id quod nihil proficiunt, nisi magnam quantitatem vlceri imponas, carnem solum alterare habent, non exedere, vt ea quæ mox diximus; id quod perficitur per ea medicamenta, quæ carnem ipsam contrahere, constringere, densare & exficcare, ac instar calli durare valent, quæ vt plurimum sicca sunt, & frigida, vt galia, alumen, æs vstum, malicorium, balaustium, acacia, hus & huius generis alia: quæ omnia Galen. de epuloriciis refert. Quippe regnere (inquit) aliquid opus est, quod perit, non tantum vnire quæ dissident: cæterum diuersa ratione hinc gignere quod dehinc, quam in cauo vlcere, quando illic sanguis, hinc caro, pro materia fit: siquidē quod

Li. 5. sim-
plic. 16.

Li. 7. sim-
plic.
Li. 9. sim-
plic.
Li. 10. phar-
ma. gen.

quod canum est, impletur ex gignenda carne, quæ ex sanguine ortum habet: at in cicatricem perducitur quod iam est impletum ex gignenda carne, quæ ex subiecta creatur carne. Ceterum caro eadem specie cum ea quæ perijt, gigni in cano ulcere potest: cutis talis omnino, qualis erat quæ perijt, restitui non potest, sed quid simile tui, & quod eius officium suppleat. Quibus verbis constat, ex carne per vltiore exificatione fieri cicatrices, & eis deberi ea medicamenta quæ mox diximus subiectam carnem posse aliterare.

Libr. 6.
aphor. 8.
Li. 1. phar
ma. gen.
cap. 12.
Li. 3. metho. c. 5

Qualis verò futura sit cicatrix, & quomodo, aperte docuerat Galen. docens cicatricem cutem non esse, quia pilis caret: inquit enim. Ergo quoniam cutis carne ipsa, tum siccior, tum etiam densior est, si carnem siccabimus & adstringemus, cuti etiam persimilem reddemus: nam quæ cicatricem inducunt medicamenta, non solum qui insluit, consumere tenetur humorem, sed eum, qui in ipsa carne subiecta continetur. Cæterum in hoc opere cauere plurimum oportet calli generationem, ut Galen. aperte consultit dicens: Cura enim habenda est, ut citra callum cicatrix inducatur. Atque ea gratia ea pharmaca in usum veniunt, quæ multam ad tactum lenitatem inducunt: suboritur enim cicatrix paulò siccioribus his quæ carnem generant, & minimè mordentibus. In publicis itaque corporis particulis, & planis vlcerebus, lenissimis medicamentis cicatrix querenda est, aut saltem sarcoticis maiori adhibitis copia. Quod ita facere in lienosis ac senibus non adeò facile est: neque exedentibus medicamentis, nec plurimum lenibus, quia maior & deformior fiet cicatrix: quas

Li. 3. metho.
Li. 14. metho. c. 10

Li. 5. phar
ma. loc. 6

Institutionum Chirurgicarum

profecto emendare nisi receptes fuerint, non poteris: ac si id futurum est, calamintha super sparsa facies albiorem cicatricem, sicut ipsa cum vino cocta, aut argenti spuma facta cum oleo rosaceo: item oleum in quo ferbuerit brionia radix, sicut thyté lapidem refert Galē. recentes cicatrices emendare, inueteratas difficulter, licet medicamentis quæ carnē exedant, anserino aut gallinaceo adipe committis, sæpe id ex voto succedat: alia verò quæ cicatricem corrigunt, leges lib. de rect. præsid. vsu.

In cauo vlcere neque anrea cicatricem inducere, quàm carnē adimpleatur par est, neque plurimū carnem permittere supercrescat, sed cū planum factum sit vlcus. Quæ quidem opera cautē facies, ne cū exedere & æquare carnē intendimus, aut crescentē plus iusto exedamus, aut præter institutum, caro ipsa in cicatricem degeneret, antequam equalis efficiatur. Quod etiam aduerit Galē. dicens: Celsare enim consulit Hippoc. antequam finem facias: & eleganti oratione alibi his verbis dixerat: Eatenus verò utroque vtendum, vt tum primum desinas, vbi ad cōmodationem peruenierit, prius quàm ad contrarium ascendat: nam & carnē supercrescente diminuenda, nisi in symetro substitueris, cauam partem repræsentabis: & caua recreanda, nisi steteris, ibiq; in symetro cessaueris, immodicē carnosam efficies,

Sūt etenim inter medicamēta exedētia plura, quæ nisi debite adhibeātur, id proptē efficiū: quod docuit Gal. distinguere, collatione facta corporis, naturæ & partis affectū, ac viriū medicamenti: nā quæ acria sunt, in paruissima quantitate adhibere oportet, dum cicatricem inducere studemus: at si carnē exedere, liberalius. Cuius generis sunt attramentū
futorium,

Li. 13. me
th. c. 16.
Li. de cōf.
art. me.

futorium, calcithis & similia. Quæ verò vehementer siccant, sunt vt spongia, asphodelorū radix, hermodactili, stupæ minutim inscissa, lumēra muria imbuta & exsiccata, quæ varianda sunt pro partis aut corporis conditione: nam in humidis corporibus quæ acra sunt & exedentia, cicatricem inducere nequeunt: sufficiunt quidem quæ siccandi vires habent. At in siccis corporibus & naturis, exedentia potiùs cicatricem inducunt, quàm carnem exedere possint: quæ verò sicca sunt, pus quidem mouere sunt apta, cicatricem non possunt.

Contingit non rarò, etiam si vlcus carne sit obductum, cicatricem suscipere nullis remedijs posse, aut iam factam mox euanescere, & vlcus detectum, vt priùs erat, superesse. A Egrè quidem ad cicatricem deueniunt vlcera, quæ hac ratione dissepulatorica appellantur, aut maligna, vt insinuerat Galen. Quo fit, vt adhuc duo tantū vitia expediat reducere causas omnes, quas Medici passim in vlceribus ægrè ad cicatricē veniētibus considerant. Sunt itaque, vt Gale. locis citatis recenser, hæc vlcera ea quæ ex humorum confluxu vel multorum, vel acrium, cicatricem admittere nequeunt circa particulæ affectæ aliud vitium. Cacoethæ autē vlcera appellantur, quorum partes affectæ ita vitio conspurcatæ sunt, vt ex sibi cōmisso alimento, aut callum aut carnem foedam nigramve, aut quouis alio vitio conspurcatā efficiat: quo fit, vt cicatrice partes nō obducatur: at dissepulatorica ob prauorū aut multorū affluxū, & ob id diuersa ratione præstidia sunt administranda. Nā quæ dissepulatorica sunt, præmissa per sanguinis missione & purgationē prudentia, validam citra morsum exsiccationem expo-

Li. i. phar
ma. gen.
c. 13.
Li. 4. c. 1.

Institutionum Chirurgicarum

Expofulant. Præterea ſumma diligentia curandū
eſt, vt quod influit reiicias repellas ve, ſi plus iuſto
qualitare aut copia peccauerit: & ſi quid influxit di
ſcutiendū protinus eſt, ijs quæ citra immodicum
calorem & acrimoniam id valeant efficere: qui
bus præmiſſis, ſiccioribus cicatricem induces, vt
Li. 4. fer. docuit Aetius his verbis. Quemadmodum antea
2. c. 40. diximus, duplex ſcopus propoſitus eſt in cura
tione partium quibus nullus deprauatus habitus
ineſt: alter repellendi quod influit: alter diſcutien
di quod in affecta parte eſt: & longiſſima oratione
peruenit curando uſque ad cicatricis inductionē.
At ſi cacoëthe fuerit vlcus, præmunito corpore de
centi euacuatione, ne fortè eius vitio vlcuſ tale
fiat, particulę tēperies omni arte corrigenda eſt, ne
deinceps humores vitiet. Expedit tamen ante, ſi
quid præter naturam in vlcere factum eſt, id radi
citus abſcindere: nam mox noua temperie concilia
ta, & carne nouiter præexiſtenti genita ſimili, leui
negocio cicatrix fieri poterit. Quodd ſi adhuc non
ſuffecerit, expendere oportet quatuor eſſe vlcerū
conditiones, quibus ipſa ægrè cicatricem admit
tunt, & quibus poſtquam aliquam adipiſcuntur, fa
cile iterum amittunt. Prima, cum vlcus malum con
traxerit habitum: argumento ſunt ſenes & hydro
pici, quos ſanare antea non poteris, quàm malum
habitum auferas, etiam ſi caro eo ſiccetur quodd in
cicatricem degeneret: nam paulò poſt, ſua ſponte
in priſtinum delabuntur ſtatum. Nec minus quidd
grauia ſunt vlcera, quibus cōtinuus imminet alius
de fluxus: indicio ſunt fiſtulæ & varicoſa vlcera:
item cancroſa, & quæ iam callū contraxerunt: quæ
licet fucata quadam cicatrice obducantur, diffici
liora durioraque curatu paulò poſt erumpunt.

Quartò

Quartò verò ea difficiliùs & incertiùs cutem acquirunt, quibus os vitiosum subiacer, vt his verbis dixerat Galen. Quando enim ex adhibitis medicamentis caro quæ ossi superiacet patienti exsiccata contraxerit cicatricem, statim quidem integra sanitas restituta videtur: rursus verò paulatim aliqua effluente sanie, ex osse corrupto in parte penitiorè iterum aduenit inflammatio, & puris generatio sequitur, à quo quidem tota superficies eroditur, caro verò exulceratur. Quibus verbis colligitur, cicatricem nō esse perpetuā, donec os ex toto excidatur. Quapropter, hæc quatuor incommoda priùs auferre oportet: deinceps verò quæ valenter exsiccent, adhibenda sunt.


Libr. 6.
aphr. 45.

His habitis, statuendum est, vt in carnis generatione, ita & in cicatrice inducenda varia debere esse quæ id opus efficiunt, iuxta diuersitatem partis vlceraatæ. Nam quanto particula ficcior fuerit, tanto maiorem desiderat siccitatem: non quidem eam quæ sibi similis sit, vt in carnis generatione, sed longè intensiorem, quanto durior ficciorque est cicatrix carne ipsa. Cuius rei exempla & rationem reddit Galen. per singulas corporis particulas, ex quibus facile erit, quantum in quauis particula exsicccandum sit, colligere.

Lib. 5. m.
th. c. 10.

Institutionum Chirurgicarum
DE RECTA AGGLVTINANT
tium auxiliorum administratione

I N S T I T V T I O X V .



ST igitur agglutinatoriū
auxiliū, quod natū est con-
iungere & vnire diuersas
partes, quo in pristinam
vnitatem reducantur: vnū
quidem & singulare cruen-
tis vulneribus præsidium:
necnon & in finibus inue-
teratis cum ab omni inflam-

matione eos vendicaueris, puerosque medicamen-
tis reddideris, vt ex Gal. constare videtur. Quod
sanè præsidium plus siccet quidem oportet, quā
quod carnem producit, non tamen detergat; ne-
que expurger, sed contra prorsus substantiam om-
nem in idem cogat: cuius census sunt medicamen-
ta austera & adstringentia, quorum virtus est,
ne vlla inter cocturas partes subnascatur humi-
ditas. Quod pulchrè his verbis docuerat A risto-
dicens: Quæ nam virtus medicamenti supprimen-
tis sanguinem sit, quod enemon appellamus: an
vt exsiccet & materiæ inutilis confluuium com-
pescat, sine crusta aut carnis putredine: ita enim
efficitur vt vulnus simul & inflammatione careat,
& vnitati sit opportunum: quod enim materia non
superfluit, inflammatione carebit: quod siccum
est, vnitati opportunius erit: quādiu namque per-
mader, concorporefcere nequit. Quamobrem que-
cruentis acria magna ex parte sunt, quod acerbis-

Li. 2. phar
ma. gen.
c. 12.
Libr. 2.
ad Glau.
c. 8.

Li. 2. pro-
ble. text.
32.

care sua possint adstringere: qua sententia explicuit egregiè, qualia debent esse medicamenta cruentis vulneribus proficua.

Quapropter necessum est constituere differentiam inter ea & reliqua, quæ ferè eiusdem sunt conditionis, & agglutinantia non sunt. Nā siccantia, sunt quæ vlceri curādo sunt proficua, quæ scarotica appellamus: sicca item, quæ cicatricem inducunt, & sicca hæc etiam quæ agglutinant. Rursus adstringentia multa, quæ agglutinandis vlceribus non sunt vtilia, licet quæ agglutinant etiam adstringentia esse teneantur. Sed hæc interest differentia, quòd quæ carnem generant, tantum id quod superest alimenti, ab eo quod ex usu est, pro carnis non solum nutritione, sed & generatione, exsiccant, & quod principalius est, ipsam carnem firmant & similem sanæ reddunt. At in agglutinatione vlcerum, siccandum modò est quod fluit, quo videlicet affecta pars superuacuis vacet: nam cum caro aut nulla aut pusilla generari debeat, maiorem partem eius quod influit, consumere tenentur agglutinantia auxilia. In cicatrice verò inducenda, non modò qui affluit humor, verum qui in ipsa carne continetur absumendus est: careant tamen abstersione oportet: stat enim agglutinatorium in medio eius quod carnem generat, & cicatricem inducit, quatenus ad siccandi vires attinet. Item licet agglutinantia adstringendi vires habeant, probat tamen Galen. neque omnia Li. 1. sim. pl. 6. 32. adstringentia agglutinare, neque omnia agglutinantia adstringere. Quo loco recenset plurima, quæ licet adstringant, potiùs tamen carnem exedunt quàm agglutinent, ut calcithis, æris squam-

Institutionum Chirurgicarum

quam, & eius naturę alia: præterea alia reperies, quę licet agglutinent, non tamen adstringunt, vt amyllum, farine pulvis & similia. Huius quidem rationem reddit Galen. his verbis: Glutinatorum verò, neque detergat, neque expurget, sed contra prorsus substantiam omnē in idem cogat. Quę sententia constat, quòd licet glutinatorum teneatur adstringere, id verò adstringens quod aut detergat, aut purget vehemēter, nulla ratione potest esse glutinatoriū. Itaq; agglutinatoria pharmaca sub adstringentibus includuntur, vt quę frigida sunt, quę hac lege repellendi vires sortiuntur: omnia tamen sicca esse oportet: ficciora item farcoticis, quia alimentum adhuc secundum naturam consumi tenetur: præterquam quòd præcipuum opus est partes comprimere ac firmiter, vt si quid præter naturam aut præfuerit, aut fluxerit, ocysime repellat, ne agglutinatione impedimento sit: nihil enim inter coitura labra esse debet, vt cōmodē vnio fieri possit, vt Gale. expresserat: cum hoc tamen licet huius naturę sit auxilium, varias sortitur differentias iuxta diuersarum partium quę solui possunt, rationem.

Verum licet simplicis vulneris varias species adduxerit Galen. quas in Institutionibus Chirurgicis recensebo, cum hoc tamen vnum habent omnes commune, vt agglutinantibus (si citra alterius vitij complexum fuerint) curari perpetuò desiderant. Variatur tamen materia, non vitij differentia, sed: in embri affecti varietate, quia communem habent omnes vnionem, quę instrumentalibus partibus nulla ratione est possibilis: quia hæ quærens instrumentarix sunt, vim non habent alterandi, coequenti, assimilandi, & regenerandi carnem,

necessaria quidem opera ad vnionem. Quod licet aliquando fiat id virtute sit simplicium: nam figura, numerus & magnitudo nil horum efficere valent: non quidem vt Tagaultius arbitratur, quia ex toto scinduntur venæ & arteriæ. Cum hoc tamen non est credendū, omnes simplices vniri posse, sed ex his quasdam propriè vnionē suscipere, quasdam impropiè, & difficulter, quasdam verò impossibilitèr.

In quo sanè opere expendisse oportet, quid vnio sit, quid gluten, ac denique quid agglutinatio. Est quidem vnio reditus ad vnum, nam per diuisionem plura erant facta, quæ prius vnū erant. Præterea continua & verè vnum sunt, quorum extrema sunt vnum, & in partium vnione non semper extrema sunt vnum (nihil videlicet, substantijs, quæ duræ frigida ac sicca sunt, quas diximus difficulter coalescere, vt ossa & cartilagine & nervi, intercidit simile) quia mediat sæpe alia substantia, diuersa ab ea quæ in parte diuisa est. Quapropter ossa non dicuntur re vera vniri, quia non coniungitur os nisi medio callo, quo veluti vinculo veram vnionem æmularur: quæ potius connexio- & colligatio censenda est, licet in pueris Galen. asserat ossa probè posse vniri: quia calore & humido abundant, & sunt mollissima. Alia verò huic tractationi proficua, pulchra & difficilia leges expressit lib. de recto præsid. vsu. Ossibus quidem proximè accedunt cartilagine, venæ & arteriæ, licet facilius multo id fiat: mediam enim, quatenus ad vnionis facilitatem attinet, inter carnem & ossa naturam obtinent: quapropter non desperandum est posse vniri. Caro etenim inter omnes partes veniùs faciliùs quæ vnitur, nullo intercedente medio
à carne

Institutionum Chirurgicarum

à carne ipsa diuerso. Necesse tamen est naturam aliquid habere: quia cum mutatio fieri non possit à morbo ad sanitatem, à diuisis ad vnionem, absque motu & actione aliqua, fit vt glutinatione molliatur ad eandem naturam reditum: quod nulla ratione fieri potest, citra vinculum & gluten, quo vera symphisis & vnio fiat commodè: est tamen id vera caro eiusdem naturæ cū præexistenti, quia nulla continui solutio post vnionem manet absque cicatrice: at cicatrix caro est sicciior solidiorque facta, ergo citra ipsam vniri non poterit. Maluit tamen Galen. hanc carnem quæ interficit, gluten appellare: cuius quidem generatio in hunc modum est. Sanguis qui attrahitur à partibus carnosiss ad propriam nutritionem, postea quàm ad extrema diuisa peruenit, vbi venæ sunt vulneratæ, effunditur, & à partibus iam contiguis eo modo alteratur, quo alius sanguis in partibus integris: quæ quidem sibi sanguinem apponunt, & adherere faciunt, atque ita sibi assimilant, vt tandem viscosum & crassum glutinis modo fiant, & sic vniantur, & per integram assimilationem fit caro, in qua verè fit huiusmodi vnio, vt apertis verbis docuerat Galen. Agglutinatorum, aut omnino carnis generatione non egent, aut planè exigua. Quibus verbis constat in vera vnione pusillum carnis generari.

Li. 3. method.

His præmissis, statuendum est quatuor esse carnis species: glandulosa vna est quæ nullam membrorum seminalium missionem sortitur: simplex, quæ fibras feminales obtinet: confusa, quæ fibras & membranas: lacertosa, quæ ligamenta & nervos adipiscitur. Quo fit, vt carnis nomine, cui facilitas coalitus inest, veteres rubrū illud, molle

ex sanguine genitum, ac sibi associatum, citra medium alterius naturę intelligant.

Pręterea ea membra hac in parte in memoriam renocare oportet, quę nulla ratione conglutinationem admittere diximus: quorum quędam sunt ita tenuissima, vt solutę coalescere amplius nequeant: idcō vesica, nisi in ceruice discissa non coalescit. Alia autem quę in integrum discissa sunt, minimē vniri possunt, quorum etiā notitiā tribuit Hippatē

Libr. 6.
aphor. 19.

ea quę perperuō motu agitantur: vnde septi & pulmonis vlcera rarō sanitatem consequuntur: postremo ea quę & eius sunt nobilitatis pręstatię, vt scissio plurimos exhauriat spiritus antequā coalescant. Insuper statuendū est, huiusmodi coalitū nō esse artis munus, sed naturę: quod egregiē docuerat Gale. Superest tamē in prędicta vnione artis ministrū & pręparatio agentis naturę: quā sanē pręparationē quadruplicē esse ostēdit Gal. Prima sit remouendo, si quid est inter partes diuisas quod applicationem exactā fieri impediat. Secunda diuisas partes simul cōmittere & alligare docet. Tertia easdē iam applicatas firmare ac stabilire pręcipit, & stabilitas eo modo conseruare. Quarta verō docet partis substantiā tueri: quę omnia necessū est. Chirurgum memoria tenere. In applicatione itaq; pręstādamanus Chirurgi vim potissimā habet: fascię verō & suturę potius conseruant adductas iā partes, quā efficacīā habeāt adducēdi: alia quidē pręsidia mixtū opus videntur pręstare, inuare inquā exactā applicationē, & quę applicata sunt artissimē cōnectere: cui vsui deseruit cōmodus partis situs, & saniosi excrementi affluxus. Vltimā manum imponunt exsiccātia, quę partis substantiam tucantur, quorum abundē dictum est.

Li. 3. & 3.
de natu.
fa.

Li. ar. me.

Institutionum Chirurgicarum

li. ar. me. In qua re pro partis varietate varia oportet con-
signare pharmaca, quæ cuiq; proficua sint. In ossis
fractura prius oportet ossa coniungere, & in pro-
prium figuram restituere, deinde ad calli genera-
tionem peruenire. Porro Galen. ait callum procrea-
ri ex excremento nutrimenti ossis: appellat quidē
recrementum proprii alimenti, non quidem verum
excrementum, sed partem alimenti residui. Nam
qua ratione ossa ex omnibus humoribus nutriun-
tur, eodem prorsus modo in calli generatione ne-
cessum est ex vniuersa massa humorum aliquid as-
sumere, sed plus ex eo quod crassum est, & visci-
dum, vt pituita est, & humor melancholicus: nam
quod futurum est vinculum vt firmum sit, ex cras-
sitie duritiem, ex hac robur & constantiam, ex visci-
ditate verò aptam & firmam colligationem sibi
paret oportet. Quamobrem victus instituendus
est, ad arcendam inflammationem, in principio
magnæ fracturæ, tenuis: ad callum generandum
deinceps crassus & tenax & quantitate & qualitate
moderatus: nam sepe calli generatio impeditur,
vbi sanguis aquosus est, sicuti vbi plus suppedita-
tur à venis quàm possit alterari, præsertim vbi fa-
cultas inualida est, vt in senibus & malè affectis
corporibus, aut cùm callus callo additur ob no-
nam fracturam: quippe tunc callus nequit ita faci-
lè formari. Qualiter quæ fracta sunt vniri, conti-
neri ac tractari debeât, latissimè leges lib. de recto
præsid. vsu. Sat enim est hac in parte scire, quòd
vnitas ossium partes, vt callus fiat, firmabis viui-
mine, pice, cera, terebinthina, refina, alumine, pro-
poleos, ammoniaco, myrrha, & pulueribus ex vtra-
que consolida, & reliquis huius naturæ qui vulga-
res sunt.

Nerui

Nervi etiam & tendones, varias patiuntur diuisionum differentias, namque huiusmodi partes aliquando punctum vulnerantur, & aliquando celsim: & rursus puncturæ nonnunquam patent, ac nonnunquam cæcæ sunt & occultæ. Item vulnera quæ celsim fiunt, nudum aliquando ostendunt nervum: aliquando verò cute & carne tectum: item aliquando nervus totus est præcisus, quandoq; autem duntaxat ex parte dissectus: quæ omnia curationem necessariò tenentur euariare. Namque nervis punctis alia conueniunt, quàm vulneratis latioribus plagis, & sic de reliquis differentiis. Dum punctum nervus fauciatur, sola indiget exsiccatione: nam doloris mitigatio, quam omnes Medici veluti primam commendant, symptoma est, cuius medella ad nervum nihil attinet: nam à principio id vitare, quantum possibile fuerit oportet, & exsiccare saniem & excrementa quæ in vulneribus necessariò gignuntur (non tamen nervi substantiam aut temperiem mutare) nam si intus mancant, mordent nervos & irritant dolores & convulsiones ac inflammationes. Sic Galen. laudat sulphur, sagapenum & euphorbium, quibus maiori ex parte oleum admiscet, quod alijs vlceribus denegauerat: cum quia nulla in puncturis desideratur carnis generatio: cum verò ob symptoma: cuius præsidium oleum est. Quæ sanè medicamenta tribus modis prodesse possunt, exsiccando nimirum, vel foras trahendo, vel facta permissione vinctuosæ substantiæ cum saniosa: qua ratione illius saniei acrimonia sepiissime mitigatur. Quo fit, ut dum omnia hæc officia Galen. exequi velit, omnia admisceat, sic quæ valenter siccant, ut euphorbium addit, aut dum magis est mitigandum, sabinum solum infundit, vel

Li. 3. & 6
Method.

Institutionum Chirurgicarum

Li. 4. ser. 2
cap. 27.

cum eo miscet ceram & terebinthinam. Aliquādo
sanè adijcimus quæ facultatem mitigatoriam cum
trahente obrinet, veluti cū opopanax & sagapenū
cum oleo adiunguntur. Itaque ab omni humectā-
tione cauere oportet huiusmodi affectos, solū enim
quæ moderatè calfaciūt, & valētèr siccāt, huic vsui
proficua esse his verbis docuerat Aetius. Nervi
enim sauciati curatio medicamentis opus habet,
quæ repidam caliditatem habent, valde verò sic-
cant. At si prorsus non scindatur nervus, eodem
modo curari desiderat: cauendum tamen est, ne ag-
glutinantibus hæc & maiora mala succrescant.
Quod si conuulsio supervenerit, præscindenda ex
toto fibre sunt, postea tamē vulneratas partes vni-
re oportet, sutura aut ligatura decenti: id tamen ci-
tra nervi aut tendonis punctiōem: quod profectō
ante inflammationē fecisse oportet. Verū si ner-
vus cure detectus sit, fugere acia medicamenta
oportet, qualia sunt quæ ex euphorbio componun-
tur: eligenda tamen quæ absque rosione siccent:
quapropter abluere huius rei gratia medicamēta
oportet. Si verò nervus contrusus fuerit, quæ exsic-
candi & adstringendi vires habeant sunt eligen-
da: vt fabaceam farinam cū oximellitè & sapa, cui
admiscebis irim Illiricam & absynthium: ac si vehe-
mens fuerit dolor, rosaceū adhibebis cū albumine
oui. Si verò cessim nervi continuitas solvatur, ag-
glutinatoria medicamenta sunt adhibenda. Cete-
rum quia nervorum natura expostulat quæ modi-
cè calfaciant, & valētèr siccent, & ex altis parti-
bus liberaliter trahant, ne quod ex vulnere super-
est excrementum, diu ibidem moretur, cum hoc
tamen hoc sibi peculiare exoptant nervorum vul-
nera, vt non exactè labra committantur aggluti-
nen.

menturve, sed foramen aliquod relinquatur, per quod tanquam per emissarium sanies effluere possit: sunt autem medicamenta huic vsui idonea, inter alia quæ Gal. recenset, centaurea maior, lingua canis, lanciola, pillosela, consolida maior & minor oleum lumbricorū terrestrium, terebinthina, gummi, opopanax, & alia id genus, quæ licet frigida sint, aptiora calidorum missione redduntur. Reliqua leges lib. de rect. præsid. vsu.

Li. 3. phar
ma. gen.
Li. 6. method.

DE ANODYNORVM ET
lenientium auxiliorum recto vsu

INSTITVTIO XVI.



OLENT accidentia commiserie & grauitatis ac molestie peruenire, vt etiam si morbus suapte conditione grauis sit, vniuersum curantis consilium ad se vertant. Cui ministerio duo adinuenit ars auxilia: quorum primum anodynorum medica-

mentorum est: reliquum verò leniens, siue paregoricum appellatur, quorum vis & efficacia est, dolores, vigilias, tussim, defluxiones, & sanguinis defluxiones sedare.

Anodyna igitur medicamenta, quæ propriè doloribus medentur, suas etiam sortuntur differèntias: nam quædam re vera sunt anodyna, quæ primum

Li. 5. sim.
plic. 19.

genus constituunt: quædam, vt Galen. statuit, talia dicuntur, licet sua natura anodyna non sint, quibus

Institutionum Chirurgicarum

iunctis constitui potest tertium genus. Illa enim quæ primo genere continentur, calore sunt ita temperato, ut calori nostro nativo quàm simillima existant, aut saltem primum ordinem calfacientium non transcendant: nam sic dulci sensu quem movent, partium dolore affectarum tristitiam, molestant; quæ sensum abolent. Quæ sane præsidia etiam tenuum esse partium cõuenit, nihilque habere adstrictionis, ut vnâ pariter euacuent, digerant, rarefaciant, extenuent, cõcoquant atque æquabile reddant quidquid in partibus dolore vexatis humorum est acrium, lentorum, crassorum aut multorum in tenuibus spiramentis infartorum, vel quidquid vaporosi aut crassi, aut plurimum frigidi spiritus particula dolenti in hæsit, impactumque est. Cum hoc tamen potissimam eius efficaciam & usum elucescere comperies magis in dilatarandis aperiendisque meatibus, & laxandis partibus ipsis, ut minus tensione crucientur,

Primum igitur anodynorum genus cõinet, quæ nostro calori simillima esse diximus, ut oleum dulce ætare medium, de semine lini, camemali, amygdalarum dulcium, & reliqua id genus. Quæ omnia hoc habent proprium & peculiare, ut omnibus dolorificis affectionibus mitigationis gratia conueniant: omnibus etiam causis & temperaturis: præterea omnibus morbi temporibus, aut anni constitutionibus adhiberi possunt: & corpori pleno & vacuo profunt: aliquando dolorem solum mitigant: ite nonnunquã affectionem sanant. Nam dum similia sunt nostro calori, acrimoniã malitiãque causæ retundunt: dum verò caloris primum gradum sortiuntur, per insensibilem halitum causam illicunt: sic dum causa manus faciesu negotiũ, quæ primo

primo gradu sunt calida adhibenda sunt: dū dolor urget, quæ nobis similia existunt.

Secundum anodynorum genus, licet præcedēti aliquo modo accedat, cum hoc tamen magis videtur contra causas pugnare: nam aut euacuat digeritque quod in parte est contentū, dum copia plus iusto ipsam distendit dilaceratve, aut qualitate certat aduersus vniuscuiusque qualitatis excessum: frigidam calfaciendo, & calidam refrigerando, ac sic de reliquis oppositioribus. Quæ omnia his verbis docuerat Hippocrat. In doloribus proximum ventrem purgare, sanguinis ventrem rescindere, vitiō, sectio, calfactio, refrigeratio, sternutatio, &c. Quibus verbis inquit Galen. remedia annumerat, & leuibus & sãuissimis doloribus succurrentia. Quod etiam idem Hipp. docuerat dicēs: Sananturque dolores contrarijs, idque etiam vnicuique morbo proprium est.

Li. 6. pop.
part. 3.

Li. de lo.
in bom.

Tertium anodynorum genus continet ea medicamenta, quæ licet anodyna dicantur, re vera talia non sunt: cuius census sunt omnia narcotica appellata, quæ partium stupore & sensus priuatione, dolorem persentiri vetant, non tollunt. Quæ sanè medicamenta maximam adeo habent vim, vt sepe nocent: quo fit, vt vtroque modo errare contingat, aut si plus quam par sit narcoticis vtari: vel si præ dolore laborantis vires labi ob timorem permiseris. Quod profectō Galen. his verbis scripserat. Qui verò cubantis delitijs subscribit, eiusque voluptatem, non sanitatem pro meta gerendorum habet, adulatoris, vbi ultra progreditur, crudelis hominis officium facit. Ergo veluti in omni totius vitæ, tum habitudine, tum actione, ita hîc quoque consiliū illud Sapientis, qui Nequid nimis dixit,

Li. 12. Me
thod. c. 1

Institutionum Chirurgicalium

contēplemur: habētes pro fine quò tēdamus, cubā
tis vtilitatē. Eſto igitur terminus in egrōtāntibus,
quē nō tranſibit is, qui ex arte generoſē cōtra mor
bū pugnat, vt vires cuſtodiat. Stupefaciētia igitur,
frigida ſunt, doloris ſenſum adimētia: quę quidē ca
lorē natiuū ſpirituūq; , vel extingūēdo, vel repellen
do, parrem cui fuerint admota ſenſu priuant: quod
omnia frigida præſtare nō poſſūt, ſed ea tātū quę
quarto exceſſu huiusmodi ſunt, vel ad minimū ter
tij refrigerantiū ordinis mediū ſuperār, vt mandra
goræ radix, alterci ſemen, & papaueris ſuccus.

Prætereā ſciendū eſt, ſtupefaciētia eſſe duplicis
naturæ: nā quædā intus ſumpta ſomnū conciliant,
ſenſusq; acrimoniam hac ratione obtundunt: alia
quidem exterioribus partibus ſuam gratiā imper
tiuntur. Quę omnia in hoc cōueniūt, quòd corpus
refrigerant, & ſenſus eo uſq; ſtupefaciūt, vt ſi pau
lò liberaliūſ adhibeātur, mortē etiā aſſerāt. Diffe
rūt ſiccitate inter ſe: nā quę humida ſunt, potui vti
lia nō exiſtūt: ſat enim eſt intus ſumere philoniū,
ſiue Perficū, ſiue Romanū: cuius naturæ eſt triphe
ra magna, aut requies magna: à quantitate. ſcrup. ſ.
ad drachmā: nā rurius eſt, iterato id medicamētum
præbere, quā ſemel exhibito in maius diſcrimē de
ferre laborātes: cū hoc tamē ſatius iudicauī, calido
rum aliquid cuius narcoticorū admiscere, quibus
nō modò periculū declinemus, verū etiā ipſe affe
ctus miteſcat aut humores coquantur, diſcutiātur,
inſcindantur, aut tota ſubſtantia alteretur. Cæterū
ex his varia poſſunt cōfici ſopientiū medicamēto
rum genera: nā quę ſoporiferi habēt plus ad præ
ſens valent, ſed immedicabilem in parte relinquiūt
affectū: quę verò minus & calidorū magis, minus
ſunt ad præſens efficacia, tutiora tamē & ſalubrio

re existunt: & magis si post annū à cōpositione sur-
manant. Quæ verò exteriùs adhibentur, nō incon-
uenit esse humida: cū hoc tamen præstantior est is
adhibendi modus, qui docet ea admiscere medica-
menta, quæ partim affectui cōueniāt, partim causæ,
partim verò sint anodyna, additis duobus tribus-
ve granis opij, ita vt pro partis dignitate adaugeas
aut minuas opij quantitatem, commistis etiam ca-
lorificis, & concoctorijs, ne pro sensu quem in præ-
sens sopire intendimus, in futurum etiam sensum
vitamque partis extinguamus, aut saltem densa-
ta materia incrassataque difficilior fiat affectus.
Qua ratione liberaliùs in calidis & acribus hu-
moribus eis vri licet: cum hoc tamen cautiùs
& per interualla & à leuioribus & minori copia
facto exordio, quo certior sit de quantitate con-
iectura.

Lenientia seu paregorica medicamenta, licet à
multis pro anodynis vsurpentur, dissident tamen:
nam hæc solis doloribus proficua sunt: illa verò nō
his sed plurimis alijs accidentibus commoda exi-
stunt. Nam vehementer sitientibus, vigilantibus,
fluxum quemuis patientibus, ac insuper
omnibus alijs affectibus, qui ex humorum acrimo-
nia, calore ac malitia prodeunt, hæc omnia me-
dicamenta protinus subueniunt, & præterquam
quod euacuationem non faciunt, etiam sensum
asperum nullum inducunt, quin potius vt Ga-
len. scribit, ipsa contra sensum medentur aspe-
ritati, qualia sunt lac, chōdrus, ptyfana, adeps, oleū
dulce & similia. Quorum profectō duo reperiun-
tur genera: nam quædam sunt quæ ex accidenti le-
uiunt: quædā verò quæ primò & per se. Quæ ve-
rò id ex accidenti efficiunt, aut vacuato humore,
aut

Li. 2. sim-
pli. c. 14.

Institutionum Chirurgicarum

ant facta absterfione, aut non prorinus, aut maiori excitata asperitate id efficiunt. At quæ verè & per se leniunt, quatuor modis docet Galen. distinguere ab eo quod ex accidenti lenit: primo an statim mitiget, an non: secundo an simul cum lædentibus euacuetur, an non: tercio an asperitatē quandam in corporibus relinquat, vel secus: & quarto an ita affectis vtile videatur, nec ne. Itaque quod continuo mitigat, & nullam excretionem mouet, sed neque exasperat dum intus manet, imò exasperatorum medella existit, ipsum quidem natura bonum est. Quibus medicamentis, aliæ etiam addere oportet, qualia sunt, quæ à Gal. recēsentur, loquēdo de emplastris colicis appellatis, quæ opiata apud Medicos habentur. Reliqua verò particularia ad sedationem cuiusque accidentis, reperies lib. de recto præsid. vsu.

Li. phar-
ma. lo. c. 4

DE ROBORANTIVM AVXILIVM *rum differentijs & recto vsu*

INSTITVTIO XVII.



VANTO roborantia auxilia communiora sunt, & maioris momenti & vsus, tanto negligentius & citra debitam distinctionem tractari hucusque vidimus: oēs namque roborantia exquirunt, exhibent tamē pauci, quia principijs carēt & legibus quibus vti oporteat, vt in vsum facultatum adhibeam.

beantur. Conabor ob id, ut res clarius euadat, quid propriè sit imbecillitas docere, & quibus modis omnes potentia & singula imbecillitari possint, ut hac via elucescat, quibus modis vnaquæq; ad pristinum robur reduci possit. Constituit quidem Hippocrat. differentiam inter languorem & imbecillitatem dicens: Proximus est imbecillis languens, verum imbecillior est languens, & plus laborare contingit ipsum, ubi iustum tempus non est affequutus, quapropter vtriusque naturam perdiscere oportet. Est itaque imbecillitas, quæ potentiam à suo scopo aberrare facit: quod profectò prodit, defectu fundamenti aut instrumenti, spirituum nimium aut humidi, vel subiecti in quo hæc sunt: item non rarò vitio tēperamenti partis, aut totius. Quæ tamen impotentiam succrescere posse vno è tribus temporibus eidentissimum est: nam quædam ante morbum reperitur: cuius ratione particula cui inest, postmodum morbum suscepat: inquit enim Hipp. Quod si ante morbum aliqua pars doluerit, hic morbus firmatur. Cui subscribit Gale. dicens: Cum verò fiunt & sensim increscunt, Medicos plerosque latet, quæ sanè non quando ob magnitudinem auxilio iam carent, tunc agnoscere oportet, quod vulgo cōtingit, sed & cum incipiunt & fiūt: hoc quidem opimum est. Quædam verò aliæ in morbis ipsis contingunt imbecillitates, ut Galen. eodem loco docet, sic scribens: Aliæ autem obponon, idest laborem, seu propriè dictum, ut dolor idem sit seu ut quispiam dixerit, malam affectionē, quia in acutis morbis ægri malè afficiuntur: sic enim coctiones delitescunt, & aliarum potentiarū actiones vel vitiantur vel abolentur. Post morbum etiam ut omnibus constare arbitror, facultatum

Li de vit.
me.

Li. 2. acu.
47.

in

Institutionum Chirurgicalium

in potentia ferè semper superest, ob morbi causarum & accidentium vehementiam.

Habent quidem prædictæ imbecillitates communem quandam medendi rationem: nam auxilia, quæ per ablationem causæ operantur, omnibus sunt communia, sed maximè ante morbum. In morbo verò tantùm eas mitigare oportet, & in auxilijs morbo præstitis eius imbecillitatis gratia aliquid admisce-re, nisi plus vrgeat casura virtus. Post morbū quidem, ubi quæ roborandi vim habent, potiorè locū obtinent, considerare oportet, quid in parte imbecilla effecerit, destruxerit quæ morbus: nā iuxta id roborantia adhibere conueniet. Sæpe enim solidā substantiam depopulatur morbus, nonnunquam spiritus, sæpissime temperiem mutat euerit quæ: ac nō rarò aliquid humoris relinquitur: cuius ratione facultas a suo scopo aberrat. Quo fit, vt hac varietate inspecta, corroborandi munus aggredi expedit.

Cuius rei gratia scire conuenit tres esse imbecillitatis sortes, iuxta tres potentias quæ imbecillitari possunt, vitalis nimirum (quæ reliquas facile in consensum trahit) animalis, & naturalis: & sic in quouis membro considerare oportet, quæ illarum a suo munere aberret, vt cuique iuxta propriam naturam debitum præsidium præstare possimus.

Dictum quidem in hac re est, quantum earum imbecillitati vno è quatuor modis posse: nimirum defectu humidi radicalis & propriæ substantiæ, vbi vitalis potentia viget: nam particulæ moles, seu materia, vel dissipatur, vel corrumpitur, aut supra modum crescit, aut denique figurā mutat. Itē temperies, iuxta eos quos suscipere potest, excessus

aut defectus, cum materia aut sine ipsa, idem malum nata est efficere. Præterea aliquid remanet in parte, cuius ratione facultas nequit suum munus perficere. Vltimò quidem spiritus, in his facultatibus quarum sunt instrumenta, aut dissipati pereunt, aut refrigerari & extincti aut suffocati, aut denique distracti ad diuersas partes.

His suppositis statuendum est, naturalem facultatem, temperamenti vitio plerumque imbecillitatis: sicuti animalem ob partium quæ illi subseruiunt deprauatam figurâ: & vitalem propter omnes, sed potissimum ob eas quæ spiritibus accidunt læsiones, etiam si ex accidenti reliquæ facultates ab omnibus lædantur. Considerare insuper oportet, an imbecillitas sit in caua aliqua corporis parte, vt in ventriculo & intestinis, vtero aut his similibus: an in articulis, nervis, ligamentis, tendonibus, venis, arterijs & carne, aut in omnibus simul: nam diuersam ob id expostulant roborandi rationem.

Insuper ad certam roborandi rationem inueniendam necessum est scire, causas imbecillitatis prius demolendas esse, ante quàm alia auxilia aggrediamur: quòd si id fieri ita facillè non possit, necessum est læsæ facultatis actionem aliquo modo supplere, ne animal, interim dùm causam illidum, plurimum labatur. At qui cùm dictum sit, facultatem firmari ex membrorum materia, nimirum spiritu, parte solida & temperie, sic membrorū materia maior, quàm sustinere possit facultas, ipsam euariare cogit: aut minor quàm opus habeat, pari ratione: illud quidem sit alimenti vbertate, aut humorum ad eam partem decubitu: hoc verò ex dissipatione propriæ substantiæ vel defectu alimèti.

vt rumq;

Institutionum Chirurgicarum

utrunque tamen sit, inedia, laboreve consumente,
aut mala aliqua qualitate colliquante resolventeque;
eandem substantiam: aut ob humoris tenuitatem
raritatemve corporis. At temperies peruertitur
(ut dictum est) excessu aut defectu alicuius quali-
tatum. Sic spiritus ut iam diximus, dissipari con-
tingit.

Cognita igitur imbecillitatis natura, cognitis etiam
differentiis & modis, incumbit nunc diligenter in-
quirere, quid robur sit, quibusve auxilijs dum abest,
recuperari possit. Est igitur robur actionum perfe-
ctio seu virtus, aut robur actionis, qua bonus habi-
tus comparatur. Naturalis namque siue appetitus si-
ue affectionis virtus, quidam est bonus habitus:
actionis vero naturalis virtus robur est: naturalis
ergo actio, naturali eget corporis apparatu, a quo
rationem causae erga ipsam habente producitur.
Quocirca illud in primis fieri non potest, ut istorum
alterum adsit, alterum vero desit, ambo enim simul
augentur atque decrescunt, quibus necessario pul-
chritudo subsequitur, aliud quoddam ab illis, &
tertium corporis bonum: quare haec tria corporis
bona, nimirum sanitas, pulchritudo, & robur, neque
vnius generis sunt, neque similiter omnia dicuntur,
sed vnum quidem ut primum atque per se, alterum
tanquam illius causa, tertium vero ut necessario con-
sequens. Quibus constat, quid teneatur efficere is,
qui vires roborare intendit. Nam cum tota virium
ratio sita sit in partium sanitate, & rursus haec constet
ex materia optime figurata, temperie, & spiritu, sit,
ut quouis horum trium deficiente, aut euerso, pro-
rius deficient vires, & refici eadem lege desi-
derent.

Verum quia nec partes eadem constant natura,
neque

neque causæ simul eodem semper sunt, neque rursus
modus idem, necessum est iuxta rationē vnius cuius
que membri, causæ & modi, indicationes & materiā,
quibus id opus perfici possit, exquirere. Materia ve-
rō & modus vniuersalis reficiendi vires in vniuer-
sum, egregiè monstratur ab Hipp. his verbis. Ad ro-
bur autem optima sunt, quæ carnem plurimā ac den-
sissimā producunt, & longissima oratione id mōstrat
ea parte. Ita etiā figuram vniuersam ad antiquā figurā
& pulchritudinē reducere teneris, si studueris robur
parti cōciliare: sic spirituum custodiā curabis & tēpe-
ramenti reductionē: atque hæc in genere dicta sunt.

Li. de af-
fec.

Specialius tamen cuiusque vitium corrigere oportet,
initio sumpto à causa. In qua cōsiderandum est, an
causa quæ imbecillitatem genuit, adhuc præsit, an ali-
quid absente causa relictum sit. Quippe aliud est ro-
borare partes abundantia oppressas: aliud prauam fi-
guram corrigere: & longè aliud spirituum dissipati-
onem impedire: sicut & aliud distemperiem frāna-
re, aut rursus substantiæ humidæ defectum supple-
re. Sic quæ dissipant vi calorem, quæ frigiditate dissi-
pationem impediunt, desiderant, sicut per intervalla
ea quæ odorata sunt, præsertim, quæ alimentosa sunt
habent substantiam, vt vinum, panis recenter coctus,
iura ex caponibus, & alijs odoriferis alimētis, crudis,
assis, elixis, præsertim quæ grata & iocunda fuerint:
maximè si condiantur margaritis, & pulueribus cor-
dialibus frigidis, & qui vini habeant cōpescendi dis-
sipationem spirituum. Quibus profectò cum gratæ
sunt, duplex refert Aërius robur admirandum conciliari,
his verbis. Venter enim vbi quod blandū est,
fascipit, & in se complexus tener, & probè concoquit

Li. 2. ser.
1. c. 132.

pro viribus: excitatur enim natura ad actiones sæpe
ab affectionum feritate miserè affrēta, suscitatur, ac
morbum repugnat, iuxta duplicem modum: ipsum
qui-

Institutionum Chirurgicalium

quidem malum, palā contrarietatis natura castigās,
vires autem animal gubernantes, consolans & exci-
tans, ac fortificans, ad superandum morbū. Ex qua
sententia constat, quanti momenti sit, ea alimenta
languentibus præbere, quæ illis gratiora & gustui sua-
uiora sint. Tandem vt in summa dicam, contra modū
operandi causæ pugnandum est: vt si defectu spiri-
tibus careat facultas refectione: si distractione, his
quæ coniungant, comprimant, & coërceant: si suffo-
catione, distractionibus & omni diuersionis genere:
si dolore & angustia oris vetriculi aut alterius partis,
his quæ leniant & mitigent. Pari etiam ratione si ve-
nifica facultate vires labantur, alexipharmacis rem-
agere oportet, admittis quæ emplastricas vires ha-
beant, quia venenata qualitas omnem substantiam
dissipat & putrefacit. Intemperies quidem duplici
ratione imbecillitatem parit: vno modo dum fiens
est, spirituum dissipatione ob calorem, aut eorūdem
extinctione ob frigiditatem: cui medeberis vt antea
dictum est: alio vero dum intemperies facta est, sub-
uersa; ex toto naturalis mēbri temperies, quod dū
incipiente morbo aut vigente acciderit, graue & pe-
riculo plenum existit: quo tempore nihil est naturæ
totius aut partis committendum, vtpote quæ vires nō
habet neque instrumenta, quibus operetur, sed vni-
uersum negociū arti committere oportet, iuxta affe-
ctus indigentiam, & conari auxilia præbere, quæ vi-
res habeant superiores morbo (quantumuis contra-
rijs equalibus dictū sit pugnādum esse) quia cū na-
turam (quod languida sit) non habeamus adminicu-
lanem, necessum est, auxiliij viribus supplere natu-
ræ defectum. Secus quidem res se habet, cū natura
suis constat viribus, quippe tunc sat est equalia por-
rigere, ac sepe mitiora profunt, quia supplet naturæ
robor medicamenti defectum.

Cæterum cum iam inclinante affectu, aut absente morbo, imbecillitas suboritur, ob eam quã morbus relinquit in membro aut corpore vniverſo affecti-
onem, maximam quidem eo tempore exoptat conside-
rationem, & maturum consilium. Namque aut relin-
quitur distemperies facta, aut spirituum penuria, aut
carnis defectus, duritiesve, aut tensio, aut laxitas, aut
mollities, aut ad motum impotentia: quibus omni-
bus & singulis, facultas nequit in membro aut vniver-
ſo corpore actiones perficere, maximè si cum hoc de-
sit caloris & humidæ substantiæ aliquid.

Distemperies itaque quæ ad omnium facultatum
impotentiam pertinere videtur, dum facta est, corri-
gi quidem nequit contrarijs auxilijs, & his æquali-
bus, vt multi falsò arbitrantur: nam id tantum ad sciens
intemperamentum pertinere constat, vt dictum est. At
extra affectum, cum solum expediat ad pristinam tẽ-
periem partem reducere, atque id fieri subito nequeat,
nulla ratione licet ea adhibere medicamenta, quæ pa-
ri consentint intensiõne, sed eaquidem quæ paulatim
habitum in contrarium mutant. Nam hac lege docuit
Hipp. consuetudinem mutare, & habitum ea contra-
dictum. Verum quod efficacius arbitror posse naturam
temperiem conciliare, est, maiorem caloris natui, spi-
rituum ac sanguinis copiam ad imbecillam partem
trahere, quibus facilius & promptius ipsa ad pristi-
nam reducitur temperamentum, quàm quouis alio au-
xilio. Quo profectò factum est, vt iecur, ventriculus,
caput, & cætera membra præcipua, etiamsi in habitu
sint refrigerata, maiorem susceperint gratiã, maius
que beneficiũ ex temperatis, & cuius naturæ & tem-
peramẽto similibus, quàm ex contrarijs qualitatibus:
nam maiore potius contrahunt impotentiam, contra-
rijs, maiusque sequitur damnum: quia caloris si ena-
nescit pusillus calor, & frigidis extinguuntur, potius

Institutionum Chirurgicalium

quā quod habituale intemperamentum remissionē, & particula subsidium recipere possint. Sic manus temperari corporis, & puerorū calor, & deniq; omnium, quæ naturalis caloris tēperiem & substantiā amulētur, & quæ calorem conciliant & spiritū sum moperē roborant, auxilio sunt.

Materiā tamen auxiliorū corroborantiū partis affectū natura facile ostēdit. Aduertendū tamē est hāc esse in omnibus legē adseruādā, q̄ in principio in calidis affectibus, paulō tēperato frigidioribus, & in frigidis, calidioribus paulō tēperato, vti oportet, & procedere tēpore, viriusq; excessum remittere, & ad mediā seu naturālē temperiē peruenire: remissū namq; facile remittit intēsum, trahitq; si diu perseuerat ad sui naturā. Sic enim reperies ad caput imbecillitatē capitalia auxilia tēperata, & ad vētriculi impotētiā, quæ ipsū respiciat. Verū in nutrimentalibus membris, & quæ alijs alimēta parāt, necesse est calorē adaugere, aut dum superat, minuire: hoc quidē ne cōstio turberetur, illud verō vt perficiatur: nā quod imbecillus calor efficere tenetur, id ars suppleat oportet, & ob id paulō calidioribus, quā in reliquis membris, nō tamē frigidioribus rē agere oportet, quia à frigidioribus longē plus lederetur quā esset cōstionis beneficiū: quod de siētibus intēperantijs subaudire oportet, nō de factis. Prætereā duplex succrescit in quavis facultate naturali roborādā ratio: vna qua facultas ad antiquū regreditur statum, eo modo quo dictū est: alia verō qua roboratur actus seu opera vniuscuiusq; facultatis, vt de cōcoctoria dictū est, medijsq; calorificis, aut at tēperabilibus, si scilicet sit intemperamentū: sic retinētis facultatis defectū supplet ars, siccis & adstringentibus medicamētis. Quæ ratione cōstat, meritiō Gal. dixisse, antiquos plurimū abstinere existimātes adstringētia roborare, cū ea nō

potētiā, sed actū eius solū firmēt. Pari ratione expul-
trix facultas humidis iuuatur, perficit q; facilius suū
opus. Hæc autē dicta sint, vt intelligat lector nō sem-
per in morbis facultates, præsertim naturales, esse ro-
borādas, sed tantū licere earū opera præstare, donec
morbus curationē suscipiat. Præterea cōtingit nō ra-
rō, vegetabiles potētiās vitari cōsensu vitalis, cuius
etiā ediscere prouidentia cōuenit, vt euocato ad eas
partes calore & spiritu, faciliē vegetabiles redeant ad
antiquū munus. Animalis verō facultas multis ratio-
nibus impeditur & labascit, defectu nimirū instrumē-
ti cōmunis, réperamenti videlicet (quod ad pristinū
statū dictis modis reducere oportet) aut animalīū spi-
rituū resolutione, vt cōualefcentibus cōtingit, quos
reficere antea docuimus: aut etiā peculiaribus instru-
mentis, neruis videlicet, ligamentis, tendonibus aut
musculis malē affectis, quæ omnia aut dura aut laxa
præter modum ex affectu supersunt, vt accidere fre-
quenter solet in solutionibus continui, curatis
luxationibus, tumoribus, fluxibus, doloribus, aut
alijs huiusmodi affectionibus: qui aut humoris præ-
sentia faciliē sic fiūt, aut ea membra sic affecta à mor-
bo supersunt. Si verō ob humorum affluxū prædicta
impotētia proueniat, curari per ablationē causæ desi-
derat, vt antea diximus. Verū si ex morbo prodeat, ve-
ra roborandi ratio in duris, emollitio est, in mollibus
verō & laxis cū adstrictione exsiccatio, admittis etiā
medicamentis quæ humorū reliquias cōsumere va-
leant: qualia sunt cerata & emplastra, atq; linimenta
huic vīui proficiuā. Verū quia lib. de inter. morb. cu-
rat. & de recto præsid. vīu, quæ particularia auxilia
cuiq; parti affectæ proficiua sint, latius scripsimus, in
hac scribēdi ratione hæc vniuersalia dixisse sat erit.

INSTITUTIONES

contentæ in tractatu primo primi libri
institutionum Chirurgicarum.

DE tumoribus præter naturam in genere Institutio prima.

De tumorum præter naturam differentijs institutio. II.

De tumorum præter naturam causis & modo generationis institutio. III.

De omni genere tumorum ex sanguine institutio. IIII.

De erysipellate & alijs tumoribus ex bile institutio. V.

De ædemate & pituitosis ac frigidis tumoribus institutio. VI.

De scirrho & melancholicis tumoribus institutio. VII.

De tumore flatuoso institutio. VIII.

De tumoribus ex carnea substantia institutio. IX.

De tumoribus reductibus seu extravasantibus institutio. X.

IN TRACTATV SECVNDO. continentur.

DE vulneribus in genere institutio prima
De vniuersali vulnorum curatione institutio. II.

De vulneribus nervorum & nervosarum partium institutio. III.

De vulneribus venarum & arteriarum, ac de sanguine.

I N D E X.

- guinis profusione institutio. IIII.
De vulneribus abdominis institutio. V.
De vulneribus thoracis institutio. VI.

I N T R A C T A T V T E R T I O.
continentur.

- D**E ulceribus in genere institutio prima.
De ulcere distemperato, cacoëthe, dissepuloti-
tico & inueterato institutio. II.
De ulcere virulento & corrosiuo, ac de sordido
& putrido institutio. III.
De fistulis & ulceribus cancrinosi institutio. IIII.

L I B R I S E C V N D I.
Institutiones.

- D**E topicorum auxiliorum administratione in
genere institutio prima.
De euacuatione quæ fit à parte institutio. II.
De recto auxiliorum alterantium usu institutio. III.
De adstringentium præsidiorum administratione
institutio. IIII.
De recta laxantium auxiliorum administratione
institutio. V.
De recto emollientium præsidiorum usu institu-
tio. VI.
De aperientium auxiliorum administratione insti-
tutio. VII.
De trahentium auxiliorum administratione insti-
tutio. VIII.

De

INDEX.

De repellentium auxiliorum administratione institutio. IX.

De auxiliorum resolventium administratione institutio. X.

De pus mouentium auxiliorum recta administratione institutio. XI.

De recta administratione tergentium auxiliorum institutio. XII.

De recto usu auxiliorum carnem generantium institutio. XIII.

De his quæ cicatricem inducunt medicamentis institutio. XIII.

De recta agglutinantium auxiliorum administratione institutio. XV.

De anodynorum & lenientium auxiliorum recto usu institutio. XVI.

De roborantium auxiliorum differentijs & recto usu institutio. XVII.

FINIS.

